

Περίπτωση 14η

Άνδρας 65 ετών με ΧΑΠ και χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια τύπου II υπό οξυγονοθεραπεία κατ' οίκον, προσέρχεται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών με δύσπνοια προοδευτικά επιδεινούμενη και εμπύρετο με συνοδό παραγωγικό βήχα από 48ώρου.

- (FiO₂ 21%)
- PO₂ = 45 mmHg
- PCO₂ = 69 mmHg
- pH = 7.33
- [HCO₃⁻] = 35 mEq/L

- [Na⁺] = 138 mEq/L
- [K⁺] = 3.7 mEq/L
- [Cl⁻] = 102 mEq/L
- [Γλυκόζης] = 114 mg/dl
- [Ουρίας] = 60 mg/dl
- [Κρεατινίνης] = 1.2 mg/dl

Ποια είναι η διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας;


- α. Χρόνια αναπνευστική οξέωση
- β. Οξεία αναπνευστική οξέωση
- γ. Αναπνευστική οξέωση + μεταβολική οξέωση
- δ. Αναπνευστική οξέωση + μεταβολική αλκάλωση

- pH = 7.33 (< 7.40)
- PCO₂ = 69 mmHg (> 40 mmHg)
- Αναπνευστική οξέωση

Η αναπνευστική οξέωση είναι οξεία ή χρόνια; Αμιγής ή συνυπάρχει μεταβολική διαταραχή;

- $[\text{HCO}_3^-] = 35 \text{ mEq/L}$, $\uparrow$ κατά 11 mEq/L
- $\text{PCO}_2 = 69 \text{ mmHg}$, $\uparrow$ κατά 29 mmHg
- Οξεία AA (;) $\Rightarrow \uparrow [\text{HCO}_3^-]$ κατά 1 mEq/L για κάθε $10 \text{ mmHg} \uparrow$ της PCO_2 , δηλαδή $[\text{HCO}_3^-] = 24 + 3 = 27 \text{ mEq/L}$
- Χρόνια AA (;) $\Rightarrow \uparrow [\text{HCO}_3^-]$ κατά 3.5 mEq/L για κάθε $10 \text{ mmHg} \uparrow$ της PCO_2 , δηλαδή $[\text{HCO}_3^-] = 24 + (3.5 \times 3) = 34-35 \text{ mEq/L}$
- **Χρόνια αναπνευστική οξέωση**

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΟΞΕΩΣΗΣ



(A-a) DO₂

- (A-a) DO₂ = [150 – 1.25 X (PCO₂)] - PaO₂ = [150 – (1.25 X 69)] – 45 = 150 – 86.25 – 45 = 18.75 mmHg
- ↑ (A-a) DO₂ = πνευμονική νόσος (ΧΑΠ)

- Συμπερασματικά, ο ασθενής εμφανίζει χρόνια αναπνευστική οξέωση λόγω ΧΑΠ

Ποια είναι η διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας;

- α. Χρόνια αναπνευστική οξέωση
- β. Οξεία αναπνευστική οξέωση
- γ. Αναπνευστική οξέωση + μεταβολική οξέωση
- δ. Αναπνευστική οξέωση + μεταβολική αλκάλωση