

Περίπτωση 28η

Γυναίκα 22 ετών με ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό, μεταφέρεται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών σε ημικωματώδη κατάσταση. Οι οικείοι αναφέρουν ότι έχει λάβει πολλά δισκία ακετυλοσαλικυλικού οξέος.

- (FiO₂ 21%)
- PO₂ = 54 mmHg
- PCO₂ = 20 mmHg
- pH = 7.44
- [HCO₃⁻] = 13 mEq/L
- [Na⁺] = 132 mEq/L
- [K⁺] = 4.0 mEq/L
- [Cl⁻] = 100 mEq/L
- [Γλυκόζης] = 122 mg/dl
- [Ουρίας] = 48 mg/dl
- [Κρεατινίνης] = 1.1 mg/dl

Ποια είναι η διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας;

- α. Οξεία αναπνευστική αλκάλωση
- β. Χρόνια αναπνευστική αλκάλωση
- γ. Αναπνευστική αλκάλωση + μεταβολική αλκάλωση
- δ. Αναπνευστική αλκάλωση + μεταβολική οξέωση

- pH = 7.44 (> 7.40)
- PCO₂ = 20 mEq/L (< 40 mmHg)
- Αναπνευστική αλκάλωση (κύρια διαταραχή)

Η αναπνευστική αλκάλωση είναι οξεία ή χρόνια; Αμιγής ή συνυπάρχει μεταβολική διαταραχή;

- $[\text{HCO}_3^-] = 13 \text{ mEq/L}$, $\downarrow$ κατά 11 mEq/L
- $\text{PCO}_2 = 20 \text{ mmHg}$, $\downarrow$ κατά 20 mmHg
- Οξεία AA (;) $\Rightarrow \downarrow [\text{HCO}_3^-]$ κατά 2 mEq/L για κάθε $10 \text{ mmHg} \downarrow$ της PCO_2 , δηλαδή $[\text{HCO}_3^-] = 24 - 4 = 20 \text{ mEq/L}$
- Χρόνια AA (;) $\Rightarrow \downarrow [\text{HCO}_3^-]$ κατά 4 mEq/L για κάθε $10 \text{ mmHg} \downarrow$ της PCO_2 , δηλαδή $[\text{HCO}_3^-] = 24 - 8 = 16 \text{ mEq/L}$
- $\downarrow [\text{HCO}_3^-] > 4 \text{ mEq/L}$ για κάθε $10 \text{ mmHg} \downarrow$ της PCO_2
- **Αναπνευστική αλκάλωση + Μεταβολική οξέωση**

- $AG = [Na^+] - \{[Cl^-] + [HCO_3^-]\} = 132 - (100+13) = 19 \text{ mEq/L}$
- AG ↑ κατά 7 mEq/L
- $[HCO_3^-] = 13 \text{ mEq/L}$, ↓ κατά 7 mEq/L (από τα 20 mEq/L)
- Το AG είναι ↑ όσο είναι η ↓ της $[HCO_3^-]$ από τα 20 mEq/L
- Αντιρρόπηση στην οξεία αναπνευστική αλκάλωση
- Μεταβολική οξέωση με ↑ AG που οφείλεται σε L-γαλακτική οξέωση

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΛΚΑΛΩΣΗΣ

pH >7,4 και PCO₂ <40 mmHg

Αναπνευστική αλκάλωση

Πόση είναι η [HCO₃⁻]

↓ [HCO₃⁻] είναι <2 mEq/L
για κάθε 10 mmHg
↓ της PCO₂

Συνυπάρχει
μεταβολική αλκάλωση

↓ [HCO₃⁻] = 2 mEq/L
για κάθε 10 mmHg
↓ της PCO₂

Οξεία αναπνευστική
αλκάλωση

↓ [HCO₃⁻] = 2-4 mEq/L
για κάθε 10 mmHg
↓ της PCO₂

- Περίοδος
μετάβασης
- Μικτή διαταραχή

↓ [HCO₃⁻] = 4 mEq/L
για κάθε 10 mmHg
↓ της PCO₂

Χρόνια αναπνευστική
αλκάλωση

↓ [HCO₃⁻] είναι >4 mEq/L
για κάθε 10 mmHg
↓ της PCO₂

Συνυπάρχει
μεταβολική οξέωση

- Συμπερασματικά η ασθενής εμφανίζει οξεία αναπνευστική αλκάλωση και μεταβολική (γαλακτική) οξέωση λόγω δηλητηρίασης από σαλικυλικά

Ποια είναι η διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας;

- α. Οξεία αναπνευστική αλκάλωση
- β. Χρόνια αναπνευστική αλκάλωση
- γ. Αναπνευστική αλκάλωση + μεταβολική αλκάλωση
- δ. Αναπνευστική αλκάλωση + μεταβολική οξέωση