

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΣΤΡΟ-ΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΓΑΣΤΡΙΤΙΔΑ

Η Γαστρο-Οισοφαγική Παλινδρομική Νόσος (ΓΟΠΝ - GERD) προκαλείται από την παλινδρόμηση του όξινου γαστρο-δωδεκαδακτυλικού περιεχομένου στον οισοφάγο, που έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση είτε των τυπικών συμπτωμάτων της πάθησης, όπως **οπισθοστερνικός καύσος** (καούρα) και **όξινη ερυνγές** (ξινίλες), είτε άτυπων συμπτωμάτων, όπως **δυσπεψία, μετεωρισμός, ναυτία, ερυνγές, θωρακικός πόνος, χρόνιος βήχας, βράγχος φωνής** (ιδίως τις πρωινές ώρες), **φαρυγγίτιδα & αλλοιώσεις των οδόντων**.

Όταν τα συμπτώματα της ΓΟΠΝ εκδηλώνονται δύο ή και περισσότερες φορές την εβδομάδα, για διάστημα μεγαλύτερο των 3 εβδομάδων, τότε η διαταραχή θεωρείται χρόνια.

Τα συμπτώματα, αν δεν αντιμετωπισθούν έγκαιρα και κατάλληλα, έχουν την τάση να επιδεινώνονται με το χρόνο, περιορίζουν σημαντικά την ποιότητα ζωής και σχετικά σπάνια οδηγούν σε επιπλοκές, όπως στένωση οισοφάγου που προκαλεί δυσκολία στην κατάποση (**δυσφαγία**), αιμορραγία από το ανώτερο πεπτικό και σπανιότερα καρκίνο του οισοφάγου.

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ...

- ✓ Κατά την κατάκλιση να έχετε ανασηκωμένο τον κορμό και το κεφάλι, περίπου κατά 10-20 εκατοστά. Το μαξιλάρι απλώς κάτω από το κεφάλι μάλλον δεν βοηθάει.
- ✓ Να τρώτε τα γεύματά σας τουλάχιστον 2-3 ώρες πριν από κάθε κατάκλιση.
- ✓ Να προτιμάτε τα μικρά, τακτικά και ελαφρά γεύματα.
- ✓ Επιτρέπονται ή/και ανακουφίζουν: τόνος, σολομός, φακές, λαχανικά, ψωμί, βρώμη, αβγά, αμύγδαλα, μέλι, φρέσκα φρούτα (*μπανάνα, πεπόνι*), γιανούρι, γαλοπούλα, κ.ά.
- ✓ Τρώτε αργά την τροφή σας. Να πίνετε ήρεμα και αποφύγετε συζητήσεις και εντάσεις κατά τη διάρκεια των γευμάτων, για να μειώνεται η συσσώρευση αέρα στο στομάχι.
- ✓ Μετά τα γεύματα μασήστε τσίχλα, μαστίχα ή παστίλιες, με σκοπό την παραγωγή και κατάποση σιέλου, που δρα προστατευτικά στο βλεννογόνο του στομάχου.
- ✓ Αν είστε υπέρβαροι ή παχύσαρκοι, καταπολεμήστε την παχυσαρκία σας. Χάστε κιλά.
- ✓ Ακολουθείστε, όσο το δυνατόν, υγιεινό τρόπο ζωής και αθληθείτε συστηματικά.

ΤΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ...

- Τα στενά ρούχα στη μέση και τις σφιχτές ζώνες ή τους κηλεπιδέσμους.
- Τη μεταφορά και ανύψωση βαρέων αντικειμένων, ιδίως με γεμάτο στομάχι.
- Τις επικύψεις (*ιδίως μετά το γεύμα*) για να μην πιέζεται το στομάχι.
- Τη δυσκοιλιότητα και τις διατροφικές συνήθειες που την ευνοούν.
- Το κάπνισμα. Το κάπνισμα δεν προκαλεί ΓΟΠΝ, αλλά μπορεί να την επιδεινώσει.
- Την κατάκλιση αμέσως μετά το γεύμα και τα γεύματα αργά το βράδυ προ του ύπνου.
- Τα γρήγορα-βιαστικά γεύματα και τις μεγάλες μπουκιές.
- Ορισμένες τροφές, οι οποίες μπορεί να είναι ερεθιστικές για το πεπτικό, όπως:
 - ▶ Λιπαρά γεύματα, λαδερά, τηγανητά, πικάντικα, μπέικον, κόκκινες σάλτσες.
 - ▶ Σκόρδο, κρεμμύδι, ντομάτα, κέτσαπ, δυόσμος, μέντα, μπαχαρικά, κ.λπ.
 - ▶ Γάλα πλήρες, καφέ, σοκολάτα, επιδόρπια, σιροπιαστά γλυκά.
 - ▶ Αλκοολούχα ποτά, αεριούχα ποτά, χυμοί φρούτων (*πορτοκάλι, μούρα, κίτρο*).
- Τη χρήση οποιουδήποτε φαρμάκου, προτού συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

**Καλό είναι για οποιαδήποτε απορία ή επιπλέον πληροφορία,
να επικοινωνείτε με τον θεράποντα ή τον οικογενειακό σας γιατρό.**