

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ - ΚΝΙΔΩΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΙ...

1. Αβγό, καθώς και φαγητά, σάλτσες ή γλυκά που περιέχουν αβγό.
2. Αγελαδινό γάλα και τα συναφή προϊόντα που παράγονται με ή από αυτό (βούτυρο, βουτυρόγαλα, τυρί, τυρί κρέμα, τυρί cottage, κρέμα, παγωτό, γιαούρτι, πουτίγκα, κ.ά.).
3. Σοκολάτες, σοκολατάκια και σοκολατούχα ροφήματα, καθώς και γλυκά ή εδέσματα τα οποία περιέχουν σοκολάτα.
4. Ξηροί καρποί (φιστίκια, φουντούκια, αμύγδαλα, καρύδια).
5. Όσπρια (φακές, φασόλια, ρεβύθια, σόγια, γάλα σόγιας).
6. Χοιρινό και τα παράγωγα του (χοιρομέρι, ζαμπόν, μπέικον, λουκάνικο, σουβλάκια, σαλάμια, χάμπουργκερ, κ.ά.).
7. Μαλάκια (καλαμάρια, θράψαλα, σουπιές, χταπόδι, γαρίδες, αστακοί, καραβίδες).
8. Οστρακοειδή (μύδια, στρείδια, χτένια κ.λπ.).
9. Λαχανικά (ντομάτα, πιπεριά, αρακάς, σπανάκι, μαϊντανός, σέλινο).
10. Φρούτα (φράουλα, μπανάνα, ακτινίδιο, σταφύλι, σύκο, βερίκοκο, ροδάκινο).
11. Μπαχαρικά, μουστάρδα, κέτσαπ, μαγιονέζα, τουρσί, ξύδι.
12. Τροφές που περιέχουν πρόσθετα, συντηρητικά, τεχνητές χρωστικές και βελτιωτικά (όπως πατατάκια, γαριδάκια, ζαχαρωτά, καραμέλες, τσίχλες, κ.λπ.).
13. Αλκοολούχα ποτά. Φρουτοποτά ή ενεργειακά ποτά.
14. Ασπιρίνη ή ΜΣΑΦ. [Επιτρέπεται η παρακεταμόλη (*Depon, Panadol & Lonarid*)].
15. Αντιβιοτικά, αντιεπιληπτικά, αλλοπουρινόλη, ισονιαζίδη, βιταμινούχα σκευάσματα, νιασίνη, α-MEA, σκιαγραφικά, χημειοθεραπευτικά, μονοκλωνικά αντισώματα.

Τα ανωτέρω συστατικά δέον είναι να αποφεύγονται για διάστημα 10-15 ημερών μετά το επεισόδιο της αντίδρασης υπερευαισθησίας ή της εμφάνισης κνίδωσης ή εξανθήματος.



Καλό είναι για οποιαδήποτε απορία ή επιπλέον πληροφορία,
να επικοινωνείτε με τον θεράποντα ή τον οικογενειακό σας γιατρό.