

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΞΕΙΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑ

Η οξεία γαστρεντερίτιδα είναι τοπική προσβολή του εντέρου από παθογόνους μικρο-οργανισμούς (*βακτήρια, ιούς και παράσιτα*) και εκδηλώνεται συνήθως με εμέτους, διάχυτο κοιλιακό πόνο, αδυναμία, κακουχία, διάρροια (*συχνά βασανιστική*) και ενίοτε με πυρετό.

Οι περισσότερες ιογενείς γαστρεντερίτιδες (*rotavirus, norovirus, adenovirus*) είναι ήπιες και αυτοϊάσιμες. Δηλαδή, κάνουν τον «κύκλο τους» και τα συμπτώματα υποχωρούν μόνα τους. Ο ασθενής θα συνέλθει σύντομα και ομαλά, εφόσον ακολουθήσει τις εξής οδηγίες:

- Παραμονή στο σπίτι και ανάπαυση. Αποφυγή οποιαδήποτε εργασίας, ειδικά κοπιώδους.
- Χρησιμοποιούνται αντιδιαρροϊκά ή/και αντιεμετικά φάρμακα, μόνο στις περιπτώσεις που αυτό κριθεί αναγκαίο από τον ιατρό. (*Αποφυγή λήψης ισχυρών αντιδιαρροϊκών φαρμάκων, διότι μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα, όπως παράλυση ή νέκρωση εντέρου*).
- Αν εμφανιστεί πυρετός, τότε χορηγούνται απλά αντιπυρετικά (*παρακεταμόλη*). Αποφυγή Ασπιρίνης ή αντιφλεγμονωδών φαρμάκων, επειδή μπορεί να προκαλέσουν περισσότερα προβλήματα στο ήδη ερεθισμένο και πάσχον στομάχι ή έντερο (*π.χ. αιμορραγία*).
- Μέριμνα για αναπλήρωση απωλειών υγρών και ηλεκτρολυτών, πίνοντας νερό με φειδώ (*4-6 ποτήρια το 24ωρο*) και ηλεκτρολυτικά διαλύματα. Έτσι, αποφεύγεται η αφυδάτωση, η οποία αποτελεί τον βασικότερο κίνδυνο για όσους πάσχουν από οξεία γαστρεντερίτιδα.

Τροφές που απαγορεύονται

Αρχικά, πρέπει να αποφεύγονται συστατικά ή τροφές, όπως: Γάλα, βούτυρο, παγωτό, τυρί (*ακόμη και επί μη δυσανεξίας στη λακτόζη*), αλκοόλ, ζάχαρη και συνθετικές γλυκαντικές ύλες, τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, φυτικές ίνες (*λάχανο, φασόλια, μπρόκολο, κουνουπίδι, σπανάκι*), πικάντικα φαγητά, αλλαντικά, καρυκεύματα, κρεμμύδια, καλαμπόκι, ξηροί καρποί, ψωμί με σπόρους, σφολιάτες, πολύ ζεστά ή πολύ κρύα φαγητά ή ροφήματα (*προτιμούμε φαγητά και ροφήματα σε θερμοκρασία δωματίου ή έστω χλιαρά*).

Τροφές που επιτρέπονται

Το ακρωνύμιο **BRAT** (**B**ananas, **R**ice, **A**pples, **T**oast - μπανάνες, ρύζι, μήλα και τοστ), υποδηλώνει - σε γενικές γραμμές - ποιες τροφές επιτρέπονται κατά την οξεία φάση της νόσου. Τα τρόφιμα αυτά θεωρούνται ήπια, επομένως δεν επιδεινώνουν τα συμπτώματα. Παράλληλα, συμβάλλουν στη σύσφιξη των κοπράνων. Έτσι, προσέχουμε να σιτίζουμε τον ασθενή αργά, χωρίς βιασύνη· αρχικώς με υδαρείς τροφές και μετά από 24-48 ώρες και με στερεές τροφές.

Γενικά, στην οξεία φάση της γαστρεντερίτιδας, επιτρέπονται τα εξής:

- | | |
|---|---|
| ✓ Ηλεκτρολυτικά διαλύματα. | ✓ Βραστό κοτόπουλο (<i>στήθος</i>). |
| ✓ Μήλο (<i>χωρίς φλούδα</i>) & χυμός του. | ✓ Σούπα κοτόπουλο - μοσχάρι ή φιδέ. |
| ✓ Μπανάνα & χυμός της. | ✓ Ρύζι (<i>λευκό</i>), λαπάς. Noodles ρυζιού. |
| ✓ Τσάι, τίλιο, χαμομήλι. | ✓ Αυγά βραστά (<i>σφιχτά</i>). |
| ✓ Γιαούρτι χωρίς πέτσα. | ✓ Πατάτες βραστές (<i>λευκές</i>). |
| ✓ Φρυγανιές, κράκερς. | ✓ Καρότα καλοψημένα. Μανιτάρια. |
| ✓ Τοστ (<i>λευκό ψωμάκι</i>). | ✓ Κολοκύθι. Βρώμη. |

Όταν υποχωρήσουν οι έμετοι, χορηγούνται υγρά, σταδιακά και σε μικρές ποσότητες. Φαρμακευτικά διαλύματα (*Almora, Rizolyte, Dextrolyte plus, Eifron ores pro, Prodefen Hydra, κ.ά.*) τα οποία περιέχουν ηλεκτρολύτες (*Κάλιο, Νάτριο, Ασβέστιο, Χλώριο κ.λπ.*), θα βοηθήσουν τον οργανισμό να αναπληρώσει ικανοποιητικά τους απολεσθέντες βασικούς ηλεκτρολύτες, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την ομαλή λειτουργία του και την ομοιοστάση.

Καλό είναι για οποιαδήποτε απορία ή επιπλέον πληροφορία, να επικοινωνείτε με τον θεράποντα ή τον οικογενειακό σας γιατρό.