

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΥΕΡΕΘΙΣΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ

Το Σύνδρομο του Ευερέθιστου Εντέρου (ΣΕΕ) αποτελεί μία συχνή λειτουργική διαταραχή της κινητικότητας του παχέος εντέρου, η οποία έχει άμεση σχέση με το άγχος (stress) και τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Αποτελεί δε τη συχνότερη πάθηση του παχέος εντέρου.

Χαρακτηρίζεται από τον συνδυασμό συνεχούς ή παροξυσμικού άτυπου κοιλιακού άλγους, δυσλειτουργίας του παχέος εντέρου, δυσκοιλιότητας, διάρροιας, δυσπεπτικών συμπτωμάτων (μετεωρισμός, δυσπεψία, ναυτία, ανορεξία, κ.ά.) και διάφορων βαθμών άγχους ή κατάθλιψης.

Το Σύνδρομο του Ευερέθιστου Εντέρου φαίνεται να οφείλεται σε τέσσερις βασικές αιτίες: το άγχος ή μια οξεία αγχώδη κατάσταση, την ανεπαρκή πρόσληψη φυτικών ινών και υγρών, τις τροφικές αλλεργίες και τα γεύματα με πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε γλυκόζη.

Ο ασθενής με ΣΕΕ (αναλογία Γ/Α $\approx$ 2/1) πρέπει να προσέχει τη διατροφή του, ιδιαιτέρως τις φυτικές ίνες και τα λιπαρά. Επίσης, να αποφεύγονται τροφές που προκαλούν αυξημένη παραγωγή αερίων στο παχύ έντερο (όσπρια, λάχανο, κουνουπίδι, μπρόκολο, κρεμμύδι, κ.λπ.).

Η ειδική δίαιτα για το ΣΕΕ θα πρέπει να τηρείται για όλη τη ζωή του ασθενούς.

ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ...

1. Μικρά και συχνά γεύματα. Άφθονα υγρά σε μορφή νερού, ροφημάτων και χυμών.
2. Κρέας, ψάρι, πουλερικά άπαχα, χωρίς περιορισμό. Πλέον κατάλληλα είναι τα βραστά που δεν έχουν τσιγαριστεί, καθώς και ψητά φούρνου ή σχάρας, χωρίς καρυκεύματα.
3. Ψωμί κατά προτίμηση λευκό. Προτιμούμε αρτοσκευάσματα χωρίς γλουτένη.
4. Αμυλώδη τρόφιμα και καλά βρασμένες πατάτες.
5. Το γάλα, η φέτα, τα λευκά τυριά και τα λοιπά γαλακτοκομικά επιτρέπονται μόνο εάν γίνονται ανεκτά. Για να το διαπιστώσουμε αυτό, πίνουμε μια κούπα κρύο ή χλιαρό γάλα. Αν μας προκαλέσει φούσκωμα, πόνο ή διάρροια, πρέπει να τα αποφεύγουμε.
6. Βραστές σαλάτες, σε μικρή ποσότητα.
7. Βραστά λαχανικά, μόνον αυτά που γίνονται ανεκτά. Ντομάτα χωρίς φλούδα.
8. Φρούτα, σε μέτρια ποσότητα, υπό μορφή κομπόστας ή και ωμά εφόσον είναι μαλακά. Στα ωμά φρούτα (γιαρμάδες, ροδάκινα, νεκταρίνια) πρέπει να αφαιρείται η φλούδα.
9. Αφεψήματα. Η μέντα γενικά θεωρείται ευεργετική.

ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΙ...

1. Λιπαρά και τηγανητά φαγητά (λουκάνικα, μπέικον, πίτσα, κίτρινο τυρί, κ.ά.).
2. Όσπρια, φασόλια, ρεβίθια και συμπυκνωμένο πίτουρο (All Bran).
3. Κρεμμύδι, σκόρδο, καυτερές πιπεριές, μπαχαρικά.
4. Μαύρο ψωμί. Δημητριακά με φλοιό. Ξηροί καρποί και αποξηραμένα φρούτα.
5. Χυμός ντομάτας και κόκκινες ή πικάντικες σάλτσες.
6. Αναψυκτικά του εμπορίου (σόδα, sprite). Καφές, τσάι, αλκοολούχα ποτά.
7. Σκληρά λαχανικά, ρίζες (π.χ. λάχανο, αγγούρι, μπρόκολο, κουνουπίδι, πράσο, κ.ά.).
8. Εσπεριδοειδή. Σκληρά φρούτα (μήλα) ή με σπόρους (σταφύλια, σύκα, φράουλες).
9. Υποκατάστατα ζάχαρης (φρουκτόζη, μαλτόζη, σορβιτόλη, ασπαρτάμη).
10. Φάρμακα (ασβέστιο, μαγνήσιο, σίδηρος, αντιβιοτικά, ΜΣΑΦ, μεθορμίνη, οπιοειδή).

**Καλό είναι για οποιαδήποτε απορία ή επιπλέον πληροφορία,
να επικοινωνείτε με τον θεράποντα ή τον οικογενειακό σας γιατρό.**