

ΟΔΗΓΙΕΣ, ΤΡΟΦΕΣ & ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΚΟΥΜΑΡΙΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΩΝ

Γενικές οδηγίες για τη λήψη κουμαρινικών αντιπηκτικών

1. Προτρέπουμε τον ασθενή να λαμβάνει τα φάρμακα την ίδια ώρα, κάθε ημέρα.
2. Προτρέπουμε τον ασθενή να μιλήσει με τον γιατρό προτού λάβει φάρμακα τα οποία δεν του έχουν συνταγογραφηθεί· ιδίως όσα περιέχουν Ακετυλοσαλικυλικά (ASA), ΜΣΑΦ, αντιβιοτικά ευρέως φάσματος (μειώνουν τη βιταμίνη Κ) ή φάρμακα που επηρεάζουν τη ροή του αίματος.
3. Προτρέπουμε τον ασθενή να μιλήσει με τον οικογενειακό του γιατρό για τα φάρμακα που λαμβάνει, ώστε να γνωρίζει κάθε πότε πρέπει να υποβάλλεται σε εξετάσεις αίματος.
4. Προτρέπουμε τον ασθενή να επικοινωνήσει με τον γιατρό ή με το φαρμακοποιό προτού λάβει οποιαδήποτε βιταμίνη, συμπληρώματα διατροφής, ροφήματα ή άλλα βιολογικά προϊόντα. Επίσης, να διαβάζει, πάντοτε, προσεκτικά τις οδηγίες και τα συστατικά του σκευάσματος που πρόκειται να χρησιμοποιήσει και για οποιαδήποτε απορία να επικοινωνεί με τον γιατρό.
5. Προτρέπουμε τον ασθενή να είναι πάντα σε ετοιμότητα για εμμένουσα αιμορραγία μετά από τραυματισμό ή για σημάδια αιμορραγίας και να ειδοποιεί άμεσα τον γιατρό ή να προβαίνει σε εργαστηριακό έλεγχο (INR, PT, aPTT), εφόσον εμφανίσει σημεία ή συμπτώματα, όπως:
 - Αίμα στα ούρα (μακροσκοπική ή μικροσκοπική αιματουρία) ή στα κόπρανα.
 - Αιμορραγία από τη μύτη, τα ούλα ή αιμόπτυση.
 - Νέα, μεγάλης ποσότητας και παρατεταμένη κολπική αιμορραγία.
 - Συχνές και σοβαρές εκχυμώσεις (μελανιές) ή διάσπαρτες μικρές πετέχειες στο δέρμα.
 - Έντονη κεφαλαλγία, ζάλη, θάμβος όρασης, αδυναμία, υπνηλία ή σοβαρή δύσπνοια.
6. Αποτρέπουμε τον ασθενή να συμμετέχει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα ή άθλημα τα οποία μπορεί να τον οδηγήσουν σε σοβαρό τραυματισμό ή αποδιοργάνωση της υγείας του.
7. Συμβουλευόμαστε τον ασθενή να μην επιχειρεί δραστικές αλλαγές στη διατροφή του, όπως π.χ. να μην καταναλώνει μεγάλες ποσότητες από πράσινα, φυλλώδη λαχανικά και να μην επιχειρήσει να ελαττώσει το βάρος του με σκευάσματα ή δίαιτες χωρίς να ρωτήσει τον γιατρό.

Είναι σημαντικό, ένας ασθενής ο οποίος λαμβάνει κουμαρινικά (π.χ. *Sintrom*) να μην αποκλείσει από τη διατροφή του τις τροφές που περιέχουν βιταμίνη Κ, αλλά να προσπαθεί να καταναλώνει καθημερινά τις ίδιες ποσότητες σε βιταμίνη Κ, χωρίς μεγάλες διακυμάνσεις, ώστε να διατηρεί επίπεδα τιμών INR $\approx$ 2,0-3,0 (ή επίπεδα INR $\approx$ 2,5-3,5 ως επί εντατικής αντιπηκτικής αγωγής). Έτσι, προτείνεται διαίτα με περιεκτικότητα βιταμίνης Κ περίπου 70-140 mg/ημέρα.

Πίνακας με τις τροφές που έχουν την υψηλότερη περιεκτικότητα σε βιταμίνη Κ.

ΤΡΟΦΗ	Μέση περιεκτικότητα βιταμίνης Κ σε μg / 100 gr.
Λάχανο κατσαρό. Natto.	850-1000
Σπανάκι μαγειρεμένο. Σέσκουλα ωμά.	850
Τσάι πράσινο.	720
Γογγύλι (Ρέβα).	650
Φύλλα μουστάρδας.	600
Σέσκουλα βραστά. Λαχανίδες.	570
Μπρόκολο βραστό. Παντζαρόφυλλα.	400
Κρεμμύδι πράσινο.	220
Σογιέλαιο.	200
Μαρούλι ωμό.	180

Λάχανο Βρυξελλών.	120-140
Συκώτι μοσχαρίσιο. Μπρόκολο ωμό.	80-100
Σπαράγγια, ραδίκι, κάρδαμο, βρώμη.	60-80
Αρακάς, αβοκάντο, αγγούρι, κόλιανδρος, ντομάτα, ξινολάχανο, σέλινο, φασόλια, μπέικον.	30-60

ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΥΜΑΡΙΝΙΚΩΝ

- Αλκοόλ (χρόνιος αιθυλισμός)
- Αλοπεριδόλη
- Αντισταμινικά
- Αντισυλληπτικά
- Αζαθειοπρίνη
- Βιταμίνη B12
- Βιταμίνη C (υψηλές δόσεις)
- Βιταμίνη Κ
- Βαρβιτουρικά
- Γκριζεοφουλβίνη
- Διουρητικά



INR

- Καρβαμαζεπίνη
- Καπνός
- Ρανιτιδίνη
- Ριφαμπικίνη
- Σπιρονολακτόνη
- Σουκραλφάτη
- Τραζοδόνη
- Υδαντοΐνη
- Χολυστεραμίνη
- Χλωράλη ένυδρη
- Χλωροδιαζεποξείδιο

ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΥΜΑΡΙΝΙΚΩΝ

- Αλκοόλ (οξύς αιθυλισμός)
- Ασπιρίνη
- Αντιόξινα
- Αλλοπουρινόλη
- Αμινογλυκοσίδες
- Αναστολείς ΜΑΟ
- Αντικαταθλιπτικά
- Αμιωδαρόνη
- Αμπικιλίνη
- Ανοσοκατασταλτικά
- Αναβολικά στεροειδή
- Βιταμίνη Ε
- Γλυκαγόνη
- Δικλοφενάκη
- Διπυριδαμόλη
- Εμβόλιο γρίπης
- Ερυθρομυκίνη
- Θυροξίνη
- Ινδομεθακίνη
- Ισονιαζίδη
- Κινιδίνη
- Κινολόνες
- Κεφαλοσπορίνες



INR

- Κλοφιβράτη
- Κορτικοστεροειδή
- Καθαρτικά
- Λοβαστατίνη
- Μετρονιδαζόλη
- Μερκαπτοπουρίνη
- Μεθοτρεξάτη
- Μακρολίδες
- Ναλιδιξικό οξύ
- Ομεπραζόλη
- Πενικιλίνη
- Παρακεταμόλη
- Σουλφοναμίδες
- Σουλφοπυραζίνη
- Σαλικυλικά
- Σιμβαστατίνη
- Σιμετιδίνη
- Τετρακυκλίνη
- Τολβουταμίδη
- Ταμοξιφαίνη
- Φαινοπροφένη
- Χλωραμφαινικόλη
- Χλωροπρομαζίνη