

XI. ΑΝΤΙΔΟΤΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ

- ☛ Ενεργός άνθρακας: *Toxicarb*, oral. susp. 200 mg/ml, vial x 250 ml.
- ☛ Atropine: $[C_{17}H_{23}NO_3]$ amp. 1 mg/ml.
- ☛ Acetylcysteine: *Parvolex/Flumil*, amp. 2 gr/10 ml.
- ☛ Bentonite: *Bentonitum*, pd. oral. susp. 100 gr/vial.
- ☛ Calcium Gluconate: $[C_{12}H_{22}CaO_{14}]$ amp. inj. sol. 10%.
- ☛ Dimercaprol: *BAL*, inj. sol. 100 mg/2 ml.
- ☛ Digitalis Antitoxin: *Digibind*, inj. sol. 38 mg/vial.
- ☛ Flumazenil: *Anexate/Demoxate*, amp. inj. sol. 0,5 mg/5 ml.
- ☛ Fomepizole (4-MP): vial 1,5 g/1,5 ml, amp. 100 mg/20 ml.
- ☛ Glucagon: *Glucagen*, inj. sol. 1 mg/amp.
- ☛ Ipecacuanha: *Ipecavom*, syr. 1000 mg/15 ml (fl. 15 ml).
- ☛ Methylene Blue: $[C_{16}H_{18}ClN_3S]$ inj. sol. inf. 1% (amp. 50 mg/5 ml).
- ☛ Naloxone: *Narcan*, amp. 0,4 mg/1 ml.
- ☛ Penicillamine: *Cupripen*, caps. 250 mg.
- ☛ Physostigmine: *Neostigmine*, amp. 2,5 mg/ml, *Prostigmine*, amp. 0,5 mg/ml.
- ☛ Pralidoxime: *Contrathion*, amp. inj. sol. 200 mg (10 ml).
- ☛ Silibinin: *Legalon*, inj. sol. 350 mg/vial, (μάλλον ηπατοπροστατευτικό, παρά αντίδοτο).
- ☛ Sodium thiosulfate: $[Na_2S_2O_3]$ amp. inj. sol. 25%, vial. 100 ml.
- ☛ Sodium bicarbonate: $[NaHCO_3]$ amp. 10 ml, inj. sol. 4%, inj. sol. 8%.
- ☛ Sugammadex: *Bridion*, inj. sol. 100 mg/ml.
- ☛ Vitamin K₁: *Konakion*, amp. 10 mg/1 ml.
- ☛ Idarucizumab: *Praxbind*, inj. sol. 2,5 gr/50 ml.
- ☛ Coagulation factor Xa (*recombinant inactivated*): *Adexxa*, inj. sol. 100 mg & 200 mg.



XII. ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ

Διαλύματα γλυκόζης & ηλεκτρολυτών, για παρασκευή υδατικών διαλυμάτων, προς αντιμετώπιση ηλεκτρολυτικών & μεταβολικών διαταραχών και καρδιολογικών αρρυθμιών.

- Water for injection, vial 1000 ml & amp. 10 ml.
- Almora Plus - (δεξτρόζη, άνυδρο κιτρικό νάτριο, NaCl, KCl, Zn, Mg).
- Glucose (Dextrose Water) inj. sol. 5% (D₅W), 10% (D₁₀W), vial 500 & 1000 ml.
- Dextrose Water 35% - [amp. 10 ml = 3,5 gr glucose, (D₃₅W)].
- Potassium chloride (KCl) 10% - [amp. 10 ml = 1 gr].
- Γλυκονικό Κάλιο: Sopa-K, oral sol. 1,56 gr/5 ml, fl x 200 ml.
- Gluconate calcium 10% - [amp. 10 ml = 1 gr Ca].
- Calcium chloride (CaCl₂) 10% - [amp. 10 ml = 3 gr Ca].
- Magnesium sulfate (MgSO₄), 10%, 25%, 50% [amp. 10 ml].
- Sodium chloride 15% (NaCl 15%) [amp. 10 ml = 1,5gr].
- Sodium chloride 0,9% (NaCl 0,9%) - [amp. 10 ml].
- Sodium chloride 0,9% (NaCl 0,9%) - (100, 250, 500, 1000 ml).
- NaCl 0,45% - D/W 2,5% ή ορός (1+1), (vial 500, 1000 ml).
- NaCl 0,18% - D/W 4% ή ορός (1+4), (vial 500, 1000 ml).
- Sodium Bicarbonate (NaHCO₃) 4% - [amp. 10 ml = 0,4 gr NaHCO₃].
- Ringer's Lactate, vial 500 ml, vial 1000 ml.
- Ringer's Solution, vial 1000 ml.
- Mannitol 20%. (Διατηρείται σε θερμό περιβάλλον, για αποφυγή κρυστάλλωσης του διαλύματος).

