

γ. Εξοπλισμός για την αντιμετώπιση πολυτραυματία και χειρουργικών - ορθοπαιδικών επειγόντων περιστατικών.

- Γάντια αποστειρωμένα και μη. Γάντια νιτριλίου μιας χρήσεως.
- Γάζες αποστειρωμένες διαφόρων μεγεθών. Ατραυματικά ψαλίδια (*MEUUT 2 Pack*).
- Βαμβάκι. Ταινίες υδρόφιλου βάμβακος (*Artiflex, orthoban*).
- Αυτοκόλλητες ταινίες επίδεσης. Ελαστικοί επίδεσμοι όλων των μεγεθών.
- Γυψοταινίες όλων των μεγεθών. Set δερματικών έλξεων.
- Ιμάντες ισχαιμης περίδεσης των άκρων (*Tactical Tourniquet Wide*) και ειδικοί ιμάντες σταθεροποίησης της πυέλου - PCCD (*Junctional Tourniquet SAM, T-Pod, κ.ά.*).
- Αιμοστατικά επιθέματα (*Celox, Chito-Sam, Quikclot Combat Gauze*).
- Εμποτισμένες με γέλη γάζες Burnshield & παιδιατρικό γιλέκο BurnVest για εγκαύματα.
- Λεπτοί μεταλλικοί νάρθηκες αλουμινίου διαφόρων μεγεθών (*Zimmer*).
- Νάρθηκες ακινητοποίησης άκρων διατεινόμενοι με αέρα (*air splints*).
- Ορθοπαιδικά κολλάρα (κηδεμόνες) αυχένος (*μαλακά & σκληρά τύπου Philadelphia*).
- Χειρουργικές μάσκες μιας χρήσεως. Πλαστικές περιτραχήλιες ποδιές μιας χρήσεως.
- Αποστειρωμένα χειρουργικά πεδία μιας χρήσεως (*με ή άνευ οπής*), διαφόρων μεγεθών ή υφασμάτινα χειρουργικά πεδία πρασίνου χρώματος για πολλαπλές χρήσεις (“πράσινα”).
- Γυαλιά αχρωματικά, για προστασία κατά την περιποίηση και συρραφή τραυμάτων.
- Ράμματα μετάξης, νάυλον και απορροφήσιμα όλων των μεγεθών.
- Λαβίδες ανατομικές και χειρουργικές. Χειρουργικά ψαλίδια, βελονοκάτοχα.
- Χειρουργικά μαχαιρίδια μιας χρήσης και νυστέρια μιας χρήσης.
- Κλίβανοι αποστείρωσης και διαφύλαξης χειρουργικού και επιδεσμικού υλικού.
- Τοπικά Αναισθητικά: διάλυμα Lidocaine: fl (50 ml), περιεκτικότητας: 2% (20 mg/ml) και σε εκνέφωμα (spray) sol. 10%. Διάλυμα προκαΐνης.
- Δύο μεγάλα ανοξείδωτα μεταλλικά δοχεία.
- Φορείο-στρώμα κενού, ακινητοποίησης και μεταφοράς πολυτραυματία (*CDK Spencer*).
- Κυλιόμενο τραπεζάκι (*Mayo*) για την τοποθέτηση του set συρραφής τραυμάτων.

δ. Υλικά για την αντιμετώπιση ουρολογικών περιστατικών.

- Ουροκαθετήρες (Latex Foley) όλων των μεγεθών (από 12 έως 22 fr).
- Ουροκαθετήρες (σιλικόνης Foley) όλων των μεγεθών (από 12 έως 22 fr).
- Ουροκαθετήρες τύπου Tiemann όλων των μεγεθών (από 14 έως 22 fr).
- Ουροσυλλέκτες (Απλοί μιας χρήσεως. Με κάνουλα. Και μηρού/περιπάτου).
- Αναλώσιμα υλικά: Γάζες. Λιδοκαΐνη. Betadine. Ράμματα (2.0, 3.0 μετάξης και nylon), βελονοκάτοχο, νυστέρια για τοποθέτηση και σταθεροποίηση ουροκαθετήρα Tiemann.

ε. Σακκίδιο με ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό, για αντιμετώπιση επειγόντων συμβάντων στο πεδίο, εκτός χώρου ΚΥ.

Είναι αυτονόητο ότι οι νόσοι, τα σύνδρομα, οι οξείες καταστάσεις υγείας ή οι σοβαρές κακώσεις και οι οξείες δηλητηριάσεις, που απειλούν άμεσα τη ζωή και απαιτούν ταχύτατη έναρξη θεραπευτικής αγωγής, επιβάλλουν την ύπαρξη κατάλληλων φαρμάκων, αντιδότων, εξοπλισμού και υλικών, στο Περιφερειακό Ιατρείο ή στο Κέντρο Υγείας, ανεξαρτήτως από την τυχόν σπανιότητά τους (π.χ: *αντίδοτα Οργανοφωσφορικών, ειδικές γάζες Burnshield, αιμοστατικά tourniquet, καθετήρας Sengstaken, αερονάρθηκες, ενέσεις Γλυκαγόνης, κ.ά.*).

Συχνά, θα χρειαστεί να μεταβούμε στο πεδίο, για να αντιμετωπίσουμε το «επείγον» και να διακομίσουμε τον βαρέως πάσχοντα ή πολυτραυματία στο ΤΕΠ του ΚΥ ή του νοσοκομείου. Για αυτό, ο εξοπλισμός και η οργάνωση του «**ειδικού σακιδίου επειγόντων**» αποτελεί υποχρέωση και ευθύνη των ιατρών του ΚΥ. Η συχνότητα χρήσης και ο ρυθμός κατανάλωσης των φαρμάκων και των υλικών του σακιδίου εξαρτάται από το μέγεθος του πληθυσμού της περιοχής ευθύνης του ΚΥ, τη συχνότητα των διακομιδών, την ορθή και επί ενδείξεων χρήση τους, αλλά κι από άλλες παραμέτρους (*εμπειρία ιατρών, ανταχή υλικών*).

Στη συχνότητα χρήσης είναι προφανές ότι θα αντανakλάται η σχετική συχνότητα των πιο κοινών διαγνώσεων που τίθενται σε ένα ιατρείο ΠΦΥ που αντιμετωπίζει μη επιλεγμένα περιστατικά Γενικής και Επείγουσας Ιατρικής στην ύπαιθρο ή σε ημιαστικό περιβάλλον.

Έτσι, σε μια μελέτη στον χώρο της ΠΦΥ, επί συνόλου 155 νοσημάτων, συμπτωμάτων, σημείων κι ασαφώς καθορισμένων καταστάσεων, τα κάτωθι βρέθηκαν ως τα πλέον συχνά. (*Παρατίθενται κατά σειρά συχνότητας και μέσα σε παρένθεση αναφέρονται τα απαιτούμενα φάρμακα και θεραπευτικά μέσα και υλικά, πολύ συνοπτικά και στοχευμένα*):

- ♦ **Οξεία βρογχίτιδα & παρόξυνση άσθματος - Παρόξυνση ΧΑΠ.**
(*Οξυγόνο με μικρή φορητή φιάλη, ρινικά γυαλάκια, μάσκες νεφελοποίησης, μάσκες Venturi, βρογχοδιασταλτικά - SABA, αντιχολινεργικά - SAMA, κορτικοστεροειδή - ICS, κ.ά.*).
- ♦ **Ζάλη και Ίλιγγος, με συνοδά συμπτώματα.**
(*Φάρμακα προς αντιμετώπιση του ίλιγγου, αντιεμετικά, Διαζεπάμη, H₂ αναστολείς, PPI's και φάρμακα με δράση στη μικροκυκλοφορία*).
- ♦ **Θλαστικά τραύματα άκρων και τριχωτού κεφαλής. Ορθοπαιδικές κακώσεις.**
(*Τοπικά αναισθητικά - ξυλοκαΐνη, αναλγητικά, αντισηπτικά, εξοπλισμός για χειρουργικά και ορθοπαιδικά περιστατικά: γάζες, ελαστικοί επίδεσμοι, νάρθηκες Zimmer, ράμματα, εργαλεία, μιάντες ισχαιμής περίδεσης - tourniquet, αιμοστατικές σκόνες, αντιτετανικοί οροί, κ.ά.*).
- ♦ **Γαστρεντερίτιδα (έμετοι/διάρροιες) μη καθορισμένης αιτιολογίας.**
(*Διαλύματα ηλεκτρολυτών, αντιεμετικά, γαστροπροστατευτικά, αντιδιαρροϊκά φάρμακα*).
- ♦ **Επιγαστραλγία ή κοιλιάγχη, με ή χωρίς συνοδό έμετο ή τάση προς έμετο.**
(*Αντιόξινα, H₂ αναστολείς, PPI's, αντιεμετικά - γαστροκινητικά, κεντρικά αντιεμετικά κατά των παρενεργειών της χημειοθεραπείας, σπασμολυτικά, παυσίπονα, σωλήνες Levin, κ.ά.*).
- ♦ **Αντίδραση Υπερευαισθησίας - Νυγμός εντόμου (σφήκα, μέλισσα, σκορπιός, κ.λπ.).**
(*Κορτικοστεροειδή με συστηματική και τοπική δράση, αντιϊσταμινικά, Αδρεναλίνη [αμπούλα ή Anapen], H₂ αναστολείς, αναλγητικά, μυοχαλαρωτικά, κλονιδίνη, γλυκαγόνη, ξυλοκαΐνη κ.ά.*).
- ♦ **Κολικός των ουροφόρων οδών - Νεφρολιθίαση.**
(*ΜΣΑΦ, οπιούχα αναλγητικά, σπασμολυτικά (βουτυλοσκοπολαμίνη), α-αναστολείς, κ.ά.*).
- ♦ **Οσφυαλγία - Ισχιαλγία (Μυοσκελετικής αιτιολογίας).**
(*ΜΣΑΦ, παυσίπονα, οπιούχα αναλγητικά, χαλαρωτικά των γραμμωτών μυϊκών ινών, κ.ά.*).
- ♦ **Αιφνίδια ή υποτροπιάζουσα ή εμμένουσα Κεφαλαλγία - Ημικρανία.**
(*ΜΣΑΦ, παυσίπονα, τριπτάνες, αντιεμετικά, μυοχαλαρωτικά, βενζοδιαζεπίνες, κ.ά.*).
- ♦ **Αγχώδεις καταστάσεις/ κρίσεις πανικού - Ψυχιατρικά επείγοντα.**
(*Βενζοδιαζεπίνες, Αντιψυχωσικά, φάρμακα αντιμετώπισης συστηματικών εκδηλώσεων*).
- ♦ Από τα νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος, συχνότερα εμφανιζόμενα είναι:
 1. **Αιφνίδια κολπική μαρμαρυγή με ταχεία κοιλιακή ανταπόκριση - Αρρυθμίες.**
(*Δακτυλίτιδα, Αμιοδαρόνη, Βεραπαμίλη, Βερνακαλάντη, Φλεκαϊνίδη, Ηπαρίνη ή LMWH*).
 2. **Στηθάγχη - Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου (OEM - STEMI).**
(*Οξυγόνο, UFH/LMWH/Φονταπαρινόξη, νιτρώδη-NTG, β-blockers, αναστολείς διαύλων ασβεστίου, αντιαιμοπεταλιακά: ασπιρίνη/ κλοπιδογρέλη/ τικαγρελόρη, Μορφίνη, κ.ά.*).
 3. **Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΑΕΕ) & παροδικό ισχαιμικό (ΠΙΕ/ΤΙΑ).**
(*Οξυγόνο, αντιυπερτασικά: NTG / Κλονιδίνη / Λαβεταλόλη, γαστροπροστασία: PPI's και H₂ αναστολείς, αντιεμετικά, αντιεπιληπτικά, σωλήνες Levin, ουροκαθετήρες Foley, κ.ά.*).

- ♦ Από τα νοσήματα του πεπτικού συστήματος, τα παρακάτω τέσσερα (4) ήταν πρώτα σε συχνότητα και απαιτούν φάρμακα και υποδομή (εξοπλισμό) για την αντιμετώπισή τους:
 1. **Γαστρο-δωδεκαδακτυλικό έλκος**, με επικρατούν σύμπτωμα τον επιγαστρικό πόνο (αντιόξινα, αντιεμετικά, H_2 αναστολείς, PPI's, σπασμολυτικά, αναλγητικά, κ.ά.).
 2. **Κολικός χοληφόρων οδών** (σπασμολυτικά - βουτυλοσκοπολαμίνη, αντιεμετικά, PPI's, H_2 αναστολείς, ΜΣΑΦ, ενίοτε ναρκωτικά αναλγητικά: τραμαδόλη/πεθιδίνη, κ.ά.).
 3. **Πολφίτιδα - Οδοντικό απόστημα** (αναλγητικά, ΜΣΑΦ, γαρυφαλλέλαιο, αντιβιοτικά).
 4. **Δυσκοιλιότητα, με τη μορφή οξείας συμπτωματικής κοπρόστασης**, ιδιαίτερως σε ηλικιωμένα άτομα (διάλυμα κι εξοπλισμός για χαμηλό / υψηλό υποκλυσμό, υπακτικά).
- ♦ Από το δέρμα, η **δερματίτιδα εξ επαφής**, η δερματίτιδα από ουσίες που λαμβάνονται εσωτερικά, οι μικροτραυματισμοί, οι νυγμοί και οι εκδορές του δέρματος, καθώς και τα **μικρά επιφανειακά εγκαύματα**, αποτελούν την πλειοψηφία των έκτακτων συμβάντων (αντισταμινικά, κορτικοστεροειδή με τοπική ή με συστηματική δράση, gel ή αλοιφές/κρέμες αντισηπτικές, καταπραϋντικές, επουλωτικές, αναπλαστικές, γάζες φουσιδικού ή αργύρου κ.ά.).

