

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24^ο

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ & ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Π.Φ.Υ.



«Carpent tua roma nepotes».
«Οι απόγονοί σου θα δρέψουν τους καρπούς».

Βιργίλιος, 70-19 π.Χ.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ

Με τον εμβολιασμό επιδιώκεται η δημιουργία ειδικής ανοσολογικής άμυνας κατά μίας συγκεκριμένης νόσου. Στόχος των εμβολίων είναι η μίμηση της φυσικής λοίμωξης και η πρόκληση ανοσολογικής απάντησης, με σκοπό την πρόληψη της νόσησης, η οποία μπορεί να οδηγήσει στην πλήρη εκρίζωση ορισμένων λοιμωδών νόσων, όπως έγινε π.χ. με την ευλογιά.

Στην εποχή μας, κατά την παρασκευή των εμβολίων, κατά κύριο λόγο, επιδιώκεται:

- Το εμβόλιο να μην προκαλεί νόσο ή σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες.
- Να εξασφαλίζει μακροχρόνια ανοσία, κι αν είναι εφικτό για ολόκληρη τη ζωή.
- Ο εμβολιαζόμενος για μια νόσο να μη μεταδίδει τη νόσο αυτή σε επίνοσα άτομα.
- Το εμβόλιο να παρασκευάζεται σχετικά εύκολα, σε μεγάλες ποσότητες για τον πληθυσμό και να είναι δυνατή η μέτρηση της αντισωματικής απάντησης των εμβολιασθέντων.

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που μπορεί να προκληθούν από τα εμβόλια είναι συνήθως ελαφράς ή μέτριας έντασης και περιλαμβάνουν μέτριο ή υψηλό πυρετό, ερυθρότητα, άλγος τοπικά, ήπιο οίδημα στο σημείο του εμβολιασμού, καταβολή δυνάμεων, κακουχία, κνησμό, εξάνθημα, κεφαλαλγία, ήπια ζάλη και σπανίως γενικευμένη αλλεργική αντίδραση.

Η νόσηση από εμβόλια αναφέρεται πολύ σπάνια, είτε ως ατύχημα μετά από χορήγηση ατελώς εξασθενημένων ή αδρανοποιημένων εμβολίων, είτε μετά από τη χορήγηση ζώντων εξασθενημένων εμβολίων, όπως το BCG ή το Sabin, κυρίως σε ανοσοκατασταλμένα άτομα. Για αυτό τα εμβόλια από ζώντες εξασθενημένους ιούς ή μικρόβια πρέπει να αποφεύγονται στα άτομα με συγγενή ή επίκτητη διαταραχή του ανοσολογικού συστήματος.

Ο εμβολιασμός πρέπει επίσης να αναβάλλεται κατά τη διαδρομή οξέων εμπύρετων νοσημάτων, σε ασθενείς που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτικά φάρμακα και κατά την εγκυμοσύνη εφόσον δεν κριθεί απολύτως αναγκαίο.

Η αναβολή του εμβολιασμού κατά την εγκυμοσύνη αποτελεί γενική τακτική, όπως και για οποιοδήποτε άλλο φάρμακο, το οποίο δεν πρέπει να χορηγείται εάν δεν υπάρχει απόλυτη ένδειξη.

Επειδή όμως μέχρι σήμερα κανένα εμβόλιο δεν έχει ενοχοποιηθεί ότι προκαλεί οποιαδήποτε βλάβη στο έμβρυο, δεν συνιστάται η έκτρωση, αν εκ παραδρομής εμβολιασθεί μία έγκυος με οποιοδήποτε εμβόλιο.



Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μια καχύποπτη στάση του κοινού ως προς τους εμβολιασμούς, λόγω διασποράς ψευδών φημών και ειδήσεων από διάφορα μέσα ενημέρωσης, με αποτέλεσμα να έχει προκύψει αποδυνάμωση του «εμβολιαστικού τείχους» στον γενικό πληθυσμό, με απώτερη συνέπεια την επανεμφάνιση μικροεπιδημιών, ιδίως σε χώρες όπου το «αντιεμβολιαστικό κίνημα» έχει διαβρώσει τη συνείδηση του πληθυσμού.

Στους τρεις πίνακες που ακολουθούν απεικονίζονται οι ετήσιες οδηγίες και το πρόγραμμα των τακτικών και ειδικών εμβολιασμών, για παιδιά και εφήβους, καθώς και για ενήλικες.

- ▶ Στον πίνακα 1, απεικονίζεται το εμβολιαστικό πρόγραμμα, για παιδιά κι εφήβους, όπως έχει προταθεί για τη χώρα μας, από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, για το έτος 2023.
- ▶ Στον πίνακα 2, απεικονίζεται το εμβολιαστικό πλάνο, για τους ενήλικες, όπως έχει προταθεί για την Ελλάδα, από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, για το έτος 2025 (για όσους έχουν παραλείψει τον τακτικό εμβολιασμό στην παιδική ηλικία), αναλόγως της ηλικίας τους.
- ▶ Στον πίνακα 3, απεικονίζεται το εμβολιαστικό πρόγραμμα, για τους ενήλικες, όπως αυτό έχει προταθεί για την Ελλάδα, από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, κατά το έτος 2025, αναλόγως της κατάστασης της υγείας τους (π.χ. κύηση) ή κάποιας άλλης συννοσηρότητας (π.χ. ανοσοκαταστολή, ΧΝΑ, ασπληνία, χρόνιες καρδιοπάθειες, κ.λπ.).