

INFL (Vaxigrip, Fluarix, Influvac): Αδρανοποιημένο πολυδύναμο ολοκυτταρικό (whole virus) ή ακυτταρικό εμβόλιο κατά της γρίπης, που συνιστάται να γίνεται ετησίως, σε μία δόση και σε άτομα ηλικία άνω των 6 μηνών.

Το εμβόλιο αποτελείται από 3 ή και 4 κεκαθαρμένα και αδρανοποιημένα σε φορμαλδεΰδη στελέχη των υποτύπων του ιού της γρίπης (2 τύπου Α και 1 τύπου Β).

Η δυσκολία στην παρασκευή αποτελεσματικού εμβολίου γρίπης βρίσκεται στην αντιγονική αστάθεια του ιού και στα περισσότερα του ενός στελέχη που προκαλούν νόσο κάθε χρόνο. Εξάλλου, είναι γνωστό ότι η νοσηρότητα από γρίπη παρουσιάζει διαφορές από χρόνο σε χρόνο, αλλά και ανάλογα με το γεωγραφικό διαμέρισμα.

Το εμβόλιο διενεργείται πλέον χωρίς ιατρική συνταγή, από τα τέλη Οκτωβρίου και μετά, για το βόρειο ημισφαίριο, ενώ σε περιπτώσεις ανοσοκαταστολής πιθανώς να χρειαστεί 2^η δόση στις αρχές Φλεβάρη. Σε περίπτωση αλλαγής των εκάστοτε επιδημιολογικών συνθηκών της χώρας (π.χ. επιδημία, πανδημία) οι συστάσεις εμβολιασμού μπορεί να αλλάζουν ανάλογα.

- * Ενδείκνυται μόνο στα παιδιά που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου να νοσήσουν σοβαρά από γρίπη (ανοσοκαταστολή, σύνδρομο Down, νευρομυκικά νοσήματα, κ.ά.).
- * Τα παιδιά ηλικίας < 8 ετών, που θα εμβολιασθούν για πρώτη φορά, θα λάβουν 2 δόσεις εμβολίου (0,25 ml < 3 ετών και 0,5 ml ≥ 3 ετών), με ελάχιστο μεσοδιάστημα 4 εβδομάδων.
- * Επιπλέον, συστήνεται ο εμβολιασμός για τη γρίπη όλων των ατόμων του οικογενειακού περιβάλλοντος βρεφών ηλικίας κάτω των 6 μηνών.
- * Επίσης, συνιστάται ετήσιος εμβολιασμός όλων των υγιών ατόμων ηλικίας > 60 ετών και των ατόμων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου ανεξαρτήτως ηλικίας.

Ενδείξεις εμβολιασμού κατά της γρίπης

Παρουσία ενός ή περισσότερων από τους κάτωθι επιβαρυντικούς παράγοντες ή νοσήματα:

- ▶ Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω.
- ▶ Ασθμα ή άλλες χρόνιες πνευμονοπάθειες.
- ▶ Καρδιακή νόσος με σοβαρές αιμοδυναμικές διαταραχές.
- ▶ Χρόνια νεφροπάθεια.
- ▶ Ανοσοκαταστολή (εξαιτίας νοσήματος, μεταμόσχευσης ή θεραπείας).
- ▶ Δρεπανοκυτταρική νόσος και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες.
- ▶ Παιδιά που λαμβάνουν ασπιρίνη μακροχρόνια (π.χ. για τη νόσο Kawasaki), ώστε να ελαττωθεί ο κίνδυνος εμφάνισης του συνδρόμου Reye μετά από γρίπη.
- ▶ Σακχαρώδης διαβήτης ή άλλο χρόνιο μεταβολικό νόσημα.
- ▶ Κλειστοί πληθυσμοί (ιδρύματα, γηροκομεία, κλινικές, ειδικά σχολεία, στρατόπεδα).
- ▶ Επαγγελματίες υγείας & εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας.
- ▶ Κτηνίατροι & επαγγελματίες που ασχολούνται με πουλερικά και χοίρους.
- ▶ Άτομα σε επαφή με βρέφη, παιδιά, ηλικιωμένους ή με ασθενείς με ανοσοκαταστολή.
- ▶ Άστεγοι.
- ▶ Γυναίκες των οποίων η κύηση συμπίπτει με την περίοδο γρίπης.*

Αντενδείξεις: Το εμβόλιο της γρίπης δεν πρέπει να χορηγείται στις εξής περιπτώσεις:

1. Κατά τη διάρκεια εμπύρετων νοσημάτων.
2. Σε άτομα με υπερευαισθησία στην νεομυκίνη ή στην γενταμικίνη ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό του εμβολίου.
3. Σε άτομα που εμφανίζουν αλλεργία στα αβγά (εξαιρούνται τα παιδιά με σοβαρή χρόνια πνευμονοπάθεια στα οποία το εμβόλιο πρέπει να χορηγηθεί μετά από απευαισθητοποίηση).

* Το εμβόλιο δεν αντενδείκνυται στις εγκύους, προτιμάται όμως να γίνεται μετά τους τρεις πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης. Αν και δεν έχει τεκμηριωθεί απόλυτα η ασφάλεια του εμβολίου της γρίπης κατά τη διάρκεια της κύησης (π.χ. η επίδραση στην ανάπτυξη του εμβρύου), η χορήγησή του κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης επιβάλλεται εφόσον αυτό κριθεί απολύτως απαραίτητο.

Το εμβόλιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και κατά την διάρκεια του θηλασμού.

Σύμφωνα με τις νέες οδηγίες (2018) συστήνεται όλες οι έγκυες γυναίκες να υποβληθούν σε εμβολιασμό κατά της γρίπης, άσχετα με το στάδιο της εγκυμοσύνης.