

Hep-A (Havrix, VAQTA): Αδρανοποιημένο ολοκυτταρικό εμβόλιο κατά της ηπατίτιδας Α. Το εμβόλιο, κυκλοφορεί σε δύο μορφές:

- ▶ το παιδικό εμβόλιο, για άτομα ηλικίας από 2 έως 18 ετών και
- ▶ το εμβόλιο των ενηλίκων, για άτομα ηλικίας > 18 ετών.

Χορηγείται σε οποιαδήποτε ηλικία άνω του 1^{ου} έτους σε 2 δόσεις, με ελάχιστο μεσοδιάστημα 6 μηνών, καθώς και σε όλες τις ομάδες αυξημένου κινδύνου για προσβολή από ηπατίτιδα Α.

Ομάδες υψηλού κινδύνου, είναι:

1. Ταξιδιώτες προς περιοχές υψηλής ενδημικότητας.
2. Προσωπικό και τρόφιμοι βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών.
3. Προσωπικό και τρόφιμοι ιδρυμάτων/σχολείων για παιδιά ή εφήβους με ειδικές δεξιότητες, στρατοπέδων, δομές προσφύγων, σωφρονιστικών ιδρυμάτων, κ.λπ.
4. Μετακινούμενοι πληθυσμοί (κυρίως οι μετανάστες και οι πρόσφυγες από περιοχές υψηλού κινδύνου και οι αθίγγανοι).
5. Ειδικές επαγγελματικές ομάδες (ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, υπάλληλοι αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων, υπάλληλοι καθαριότητας, χειριστές τροφίμων, κ.λπ.).
6. Τοξικομανείς, ομοφυλόφιλοι, εκδιδόμενα άτομα, άστεγοι.
7. Χρόνιοι φορείς ηπατίτιδας Β ή C, χρόνιοι ηπατοπαθείς, ανοσοκατασταλμένοι.

Οι παρενέργειες του εμβολίου είναι ήπιες, όπως μέτρια ερυθρότητα ή οίδημα στο σημείο της ένεσης σε ποσοστό < 4%. Γενικές αντιδράσεις, όπως κεφαλαλγία, κακουχία, πυρετός ή ζάλη, έχουν παρατηρηθεί στο 1-5% των εμβολιασθέντων.

Η ανοσία που επιτυγχάνεται με το εμβόλιο υπολογίζεται πολυετούς διάρκειας (τουλάχιστον 10ετούς) και καλύπτει ποσοστό > 95% των εμβολιαζόμενων.

DTaP (Infanrix): Εμβόλιο κατά της Διφθερίτιδας, Τετάνου, Κοκκύτη το οποίο περιέχει τα τοξοειδή (ή ατοξίνες) του κορνοβακτηριδίου της διφθερίτιδας και του κλωστηριδίου του τετάνου και μόνο αντιγόνα της *Bordetella pertussis* (όχι ολόκληρο τον μικροοργανισμό νεκρό, όπως τα παλαιότερα «ολοκυτταρικά» εμβόλια), για αυτό και καλείται «ακυτταρικό» κατά του κοκκύτη (acellular pertussis ή aP) εμβόλιο. Χορηγείται σε πέντε (5) δόσεις σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Η 4^η δόση μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον 15^ο μήνα της ζωής, εφόσον έχουν συμπληρωθεί 6 μήνες μετά την 3^η δόση. Η 5^η δόση γίνεται σε ηλικία 4-6 ετών.

Ενδείξεις: Για την προφύλαξη από τη διφθερίτιδα, τον τέτανο και τον κοκκύτη, για παιδιά από την ηλικία των 2 μηνών μέχρι και την ηλικία των 6 ετών.

Το DTaP διατίθεται στην Ελλάδα σε συνδυασμό με άλλα εμβόλια, ως 4-δύναμο DTaP/IPV, ως 5-δύναμο DTaP/IPV/Hib και ως 6-δύναμο DTaP/IPV/Hib/HepB, μέχρι ηλικίας 18 ετών.

* **Tdap (Boostrix):** Εμβόλιο κατά της διφθερίτιδας, τετάνου και κοκκύτη, με μικρότερη όμως δόση διφθεριτικής ατοξίνης, για παιδιά ηλικίας > 7 ετών. Το Tdap συνιστάται να διενεργείται ως επαναληπτική δόση σε ηλικία 11-12 ετών ή και αργότερα (σε ενήλικες, μέχρι την ηλικία των 64 ετών) και κατά προτίμηση όταν η οικογένεια αποκτά νεογέννητο. Συνιστάται να απέχει 5 χρόνια από το DTaP ή το Td για λιγότερες τοπικές αντιδράσεις, μπορεί όμως να χορηγηθεί με ελάχιστο μεσοδιάστημα και δύο ετών. Εάν δεν κυκλοφορεί το Tdap μόνο του (χωρίς IPV) χορηγείται το Td ενηλίκων. Οι υπόλοιπες δόσεις θα πρέπει να εκτελούνται κάθε 10 χρόνια με Td ενηλίκων.

* **Td (D.T.vax ή Diftavax):** Εμβόλιο κατά του τετάνου και διφθερίτιδας, με μικρότερη δόση διφθεριτικής ατοξίνης, μειωμένη στο 1/5-1/10 αυτής που περιέχει το DT που προορίζεται για παιδιά. Συνιστάται να διενεργείται σε άτομα ηλικίας > 27 ετών, κάθε 10 χρόνια μετά τη χορήγηση του Tdap που θεωρητικά διενεργήθη στην εφηβική ηλικία. Το εμβόλιο του τετάνου (*Imovax-tetano IΦET* και *Tetana IΦET*) μπορεί να γίνεται δια βίου με ασφάλεια.