

PCV-20 (Πνευμονιοκόκκου – *Prevenar-20*): Το Prevenar-20 καλύπτει 20 ορότυπους του *Str. pneumoniae*, συγκεκριμένα: *1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 8, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F, 33F*. Από αυτούς οι 13 περιλαμβάνονταν ήδη στο Prevenar-13, ενώ οι 7 επιπλέον (**με έντονη γραφή**) προστέθηκαν για ευρύτερη κάλυψη έναντι στελεχών υπευθύνων για αυξανόμενο ποσοστό πνευμ/κκικών λοιμώξεων, ειδικά σε ενήλικες και ηλικιωμένους.

- * Παιδιά ηλικίας 6 εβδομάδων έως 6 μηνών, λαμβάνουν κανονικά τις 4 δόσεις εμβολίου. Οι πρώτες 3 δόσεις χορηγούνται με μεσολάβηση ενός μήνα η καθεμιά. Η 4^η δόση είναι αναμνηστική και χορηγείται σε ηλικία 11 έως 15 μηνών.
- * Εναλλακτικά, όταν το Prevenar-20 χορηγείται στο πλαίσιο του συνήθους προγράμματος ανοσοποίησης, οι δύο δόσεις χορηγούνται στην ηλικία των 2 και 4 μηνών και ακολούθως χορηγείται 3^η αναμνηστική δόση στην ηλικία των 11 έως 15 μηνών.
- * Παιδιά ηλικίας 7 έως 11 μηνών πρέπει να λαμβάνουν αρχικά δύο δόσεις, μεταξύ των οποίων μεσολαβεί τουλάχιστον ένας μήνας και η 3^η δόση πρέπει να χορηγείται κατά το δεύτερο έτος της ηλικίας τους.
- * Παιδιά ηλικίας 12 έως 23 μηνών, πρέπει να λαμβάνουν δύο δόσεις, μεταξύ των οποίων μεσολαβούν τουλάχιστον δύο μήνες.
- * Παιδιά ηλικίας 2 έως 17 ετών, μπορεί να δοθεί 1 ή 2 δόσεις, αναλόγως του κινδύνου.
- * Το εμβόλιο χορηγείται και σε ενήλικες > 19 ετών, ανεξαρτήτως αν έχουν εμβολιαστεί ήδη με το Prevenar-13, ιδιαιτέρως σε άτομα που ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου, όπως αναγράφεται στον κάτωθι πίνακα του PPSV-23. Στην περίπτωση αυτή, δεν απαιτούνται επαναληπτικές δόσεις με το 23δύναμο εμβόλιο (PPSV-23).

PPSV-23 (Πνευμονιοκόκκου – *Pneumo 23 / Pneumovax*):

Μη συζευγμένο, πολυσακχαριδικό εμβόλιο (23δύναμο) κατά του Πνευμονιοκόκκου.

Κάθε 0,5 ml εμβολίου περιέχει 25 µg από κάθε πολυσακχαριδικό αντιγόνο του περιβλήματος 23 οροτύπων του *Streptococcus pneumoniae* (*1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F, 33F*), που είναι κυρίως υπεύθυνοι για τις λοιμώξεις.

- * Για την προφύλαξη από πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις ατόμων ηλικίας άνω των 2 ετών, με αυξημένο κίνδυνο νόσησης (*ασθενείς με συγγενή ή επίκτητη ανοσοανεπάρκεια, ασθενείς με σπληνεκτομή ή λειτουργική ασπληνία και άλλα σοβαρά χρόνια νοσήματα*).
- * Το εμβόλιο συνιστάται για τη διενέργεια επαναληπτικών δόσεων σε παιδιά που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου για εκδήλωση σοβαρής πνευμονιοκοκκικής λοίμωξης, εκτός από τα υγιή βρέφη και τα παιδιά ηλικίας 2-23 μηνών.
- * Ενήλικα άτομα ηλικίας > 65 ετών: 1 δόση άπαξ και αναμνηστικές δόσεις ανά 5 έτη.
- * Σε άτομα με ανοσοκαταστολή ή χρόνιες παθήσεις (*ΑΥ, ΣΝ, ΣΔ, κ.ά.*) χορηγείται πρώτα το PCV13 (*Prevenar*) και στη συνέχεια το PPSV23 (*Pneumovax*), τουλάχιστον 8 εβδομάδες αργότερα. Απαιτείται μόνο μία επαναληπτική δόση του PPSV23, μετά από 5 χρόνια.

Άτομα με αυξημένο κίνδυνο για σοβαρές πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις

- ▶ Μικρά παιδιά άνω των 2 ετών και ενήλικες > 60 ετών.
- ▶ Άτομα με συγγενείς αντισωματικές ανεπάρκειες (κυρίως σε έλλειψη της IgG₂).
- ▶ Άτομα που έχουν μολυνθεί με τον ιό HIV.
- ▶ Άτομα με επίκτητη ανοσοκαταστολή εξαιτίας νοσήματος ή θεραπείας ή άλλης (εκτός του HIV) ιογενούς λοίμωξης.
- ▶ Άτομα με μειονεκτική σπληνική λειτουργία ή ασπληνία.
- ▶ Άτομα με νεφρωσικό σύνδρομο ή χρόνια νεφρική ανεπάρκεια.
- ▶ Άτομα με σακχαρώδη διαβήτη.
- ▶ Άτομα με χρόνια συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια.
- ▶ Άτομα με χρόνιες πνευμονοπάθειες.
- ▶ Άτομα με διαφυγή εγκεφαλονωτιαίου υγρού από συγγενείς ή επίκτητες αιτίες.
- ▶ Άτομα με συγγενή ανοσολογική ανεπάρκεια.
- ▶ Άτομα με κοχλιακό εμφύτευμα.