

ΕΜΒΟΛΙΟ BCG (*Bacillus Calmette-Guerin*): Ζων εξασθενημένο εμβόλιο κατά της Φυματίωσης που περιέχει εξασθενημένα μυκοβακτηρίδια βοείου τύπου (*M. bovis*).

- * Σύμφωνα με τις πρόσφατες οδηγίες της Διεθνούς Ένωσης κατά της φυματίωσης και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, η χώρα μας δεν πληροί τις προϋποθέσεις για διακοπή του αντιφυματικού εμβολιασμού, ο οποίος εξακολουθεί να γίνεται σε ηλικία 6 ετών.
- * Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί κυρίως στον εμβολιασμό των παιδιών που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου (π.χ. μετανάστες, πρόσφυγες, αθίγγανοι, κ.ά.).
- * Προφύλαξη ατόμων τα οποία έρχονται σε επαφή με άτομα με ενεργό νόσο ή ατόμων που ζουν σε περιοχές με υψηλό δείκτη μόλυνσης.
- * Παράλληλα συνιστάται μαζικός προληπτικός έλεγχος με δερμοαντίδραση Mantoux στις ηλικίες 12-15 μηνών και 4-6 ετών (πριν τον εμβολιασμό με BCG) και στα ανεμβολίαστα παιδιά, στην ηλικία 11-12 ετών (αφού γίνει εκτίμηση της εμβολιαστικής τους κάλυψης).
- * Συνιστάται σε νηπιαγωγούς και δασκάλους πριν από την πρόσληψη, σε φοιτητές Ιατρικής, νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό και σε αλλοδαπούς από Ασιατικές και Αφρικανικές χώρες εγκατεστημένους στην Ελλάδα.

ΕΜΒΟΛΙΟ ROTAVIRUS (*Rotarix, Rotateq*): Πρόκειται για πόσιμο διάλυμα από ζώντες ιούς στελέχους R1X4414 με ορότυπους G₁, G₂, G₃, για την ανοσοποίηση νεογνών για την πρόληψη της γαστρεντερίτιδας από ροταϊούς διαφόρων τύπων.

- * Το εμβόλιο χορηγείται σε δύο δόσεις μεταξύ των οποίων πρέπει να μεσολαβεί διάστημα τουλάχιστον τεσσάρων (4) εβδομάδων. Η πρώτη δόση χορηγείται στο βρέφος μετά την ηλικία των έξι εβδομάδων. Ιδανικά, αμφότερες οι δόσεις πρέπει να χορηγούνται προτού το βρέφος συμπληρώσει τις 16 εβδομάδες και, σε κάθε περίπτωση, προτού συμπληρώσει τις 24 εβδομάδες ζωής.
- * Ο ίδιος κύκλος εμβολιασμού μπορεί να χορηγηθεί σε βρέφη που γεννήθηκαν έως και 13 εβδομάδες πρόωρα (από την ηλικία κύησης των 27 εβδομάδων).

Ο εμβολιασμός πρέπει να αναβάλλεται προσωρινά στα βρέφη τα οποία εμφανίζουν ξαφνικά υψηλό πυρετό, διάρροια ή έμετο.

ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΥΦΟΕΙΔΟΥΣ - Typhoid Vaccine: Υπάρχουν τρεις τύποι εμβολίου τυφοειδούς: α) Εναιώρημα νεκρών βακτηριδίων σαλμονέλλας τύφου και παρατύφου Α και Β για υποδόρια ή ενδοδερμική χορήγηση. β) Πολυσακχαριδικό εμβόλιο που περιέχει το αντιγόνο Vi της κάψας του βακτηριδίου και χορηγείται ενδομυϊκά με αποτελεσματικότητα 50-80% (*Typhim Vi, Typherix*). γ) Ζώντα εξασθενημένα βακτηρίδια σαλμονέλλας τύφου του στελέχους Ty-21a, για χορήγηση από το στόμα, που δεν κυκλοφορεί στην Ελλάδα (*PaxVax*).

- * Άτομα τα οποία ταξιδεύουν σε περιοχές γνωστές για την ύπαρξη της νόσου (ενδημικές και όπου οι συνθήκες υγιεινής, ιδιαιτέρως του νερού και της διατροφής, δεν είναι καλές. Ο εμβολιασμός πρέπει να ολοκληρωθεί τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν την αναχώρηση.
- * Άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με αποδεδειγμένους φορείς σαλμονέλλας τύφου.
- * Παρεντερικά: Αρχικός εμβολιασμός για ενήλικες και παιδιά ηλικίας > 10 ετών: Δύο δόσεις του 0,5 ml εκάστη, υποδορίως, με μεσοδιάστημα 4 εβδομάδων.
- * Παιδιά 6 μηνών-10 ετών: Δύο δόσεις των 0,25 ml εκάστη, υποδόρια, με μεσοδιαστήματα 4 εβδομάδων. Αναμνηστικές δόσεις κάθε 3 χρόνια, εάν η έκθεση είναι συνεχής.
- * Σε άτομα ηλικίας > 2 ετών: Μία δόση 0,5 ml ενδομυϊκώς. Αναμνηστικές ανά 2ετία.
- * Από του στόματος χορήγηση, σε άτομα ηλικίας > 6 ετών: Μία κάψουλα την 1^η, 3^η, 5^η και 7^η ημέρα, μετά από τα γεύματα, με λίγο χλιαρό ή κρύο ρόφημα (νερό, γάλα). Η κάψουλα θα πρέπει να καταπίνεται αμέσως και να μη μασιέται.