

Varicella - Zoster (Varilrix, Varivax, Shingrix): Πρόκειται για ζων εξασθενημένο εμβόλιο, κατά του ιού της Ανεμευλογιάς - Ζωστήρα (στέλεχος Oka), το οποίο παράγεται σε ιστοκαλλιέργειες ανθρώπινων διπλοειδών (MRC-5) κυττάρων.

- * Χορηγείται σε όλα τα παιδιά στην ηλικία των 12-18 μηνών (κατά προτίμηση μετά τον 15^ο μήνα), αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη ηλικία, εφόσον το άτομο δεν έχει νοσήσει.
- * Συνιστάται 2^η δόση του εμβολίου στην ηλικία των 4-6 ετών, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη ηλικία, αρκεί να απέχει τουλάχιστον 2 μήνες από την 1^η δόση.
- * Ο παιδίατρος ή ο προσωπικός ιατρός πρέπει να ελέγχει αν εκτελέστηκε ή όχι η 2^η δόση του εμβολίου, κι αν όχι τότε χορηγείται η 2^η δόση σε οποιαδήποτε ηλικία.
- * Όλοι οι επίνοσοι ενήλικες πρέπει να λαμβάνουν δύο (2) δόσεις του εμβολίου.
Δεν χορηγείται σε HIV-ασθενείς με ανοσοκαταστολή ($CD_4 < 200/\mu L$) ή σε ασθενείς που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτική θεραπεία ή κορτικοειδή ή υποβάλλονται σε ακτινοβολία.
- * Αντιθέτως όμως, πρέπει να εμβολιάζονται οι παρακάτω ομάδες πληθυσμού:
 1. Άτομα υψηλού κινδύνου για νόσηση (άτομα που πάσχουν από λευχαιμία, ή βρίσκονται σε ανοσοκαταστολή ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση οργάνων ή μυελού των οστών ή πάσχουν από χρόνια σοβαρά νοσήματα).
 2. Υγή άτομα του στενού περιβάλλοντος ασθενών υψηλού κινδύνου.
 3. Άτομα που διαβιούν ή εργάζονται σε περιβάλλον όπου υπάρχει αυξημένη πιθανότητα μόλυνσης από τον ιό, όπως είναι: α) το προσωπικό βρεφοκομείων, παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολείων, ιδρυμάτων, νοσοκομείων, β) οι φοιτητές και οι στρατιωτικοί γ) έφηβοι και ενήλικοι που συγκατοικούν με παιδιά.

* Το εμβόλιο **Shingrix** προστατεύει από την επαναδραστηριοποίηση του ιού VZV και όχι από την πρωτολοίμωξη. Ενδείκνυται για πρόληψη του έρπητος ζωστήρα και της μεθερπητικής νευραλγίας, σε ενήλικες > 60 ετών. Το σχήμα εμβολιασμού αποτελείται από δύο δόσεις των 0,5 ml η κάθε μία, στον δελτοειδή μυ. Η 1^η δόση ακολουθείται από μία 2^η δόση, μετά από 2 μήνες. Εάν απαιτείται ευελιξία στο εμβολιαστικό σχήμα, τότε η 2^η δόση μπορεί να χορηγηθεί σε διάστημα 2 ως 6 μηνών μετά την 1^η δόση. Ενδείκνυται ειδικά σε ασθενείς με ανοσοκαταστολή, καρκίνο, XNN, κ.λπ.

HPV (Gardasil 9): Πρόκειται για ανασυνδυασμένο εμβόλιο κατά του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, μπορεί να χορηγηθεί από την ηλικία των 9 ετών. Ο εμβολιασμός έναντι του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων ενδείκνυται σε αγόρια και κορίτσια για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, καθώς επίσης και των καρκίνων του στοματοφάρυγγα, του πρωκτού και του πέους, όπως και καλοήθων νοσημάτων σχετιζόμενων με τον ιό. Η μέγιστη προστασία επιτυγχάνεται εφόσον ο εμβολιασμός έχει ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της σεξουαλικής δραστηριότητας.

- * Στη χώρα μας κυκλοφορεί πλέον το εννεαδύναμο HPV-9 (6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58) εμβόλιο (Gardasil 9). Το εμβόλιο προλαμβάνει την εμφάνιση καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, του αιδοίου, του κόλπου και του πρωκτού από τα HPV στελέχη 16, 18, 31, 33, 45, 52 και 58, καθώς και την εμφάνιση κονδυλωμάτων από HPV στελέχη 6 και 11.
- * Ο εμβολιασμός για HPV συστήνεται για αγόρια και κορίτσια στην ηλικία 9-11 ετών. Σε περίπτωση που ο εμβολιασμός αμεληθεί, μπορεί να γίνει αναπλήρωση έως την ηλικία των 18 ετών (χωρίς να διασφαλίζεται η προφύλαξή τους, εάν ήδη έχουν μολυνθεί από τύπο του ιού που περιέχεται στο εμβόλιο, ιδιαίτερα αν έχουν αλλάξει 3-4 σεξουαλικούς συντρόφους).
- * Έναρξη εμβολιασμού σε άτομα ηλικίας < 15 ετών: 2 δόσεις, με μεσοδιάστημα 6 μηνών (σχήμα: 0, 6). Σε περίπτωση που οι 2 δόσεις διενεργηθούν με μεσοδιάστημα μικρότερο από 5 μήνες, τότε απαιτείται και 3^η δόση τουλάχιστον 3 μήνες μετά.
- * Έναρξη εμβολιασμού σε άτομα ηλικίας ≥ 15 ετών: 3 δόσεις (σχήμα: 0, 1 ή 2, 6 μήνες).
- * Σε ειδικές περιπτώσεις αυξημένου κινδύνου συνιστάται εμβολιασμός έναντι του HPV σε άτομα ηλικίας 9-26 ετών σε σχήμα 3 δόσεων (0, 1-2, 6 μήνες). Ιστορικό κονδυλωμάτων, θετικό Pap-test, θετικό HPV-DNA test, δεν αποτελούν αντένδειξη για τον εμβολιασμό.

Δε συνιστάται κατά την κύηση. Αν έχει χορηγηθεί κάποια δόση εμβολίου και εν συνεχεία γίνει αντιληπτή η εγκυμοσύνη δε συστήνεται διακοπή κύησης, αλλά οι υπόλοιπες δόσεις χορηγούνται μετά τον τοκετό.