


Πίνακας 2. Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων, ανά ηλικιακή ομάδα

Εμβόλιο ▼	Ηλικία ►	18 έως 26 ετών	27 έως 59 ετών	60 έως 64 ετών	65 έως 75 ετών	άνω των 75 ετών
[1] Γρίπης		1 δόση ετησίως (QIVe, QIVc)*	1 δόση ετησίως (QIVe, QIVc)*	1 δόση ετησίως (QIVe, QIVc)*	1 δόση ετησίως (QIVe, QIVc)*	1 δόση ετησίως (QIVe, QIVc)*
[2] Τετάνου, Διφθερίτιδας, Κοκκύτη (Td ή Tdap ή Tdap-IPV)		Αναμνηστική δόση 18 με 25 ετών με Tdap ή Tdap-IPV και στη συνέχεια Td ή Tdap κάθε 10 χρόνια				
[3] Ιλαράς, Παρωτίτιδας, Ερυθράς (MMR)		1-2 δόσεις ανάλογα με το ιστορικό εμβολιασμών (γεννηθέντες μετά το 1970)				
[4] Ανεμευλογιάς (VAR)		2 δόσεις (γεννηθέντες μετά το 1990)			2 δόσεις	
[5] Έρπητα ζωστήρα		2 δόσεις RZV σε ανοσοκατασταλμένα άτομα			2 δόσεις RZV	
[6] Ιού ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV)		2 ή 3 δόσεις** 18 με 45 ετών				
[7] Πνευμονιόκοκκου (PCV20)		1 δόση PCV20			1 δόση PCV20	
[8] Ηπατίτιδας Α (HepA)			2 δόσεις			
[9] Ηπατίτιδας Β (HepB)			3 ή 4 δόσεις βλέπε σχόλιο			
[10] Μηνιγγιτιδόκοκκου οροσμάδων A,C,W135,Y συζευγμένο (MenACWY)			1, 2 ή 3 δόσεις βλέπε σχόλιο			
[11] Μηνιγγιτιδόκοκκου οροσμάδας Β πρωτεϊνικό (MenB-4C ή MenB-fHbp)			2-3 δόσεις βλέπε σχόλιο			
[12] Αιμόφλου ινφλουέντζας τύπου b συζευγμένο (Hib)			1-3 δόσεις ανάλογα με τις ενδείξεις βλέπε σχόλιο			
[13] COVID-19		1 ή περισσότερες δόσεις ανάλογα με τις ενδείξεις βλέπε σχόλιο		1 δόση	2 δόσεις	
[14] Αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV)			1 δόση βλέπε σχόλιο		1 δόση	



* Βλέπε κείμενο για επεξήγηση συντομογραφιών

** Συνιστώνται σε ηλικίες μεταξύ 18 και 45 ετών, ανεξαρτήτως φύλου, σε συγκεκριμένες ομάδες αυξημένου κινδύνου.