


Πίνακας 3. Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων, ανά νόσο ή άλλη ένδειξη

Εμβόλιο ▼	Κύηση ή λοχεία σε κάθε κύηση	Ανοσοκαταστολή (πλην HIV)	Λοίμωξη με HIV (CD4+ κύτταρα)		Ασπληνία, μόνιμη έλλειψη τελικών κλασμάτων συμπληρώματος	Νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου σε αιμοδύλιση	Χρόνιες καρδιοπάθειες, πνευμονοπάθειες, βαρείς καπνιστές, χρόνιος αλκοολισμός	Χρόνιες παθήσεις του ήπατος	Σακχαρώδης διαβήτης	Υγειονομικό προσωπικό	MSM
			<200	≥200							
^[1] Γρίπης											
^[2] Tdap ή Tdap-IPV ή Td	1 δόση Tdap σε κάθε κύηση										
^[3] MMR											
^[4] VAR											
^[5] HZV (RZV)											
^[6] HPV γυναίκες	βλέπε σχόλιο										
^[6] HPV άνδρες											
^[7] PCV20											
^[8] HepA											
^[9] HepB											
^[10] MenACWY											
^[11] MenB											
^[12] Hib											
^[13] COVID-19											
^[14] Αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV)											



Συνιστώνται για ενήλικες που πληρούν το ηλικιακό κριτήριο ή δεν έχουν αποδεικτικό προηγούμενου εμβολιασμού ή νόσησης

Συνιστώνται για ενήλικες με πρόσθετους παράγοντες κινδύνου ή άλλες ενδείξεις

Αντενδείκνυται

Δε συνιστώνται

Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών - Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων 2025