

Πίνακας 1. Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων, 2023*

Εμβόλιο	Ηλικία ➡	Γέννηση	1	2	4	6	12	15	18	19-23	2-3	4-6	7-8	9-10	11-12	13-14	15-18
			μηνός	μηνών	μηνών	μηνών	μηνών	μηνών	μηνών	μηνών	ετών	ετών	ετών	ετών	ετών	ετών	ετών
Ηπατίτιδας Β (HepB)	- Έναρξη στη γέννηση	HepB	HepB	HepB	HepB	HepB, 3 ή 4 δόσεις συνολικά							HepB				
Διφθερίτιδας, Τετάνου, ακτινογραφικό Κοκκύτη (DTaP <7 ετών, Tdap ≥7	- Έναρξη αργότερα			HepB	HepB	HepB, 3 δόσεις συνολικά							HepB				
Πολιομυελίτιδας αδρανιστοποιημένο (IPV)				DTaP	DTaP	DTaP	DTaP	DTaP	DTaP	DTaP	DTaP	DTaP	Tdap ή Tdap-IPV	Tdap ή Tdap-IPV	Tdap ή Tdap-IPV	Tdap ή Tdap-IPV	Tdap ή Tdap-IPV
Αιμόφιλου ινφλουέντζας τύπου b (Hib)				IPV	IPV	IPV	IPV	IPV	IPV	IPV	IPV	IPV	IPV	IPV	IPV	IPV	IPV
Πνευμονιόκοκκου συζευγμένο (PCV)				Hib	Hib	Hib	Hib	Hib	Hib	Hib	Hib	Hib	Hib	Hib	Hib	Hib	Hib
Πνευμονιόκοκκου πολυσακχαριδικό (PPSV23)				PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV
Μηνιγγιτιδόκοκκου ορομαιάδας C συζευγμένο (MCC)							MCC			MCC, 1 Δόση							
Μηνιγγιτιδόκοκκου ορομαιάδων A,C,W135,Y συζευγμένο							1 δόση			MenACWY, 1 δόση							
Μηνιγγιτιδόκοκκου ορομαιάδας B προατενικό (MenB-4C ή MenB-fHbp)																	
Γιαράς, Παροπίτιδας, Ερυθράς (MMR)				Men ACWY	Men ACWY	Men ACWY				MenACWY, 1 δόση						MenACWY 1 Δόση	MenACWY, 1 Δόση
Ανεμευλογιάς (VAR)																	
Ηπατίτιδας Α (HepA)																	
Ιού ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV)																	
Φυματίωσης (BCG)		BCG															
Γρίπης																	
Ρότα ιού (RV1 ή RV5)																	

* Τα πολυδώναμια εμβόλια πρέπει να προτιμώνται των ολιγοδώνων.

Συστήνονται για όλα τα άτομα με την ανάλογη ηλικία που δεν έχουν ένδειξη ανοσίας.

Συστήνονται σε άτομα που καθυστερήσαν να εμβολιαστούν.

Συστήνονται σε άτομα που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου (βλέπε ομάδες αυξημένου κινδύνου).

Δεν συστήνονται.

