

Ενδείξεις για τη χορήγηση PCV13 και PPSV23 στους ενήλικες						
▼ Ιατρική ένδειξη	Ηλικία Εμβόλιο►	19 έως και 64 ετών		65 ετών και άνω		PPSV23
		PCV13	PPSV23	PCV13	PPSV23	
▼ Ιατρική ένδειξη	▼ Υποκείμενη ιατρική κατάσταση	Συστήνεται	Συστήνεται	Συστήνεται	Συστήνεται	Συστήνεται
	Καμία	Καμία από τις παρακάτω	OXI	OXI	NAI	NAI ≥1 χρόνο μετά το PCV13
	Ανοσοεπαρκή άτομα	Αλκοολισμός	NAI Εφ' όσον δεν έχει γίνει πριν	OXI	NAI Εφ' όσον δεν έχει γίνει πριν	NAI ≥1 χρόνο μετά το PCV13 ≥5 χρόνια μετά από οποιαδήποτε δόση PPSV23 σε ηλικία <65 ετών
		Χρόνιες καρδιοπάθειες				
		Χρόνια ηπατική νόσος				
		Χρόνια πνευμονοπάθεια				
		Κάπνισμα				
		Σακχαρώδης διαβήτης				
	Άτομα με ανατομική ή λειτουργική ασπληνία	Κοχλιακό εμφύτευμα	NAI	OXI	NAI Εφ' όσον δεν έχει γίνει πριν	NAI ≥8 εβδ. μετά το PCV13 ≥5 χρόνια μετά από οποιαδήποτε δόση PPSV23 σε ηλικία <65 ετών
		Διαφυγή ENY				
Ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς	Άτομα με ανατομική ή λειτουργική ασπληνία	Συγγενής ή επίκτητη ασπληνία	NAI	NAI ≥5 χρόνια μετά την πρώτη δόση του PPSV23	NAI Εφ' όσον δεν έχει γίνει πριν	NAI ≥8 εβδ. μετά το PCV13 ≥5 χρόνια μετά από οποιαδήποτε δόση PPSV23 σε ηλικία <65 ετών
		Δρεπανοκυτταρική νόσος ή άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες				
		Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια				
		Συγγενείς ή επίκτητες ανοσοανεπάρκειες (π.χ. έλλειψη IgG2)				
		Κακοήθειες νεοπλασίες				
	Ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς	HIV λοίμωξη				
		Νόσος Hodgkin				
		Ιατρογενής ανοσοκαταστολή				
		Λευχαιμία				
		Λέμφωμα				
		Πολλαπλούν μυέλωμα				
		Νεφρωσικό σύνδρομο				
		Μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου				