

1. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ (per os, po)

Η χορήγηση ενός φαρμάκου από το στόμα αποτελεί τη συνηθέστερη οδό χορήγησης στο σύνολο των ασθενών, με την περιπλοκότερη ωστόσο διαδρομή, μέχρι τους ιστούς. Τα φάρμακα τα οποία χορηγούνται από το στόμα απορροφούνται από το βλεννογόνο του στομάχου και του λεπτού εντέρου, ενώ η δράση τους εμφανίζεται μετά από μεγαλύτερο και μη προβλέψιμο χρονικό διάστημα από ό,τι από άλλες οδούς, ενώ έχει παρατεταμένες αλλά και λιγότερο ισχυρές επιδράσεις, συγκριτικά με τις άλλες οδούς χορήγησης.

Τα χάπια και οι κάψουλες χορηγούνται μαζί με λίγο νερό, για να διευκολύνουμε την κατάποσή τους, τα φάρμακα σε μορφή σκόνης διαλύονται σε μικρή ποσότητα νερού, ενώ τα σιρόπια πίνονται αυτούσια ή μετά από ανασύσταση με λίγο νερό. Οι επικαλυμμένες ταμπλέτες καλύπτονται από μία σκληρή επιφάνεια, που παρεμποδίζει την απορρόφηση μέχρι να φτάσουν στο στομάχι. Δεν πρέπει να μασιούνται, να σπάνε ή να συνθλίβονται.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη χορήγηση φαρμάκων δια της στοματικής οδού είναι το καλό επίπεδο συνείδησης και η συνεργασία του ασθενούς, προς αποφυγή φαινομένων πνιγμονής ή εισρόφησης. Η οδός αυτή χορηγήσεως αντενδείκνυται σε περιπτώσεις που ο ασθενής έχει προβλήματα κατάποσης, κάνει εμετούς ή εμφανίζει αποφρακτικά φαινόμενα στο πεπτικό σύστημα, δεν έχει αισθήσεις ή απαγορεύεται να λάβει οτιδήποτε από το στόμα.

Αντιθέτως, μπορεί να δοθεί φαρμακευτική ουσία από το στόμα, ακόμα και σε ασθενείς με μειωμένο επίπεδο συνείδησης ή με δυσκαταποσία ή ασυνέργεια, εφόσον επιτευχθεί η τοποθέτηση ρινογαστρικού σωλήνα Levin και μέσω του σωλήνα αυτού. Στις περιπτώσεις αυτές, ελέγχουμε τη βατότητα του σωλήνα Levin, καθώς και την σωστή θέση του εντός του στομάχου· και πριν χορηγηθεί το φάρμακο ο σωλήνας ξεπλένεται με 15-30 ml νερού (5-10 ml για παιδιά). Εν συνεχεία, χορηγούμε το φάρμακο αυτούσιο με μικρή σύριγγα αν πρόκειται για σιρόπι ή αν είναι φάρμακο σε σκόνη αφού γίνει υδατικό διάλυμα ή μετά από λειοτρίβηση και διάλυση σε μικρή ποσότητα νερού επί δισκίων, αναρροφούμε με σύριγγα και το εγχέουμε εντός του σωλήνα Levin. Μετά τη χορήγηση του φαρμάκου ξεπλένουμε το ρινογαστρικό σωλήνα ξανά με λίγο νερό και σφραγίζουμε το στόμιό του με πόμα. *(Αρκετές φορές, σε κωματώδεις ασθενείς η τοποθέτηση του σωλήνα Levin είναι δυσχερής. Σε αυτές τις περιπτώσεις η τοποθέτηση επιτυγχάνεται με τη χρήση λαρυγγοσκοπίου και λαβίδας Magill).*



Η **υπογλώσσια (sublingual) χορήγηση** χαπιών γίνεται λόγω της άμεσης απορρόφησης του φαρμάκου από το βλεννογόνο του στόματος, που του επιτρέπει να διαχυθεί άμεσα στο τριχοειδικό δίκτυο της περιοχής, με συνέπεια την ταχεία είσοδο αυτού στη συστηματική κυκλοφορία. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται το πρόβλημα της εντερικής απορρόφησης και η ουσία έχει ταχύ χρόνο έναρξης δράσης. Η χορήγηση μιας ουσίας υπογλωσσίως έχει το πλεονέκτημα ότι το φάρμακο παρακάμπτει το ήπαρ και δεν αδρανοποιείται από τον ηπατικό μεταβολισμό. Ο μεταβολισμός «πρώτης διόδου» από το ήπαρ περιορίζει την αποτελεσματικότητα πολλών φαρμάκων, όταν λαμβάνονται από το στόμα.

Παρότι ο βλεννογόνος του στόματος απορροφά εύκολα και διαθέτει καλή αιμάτωση, η υπογλώσσια χορήγηση φαρμάκων χρειάζεται να εκπληρώνει ορισμένες προϋποθέσεις:

- Το φάρμακο να διαλύεται γρήγορα και επαρκώς στο σιέλο.
- Ο ασθενής να έχει υγιή στοματικό βλεννογόνο και επαρκή ποσότητα σιέλου.
- Το φάρμακο να επιτυγχάνει φαρμακολογικό αποτέλεσμα σε μικρές δόσεις.
- Το φάρμακο να μην ενοχλεί ή να μην ερεθίζει τοπικά τον ασθενή.
- Ο ασθενής να είναι συνεργάσιμος και με καλό επίπεδο συνείδησης.

Η υπογλώσσια χορήγηση χρησιμοποιείται ευρέως για φάρμακα αντιυπερτασικά και αντιστηθαγικά, καθώς και για διάφορες άλλες ουσίες με ειδικές ενδείξεις, όπως:

- Αρτηριακή Υπέρταση: Καπτοπρίλη (*Normolose*), Νιφεδιπίνη (*Adalat*).
- Στηθάγχη: Δινιτρικός Ισοσορβίτης (*Pensordil*).
- Υπογλυκαιμία: Γλυκόζη.
- Ορμονοθεραπεία: Οιστρογόνα.
- Απεξάρτηση από ναρκωτικά: Βουπρενορφίνη/Ναλοξόνη (*Suboxone, Librozar*).