

Feuille de travaux dirigés 2 : Estimation ponctuelle

Exercice 1 (Moindres carrés dans le modèle linéaire simple):

On reprend l'exemple du dernier exercice de la feuille de TD précédente : Pour tout $i = 1, \dots, n$, on considère

$$X_i = a_i \theta + Z_i \quad (1)$$

où les Z_i sont des variables aléatoires indépendantes, de même loi $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$. Les coefficients a_i sont des variables déterministes connues (et non toutes nulles). Les paramètres θ et σ^2 sont inconnus. On observe $X = (X_1, \dots, X_n)$. On paramètre le modèle pour X par $\theta = (\theta, \sigma^2) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^+$.

1. Calculez l'estimateur de θ donné par la méthode des moindres carrés.
2. Comparez à l'estimateur du maximum de vraisemblance (voir le TD précédent).
3. On change la loi des bruits Z_i par une autre loi connue ; comment sont modifiés ces deux estimateurs ?

Exercice 2 (Méthode des moments):

On observe les durées de vie X_1, \dots, X_n de n cellules tirées au hasard avec remise (c'est-à-dire que les variables aléatoires X_1, \dots, X_n sont i.i.d.) dans une population contenant une proportion $\theta \in (0, 1)$ de cellules saines et $1 - \theta$ de cellules pathogènes. On modélise la durée de vie des cellules saines par une loi exponentielle de paramètre 1, c'est-à-dire par la loi de densité e^{-x} , $x \in \mathbb{R}_+$, par rapport à la mesure de Lebesgue sur \mathbb{R}_+ . On sait par ailleurs qu'une cellule pathogène a une durée de vie moyenne 2 fois moins grande qu'une cellule saine et suit aussi une loi exponentielle.

1. Les durées de vie X_1, \dots, X_n sont donc i.i.d. de loi $(P_\theta)_{\theta \in (0,1)}$ sur \mathbb{R}_+ . Expliquer pourquoi P_θ a pour densité

$$f_\theta(x) := \theta e^{-x} + 2(1 - \theta)e^{-2x}, \quad x > 0,$$

par rapport à la mesure de Lebesgue sur \mathbb{R}_+ .

2. Soit $p > 0$ un entier ; calculer $\mathbb{E}_\theta[X_1^p]$ et en déduire un estimateur $\hat{\theta}_{p,n}$ par la méthode des moments.

Exercice 3 (Loi Gamma):

Un opérateur mobile s'intéresse aux durées d'appel de ses clients. On observe les durées X_1, \dots, X_n de n appels, supposées indépendantes et modélisées chacune par une loi Gamma $P_\theta = \gamma(\alpha, \lambda)$, de paramètre $\theta = (\alpha, \lambda)$ avec $\alpha > 0$ et $\lambda > 0$ dont la densité est

$$\frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} \exp(-\lambda x) \mathbb{1}_{\mathbb{R}_+}(x),$$

où $\Gamma(\alpha)$ est la fonction Gamma. On s'intéresse au paramètre $\theta = (\alpha, \lambda) \in \Theta = (0, \infty)^2$.

1. Calculez l'estimateur de θ par la méthode du maximum de vraisemblance.
2. Calculez maintenant l'estimateur de θ par la méthode des moments. Commentez.