

Интегралы

@stewkk

5 марта 2021 г.

1. Неопределенные интегралы

1.1. Первообразные функции и неопределенные интегралы

Задачей дифференцирования являлось нахождение для функции ее производной. Поставим обратную задачу. Для каждой функции $f(x)$ найти $F(x)$, $F'(x) = f(x)$

$$\begin{aligned}f(x) &= x^5 \\F(x) &= \frac{x^6}{6} + 5 \\F'(x) &= f(x)\end{aligned}$$

Функция $F(x)$ является первообразной для $f(x)$, если $F'(x) = f(x)$ или $dF(x) = f(x)dx$. Т.е. первообразная для любой функции $f(x)$ существует с точностью до постоянного слагаемого.

Th 1. *если $F_1(x)$ и $F_2(x)$ являются первообразными для $f(x)$, то они отличаются на постоянное слагаемое.*

Доказательство.

$$\begin{aligned} & f(x), F_1(x), F_2(x) \\ & \Phi(x) = F_1(x) - F_2(x) \\ & \Phi'(x) = (F_1(x) - F_2(x))' \\ & \Phi'(x) = F_1'(x) - F_2'(x) \\ & \Phi'(x) = f(x) - f(x) \\ & \Phi'(x) = 0 \\ & (F_1(x) - F_2(x))' = 0 \\ & \Phi(x) = \text{const} \\ & \Phi(x) = C \\ & C = F_1(x) - F_2(x) \\ & F_1(x) = C + F_2(x) \end{aligned}$$

□

Определение. если мы рассмотрим множество всех первообразных, то можно вести речь о неопределенном интеграле:

$$\int f(x)dx = F(x) + C$$

Свойства неопределенного интеграла:

- 1) производная от неопределенного интеграла равна подынтегральной функции, а дифференциал неопределенного интеграла равен подынтегральному выражению:

$$\left(\int f(x)dx\right)' = (F(x) + C)'$$

$$\left(\int f(x)dx\right)' = F'(x) + C'$$

$$\left(\int f(x)dx\right)' = f(x) + 0$$

- 2) Постоянный множитель можно выносить за знак интеграла:

$$\int kf(x)dx = k \int f(x)dx$$

$$\left(\int kf(x)dx\right)' = \left(k \int f(x)dx\right)' = k\left(\int f(x)dx\right)' = kf(x)$$

3) Неопределенный интеграл суммы или разности нескольких выражений равен сумме или разности интегралов этих выражений:

$$\int (f(x) \pm g(x))dx = \int f(x)dx \pm \int g(x)dx$$

$$(\int (f(x) \pm g(x))dx)' = (\int f(x)dx \pm \int g(x)dx)'$$

$$f(x) \pm g(x) = (\int f(x)dx)' \pm (\int g(x)dx)'$$

$$f(x) \pm g(x) = f(x) \pm g(x)$$

1.2. Таблица основных неопределенных интегралов

$$1) \int kdx = kx + C$$

$$2) \int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$$

$$3) \int \sin x dx = -\cos x + C$$

$$4) \int \cos x dx = \sin x + C$$

$$5) \int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \operatorname{tg} x + C$$

$$6) \int -\frac{1}{\sin^2 x} dx = \operatorname{ctg} x + C$$

$$7) \int e^x dx = e^x + C$$

$$8) \int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C$$

$$9) \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$$

$$10) \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C$$

$$11) \int \frac{dx}{1+x^2} = \operatorname{arctg} x + C$$

Пример вывода(8):

Доказательство.

$$\int (\log_a x)' dx = \int \frac{1}{x \ln a} dx$$

$$\log_a x = \frac{1}{\ln a} \int \frac{1}{x} dx$$

$$\log_a x * \ln a = \int \frac{1}{x} dx$$

□

1.3. Примеры