Ein lokales Feld braucht seinen vollständigen Quellenpartner

R061: Der Partner folgt aus der ursprünglichen Quelle. Ein gegenüberliegender Ausschnitt allein reicht nicht.

Das ganze TFPT Gerüst bleibt der Bezugspunkt

P1 / P2 → E8 · Clocks · ganze Wörter und Erinnerung · Yukawa / Flavor · Alpha

Ausgangspunkt dieser Rechnung: die vorhandene freie Zweirandquelle

Ein Feld liegt im rechten lokalen Ausschnitt. Sein vollständiger Partner wird aus demselben Quellenkern bestimmt.

Nur der gegenüberliegende Ausschnitt

Enthält einen Teil der Korrelationen.
Die gemeinsame Teilquelle bleibt gemischt.
Für jedes geprüfte Ausschnittpaar unvollständig.

Der vollständige Partner aus der Umgebung

Aus dem ursprünglichen Kreuzblock eindeutig bestimmt.
Am konkret geprüften Feldmodus liegen seine Anteile
auf der anderen Seite und im Rest derselben Seite.

Nächster Herkunftsschritt: die vollständige ursprüngliche Quellenregel

R054: Unter seinen Mischungsvoraussetzungen bleiben zusätzliche Vierfeldkorrelationen.
Diese gemeinsam mit den geladenen Feldern erhalten, bevor Raumzeit und Gravitation daraus abgeleitet werden.

Blau: vorhandene Ausgangsdaten. Grün: mathematisch bestimmter freier Anschluss. Rot: ausgeschlossene Klasse. Orange: offen.