

TFPT / Universalraum: Update v1.6.9

15. September 2026 · ausschließlich Änderungen gegenüber v1.6.8

Was jetzt neu ist

Die zusätzliche Zusammensetzung kann in zwei kleinen Modellfamilien aus ihrer höheren Antwort zurückberechnet werden. Zugleich wurde der native kleine Eingriffsversuch vereinfacht und der relativistische Feldanschluss bis zu einem konkreten Kinetiktest vorangebracht. Eine vollständige TOE folgt daraus nicht.

1. Ursprüngliche Quelle und globale Wiederholung sind verschieden

W verwendet bereits 64 gemeinsame Fermionmoden; jeder erscheint in 15 der 480 Vertices. Eine Wiederholung des ursprünglichen passiven Clocks erzeugt keine sechs unabhängigen hellen Räume: Der Vereinigungsrang bleibt exakt **60 statt 360**. Die alte K4-/C16-Architekturauswahl gilt nur für ihren zusätzlichen Vertrag.

Die offene Regel betrifft die Überlappung mehrerer vollständiger Vorkommen. Zwei überlappende Charts $f^L = a$, $f^R = ca + \sqrt{1 - c^2}d$, mit je ursprünglichem W und eigener Bosonbank, liefern

$$P(L \rightarrow R; t) = 16g^4 c^4 t^4 + O(t^6).$$

Mit linker G-invarianter Bosonmischung und rechter Gesamt-Bosonzahl ist der Vergleich vollständig innerlich invariant. Die Fälle $c=3/5$ und $4/5$ behalten dieselben einzelnen lokalen W-Daten, haben aber verschiedene Antworten. Der vierte Energiemoment identifiziert die Überlappung:

$$I_4 = \frac{\mu_4 - 3\mu_1^2\mu_2 + 2\mu_1^4}{(\mu_2 - \mu_1^2)^2} = 1 + c^4.$$

Die ursprünglichen Quellstrahlen enthalten geeignete diskrete Überlappungszahlen. Ihre Zuordnung zu diesen globalen CAR-Charts ist jedoch noch nicht typisiert hergeleitet.

2. Gesamtes Zweiladungsspektrum gleich - höhere Dynamik verschieden

Eine andere Familie hat eine gemeinsame Bosonbank und normierte symmetrische Kopplung $M_A = C \otimes A_A$. Die verteilte Wahl $C = I_L/\sqrt{L}$ und die kollektive Wahl $C = J_L/L$ besitzen dieselben **gesamten N=2-Spektren**. Im N=3-Sektor gibt es bei L=2 und Energie Δ dagegen **0 beziehungsweise 64 Eigenzustände**, für $\Delta>0$ und $g\neq 0$. Das ist kein Port-Umbenennungseffekt.

Die allgemeine, inklusive komplexer Konvention direkt kontrollierte Identität ist

$$G_C^{(3)} = 8I - Q \otimes K, \quad Q = C^\dagger C, \quad \text{tr } K = 960.$$

Daher folgt die positive Umkehrung

$$Q = \frac{1}{960} \text{Tr}_{\text{intern}}(8I - G_C^{(3)}).$$

Benötigt wird der matrixaufgelöste Antwortoperator samt Tensorfaktordictionary, nicht nur eine Spektralliste. Die Anfangskrümmung der Bosonzahlantwort liefert dessen Erwartungswerte. Die Formel rekonstruiert Q innerhalb dieser Familie; sie wählt C nicht ursprünglich aus. Anders als im Zwei-Chart-Modell bleiben hier die lokalen Einzelkopienamplituden nicht unverändert.

3. Einfacherer Eingriff und richtiger Recorder

Der neue Bosonzahlimpuls $Z_b = e^{i\pi N_b}$ liegt auf dem gemeinsamen Dreizustandsraum in der dokumentierten Algebra aus X und Nb; der frühere Einzelmodenimpuls Z4 liegt außerhalb. Der extra Modenselektor entfällt.

Bei $g/\Delta=1/20$ steigt die unbedingte n5-Wahrscheinlichkeit von **0.0002194998817** auf **0.0005299169088**. Ein bereitgestellter neutraler Zeiger, der kohärent nur Paar/Boson unterscheidet, erhält alle Paarkohärenzen und liefert beim Ignorieren des Zeigers genau den halben Folgeeffekt.

Der Impuls deponiert $\Delta/54$, der Recorder $\Delta/108$ im System. Separate Schaltbarkeit, Zeigerkopplung, Anfangspräparation und terminale Auslese bleiben Zusatzressourcen. Der Impulsarm endet anders als in v1.6.8 nicht bosonfrei. Reine innere Symmetrieimpulse, die mit H und dem anfänglichen Empfänger kommutieren, können den verzögerten Effekt nicht erzeugen.

4. Minimaler Lorentzadapter - aber der freie Ansatz ist null

Für den gemischthändigen sechsdimensionalen Träger existiert mit einem Impuls P eine eindeutige lineare Auslese C_P in einen Weylspinor, Rang zwei für $P \neq 0$. Ein Einsetzer erfüllt $C_P J_P = 3 \det(P) I$. Zeitartig gibt es einen kovarianten Rückweg; lichtartig braucht dieser eine zusätzliche Referenz.

Der frühe Kinetiktest ist entscheidend: Für das Produkt eines freien masselosen selbstdualen Feldes und eines freien masselosen Weylfeldes verschwindet die Ableitungsauslese exakt, auch bei nichtkollinearen Impulsen. Ein sichtbarer Kanal benötigt eine wirklich berechnete andere Kinetik oder Feldzuordnung.

Eine wörtliche skalare Zuordnung von $b\ddagger f$ mit linkem f macht $b\ddagger$ links und b rechts. Dann ist $D=b\ddagger f$ gleichhändig rechts, $\chi\ddagger=b\ddagger\eta\ddagger f$ gemischthändig. Die Ladungen -1 und $+3$ bleiben verschieden. Native Fockmoden sind noch keine vollständigen lokalen Felder.

Unverändert offen und nächste Entscheidung

Alle T1-T8-Gesamtpflichten bleiben offen. Keine neue globale Grundzustandswahl, 3+1D-Raumzeit, chirales Maß oder dynamische Gravitation wurde bewiesen. Die v1.6.8-Polschränken wurden nicht verbessert und dürfen nicht auf die neuen Kompositionsmodelle übertragen werden.

Die nächsten Arbeiten sind jetzt scharf prüfbar: (1) Quellobjekte liefern die Einbettungen und Überlappung ohne Fit; (2) ein gemeinsamer autonomer Controller liefert den Impuls und Zeiger samt Energiebilanz; (3) derselbe Feldvertrag liefert ein nichtnulltes, vertexkonsistentes Matricelement. Erst anschließend trägt eine räumliche Skalierung.

Prüfung: 514 eigene exakt arbeitende Bedingungen und vier numerische Kontrollen je normalem/optimiertem Lauf, identische Ergebnisse. Separat 17 native und 1073 P0/P1-Quellguards. Vollständige Beweise, Annahmen und historische Hauptfassung stehen im gleichzeitig aktualisierten Hauptdokument und Prüfpaket.