
a
NOAA Survey Navassa (n = 102)
Vardi 2011 (Virgin Gorda) (n = 27)
Maurer et al. 2022 (n = 24)
Rogers & Muller 2012 (n = 69)
Vardi 2011 (Puerto Rico) (n = 130)
Bruckner & Bruckner 2001 (n = 105)
NOAA Survey Florida Keys (n = 2,955)
FUNDEMAR (n = 44)
NOAA Survey Curacao (n = 817)
Kuffner et al. 2020 (n = 53)
Garrison & Ward 2008 — Control (n = 45)
Rosales et al. 2024 (n = 58)
Ortiz-Prosper 2005 (n = 207)
Williams & Miller 2010 (n = 18)
Vardi 2011 (Jamaica) (n = 88)
Neely et al. 2022 (n = 2,625)
Ramos-Romero et al. 2025 (n = 200)
USGS USVI (n = 46)
Pausch et al. 2018 (n = 968)
Garrison & Ward 2008 — Relocated (n = 30)
Forrester et al. 2013 (n = 257)
Rogers et al. 1982 (n = 173)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Annual survival
Pooled: 79% [71, 85] | Prediction interval: 38%–96%


b
NOAA Survey Navassa (n = 102)
Vardi 2011 (Virgin Gorda) (n = 27)
Rogers & Muller 2012 (n = 69)
Vardi 2011 (Puerto Rico) (n = 130)
NOAA Survey Florida Keys (n = 2,955)
NOAA Survey Curacao (n = 817)
Garrison & Ward 2008 — Control (n = 45)
Vardi 2011 (Jamaica) (n = 88)
Neely et al. 2022 (n = 2,625)
Rogers et al. 1982 (n = 173)
Maurer et al. 2022 (n = 24)
Bruckner & Bruckner 2001 (n = 105)
FUNDEMAR (n = 44)
Kuffner et al. 2020 (n = 53)
Rosales et al. 2024 (n = 58)
Ortiz-Prosper 2005 (n = 207)
Williams & Miller 2010 (n = 18)
Ramos-Romero et al. 2025 (n = 200)
USGS USVI (n = 46)
Pausch et al. 2018 (n = 968)
Garrison & Ward 2008 — Relocated (n = 30)
Forrester et al. 2013 (n = 257)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Annual survival
Natural colony
Restoration fragment