

# Ecuaciones diferenciales

Ecuaciones lineales  
homogéneas con coeficientes  
constantes

## Semana 05: Auditorio

**Profesores del curso:**

Hermes Pantoja Carhuavilca

Sergio Quispe Rodríguez

Patricia Reynoso Quispe

Cristina Navarro Flores

Orlando Galarza Gerónimo

César Barraza Bernaola

Daniel Camarena Pérez



Profesores: Utec-Ciencias

# Índice

## 1 Ecuaciones lineales homogéneas con coeficientes constantes



# Objetivos

- **Resolver** EDOs lineales homogéneas de coeficientes constantes de orden superior utilizando la ecuación auxiliar

# ECUACIONES LINEALES HOMOGÉNEAS CON COEFICIENTES CONSTANTES

# 1



# Logro

- **Resuelva** EDOs lineales homogéneas de coeficientes constantes de orden superior utilizando la ecuación auxiliar. (L.4.5.1.4)

# Solución general de una EDO lineal homogénea

Sean  $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$  un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación lineal homogénea de  $n$ -ésimo orden en el intervalo  $I$ ,

$$a_n(x) \frac{d^n y}{dx^n} + a_{n-1}(x) \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \dots + a_1(x) \frac{dy}{dx} + a_0(x)y = 0, \quad (1)$$

entonces la **solución general** de esta ecuación en el intervalo  $I$  es.

$$y(x) = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x) + \dots + c_n y_n(x) \quad (2)$$

siendo  $c_1, c_2, \dots, c_n$  constantes arbitrarias.

¿Por qué La función (2) es solución de la ecuación (1)?

## El método de resolución

Se explicará el método con una ED de 2do orden; sin embargo, este puede aplicarse a una ecuación homogénea de coeficientes constantes de cualquier orden.

Dada la ecuación

$$a \frac{d^2 y}{dx^2} + b \frac{dy}{dx} + cy = 0 \quad (3)$$

donde  $a, b, c$  son constantes y  $a \neq 0$ , se busca hallar soluciones de la forma

$$y(x) = e^{rx}. \quad (4)$$

Reemplazando (4) en la ecuación (3), se obtiene

$$\begin{aligned} ar^2 e^{rx} + bre^{rx} + ce^{rx} &= 0 \\ \Rightarrow (ar^2 + br + c)e^{rx} &= 0 \end{aligned}$$

Como  $e^{rx}$  nunca es cero se debe cumplir que

$$ar^2 + br + c = 0, \quad (5)$$

resultado que se conoce como **ecuación auxiliar**. Las raíces de la ecuación auxiliar determinarán las soluciones de la forma (4).

# Ecuación de segundo grado

Para este caso las soluciones de la ecuación auxiliar son:

$$r_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \quad r_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

Definiendo  $\Delta = b^2 - 4ac$ , se tiene los siguientes casos

- **Caso 1:**  $\Delta > 0$ , existen dos raíces diferentes  $r_1 \neq r_2$ , obteniéndose dos soluciones

$$y_1(x) = e^{r_1 x}, \quad y_2(x) = e^{r_2 x}$$

Para que estas funciones formen un conjunto fundamental se debe verificar que son *LI* (¡Verifique!). Por lo tanto, la solución general de (3) es

$$y(x) = c_1 e^{r_1 x} + c_2 e^{r_2 x}$$



- **Caso 2:**  $\Delta = 0$ , existen dos raíces iguales  $r_1 = r_2 = r$ , obteniéndose sólo una solución:

$$y_1(x) = e^{rx}.$$

Se puede demostrar que la segunda solución está dado por:

$$y_2(x) = xe^{rx}.$$

Verifique que estas dos funciones son *LI*. Por lo tanto, la solución general de (3) es

$$y(x) = c_1 e^{rx} + c_2 x e^{rx}$$

En general, si la ecuación auxiliar tiene una raíz  $r$  de multiplicidad  $k$ , originará  $k$  soluciones, dadas por:

$$e^{rx}, xe^{rx}, x^2 e^{rx}, \dots, x^{k-1} e^{rx}$$

- **Caso 3:**  $\Delta < 0$ , las raíces son conjugadas complejas  $r_1 = \alpha + i\beta$ ,  $r_2 = \alpha - i\beta$ . Por lo tanto la solución general de (3) es

$$y(x) = c_1 e^{(\alpha+i\beta)x} + c_2 e^{(\alpha-i\beta)x}$$

Usando la fórmula de Euler, se obtiene,

$$\begin{aligned} y(x) &= c_1 e^{\alpha x} [\cos(\beta x) + i \sin(\beta x)] + c_2 e^{\alpha x} [\cos(\beta x) - i \sin(\beta x)] \\ &= (c_1 + c_2) e^{\alpha x} \cos(\beta x) + (ic_1 - ic_2) e^{\alpha x} \sin(\beta x) \\ &= C_1 e^{\alpha x} \cos(\beta x) + C_2 e^{\alpha x} \sin(\beta x) \end{aligned}$$

Como  $y_1 = e^{\alpha x} \cos(\beta x)$ ,  $y_2 = e^{\alpha x} \sin(\beta x)$  son *LI* (¡Verifique!), se concluye que la solución general de la ecuación (3) para este caso resulta ser

$$y(x) = C_1 e^{\alpha x} \cos(\beta x) + C_2 e^{\alpha x} \sin(\beta x)$$

# Ejercicios

- 1 Resuelva la siguiente ecuación:  $2y'' - 5y' - 3y = 0$

**Solución:** Hallamos su ecuación auxiliar:

$$2r^2 - 5r - 3 = 0$$

Factorizamos:  $(2r + 1)(r - 3) = 0$

De aquí se tiene:  $r = -1/2$  y  $r = 3$

Luego, la solución general de esta homogénea es:

$$y = c_1 e^{-\frac{1}{2}x} + c_2 e^{3x}$$

2 Resuelva la siguiente ecuación:  $y'' - 10y' + 25y = 0$

**Solución:** Hallamos su ecuación auxiliar:

$$r^2 - 10r + 25 = 0$$

Factorizamos:  $(r - 5)^2 = 0$

De aquí se tiene:  $r = 5$  multiplicidad 2

Luego, la solución general de esta homogénea es:

$$y = c_1 e^{5x} + c_2 x e^{5x}$$

3 Resuelva la siguiente ecuación:  $y'' + 4y' + 7y = 0$

**Solución:** Hallamos su ecuación auxiliar:

$$r^2 + 4r + 7 = 0$$

Resolviendo:

$$r_1 = \frac{-4 + 2\sqrt{3}i}{2} = -2 + \sqrt{3}i$$

$$r_2 = \frac{-4 - 2\sqrt{3}i}{2} = -2 - \sqrt{3}i$$

Luego, la solución general de esta homogénea es:

$$y(x) = c_1 e^{-2x} \cos(\sqrt{3}x) + c_2 e^{-2x} \sin(\sqrt{3}x)$$

4 Resuelva la siguiente ecuación:  $y''' + 3y'' - 4y = 0$

**Solución:** Hallamos su ecuación auxiliar:

$$r^3 + 3r^2 - 4 = 0$$

Factorizando:  $(r - 1)(r + 2)^2 = 0$

Se obtiene:  $r = 1$  y además  $r = -2$  con multiplicidad 2.

Luego, la solución general de esta homogénea es:

$$y = c_1 e^x + c_2 e^{-2x} + c_3 x e^{-2x}$$

# Ejercicios adicionales para alumnos

Resuelva las siguientes ecuaciones

1  $y'' - 3y' - 10y = 0$

**Respuesta:**  $y(x) = c_1 e^{-2x} + c_2 e^{5x}$

2  $y^{(4)} - 4y''' + 4y'' = 0$

**Respuesta:**  $y(x) = c_1 + c_2 x + c_3 e^{2x} + c_4 x e^{2x}$

3  $y''' + 3y'' + 3y' + 3y = 0$

**Respuesta:**  $y(x) = c_1 e^{-x} + c_2 x e^{-x} + c_3 x^2 e^{-x}$

4  $\frac{d^4 y}{dx^4} + 2\frac{d^3 y}{dx^3} + 5\frac{d^2 y}{dx^2} = 0$

**Respuesta:**  $y(x) = c_1 + c_2 x + c_3 e^{-x} \cos(2x) + c_4 e^{-x} \sin(2x)$

5 Halle una ED lineal homogénea, tal que su solución general sea

$y(x) = c_1 e^{2x} + c_2 x e^{2x} + c_3$

**Respuesta:**  $y''' - 4y'' + 4y' = 0$

6 Obtener una ecuación diferencial de menor orden posible, tal que su solución general sea  $y = c_1 e^x + c_2 e^{-x} + c_3 e^{2x} + c_4 e^{-2x}$

**Respuesta:**  $y^{(4)} - 5y'' + 4y = 0$

# Conclusiones

- 1 El método de solución para ecuaciones lineales homogéneas con coeficientes constantes se basa en asumir que la solución es una función exponencial. Esto nos lleva a una ecuación algebraica llamada ecuación auxiliar.
- 2 Cuando la raíz se repite se multiplica por  $x$  a la solución, si se vuelve a repetir se multiplica por  $x^2$  a la siguiente y así sucesivamente.
- 3 Si las raíces son complejas, mediante la fórmula de Euler, se transforman las soluciones en senos y cosenos.
- 4 Este método sólo se aplica cuando los coeficientes son constantes, si no lo fueran, se debe usar otros métodos.



# Gracias

**UTEC**  
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA  
Y TECNOLOGÍA

