

TD 3-Espaces vectoriels

Exercice 1.

1. **Ce n'est pas un espace vectoriel** : la multiplication par un nombre réel n'est pas une loi de composition externe sur E car $(1, 0) \in E$ mais $(-1) \cdot (1, 0) \notin E$.
2. **C'est un espace vectoriel** : on va montrer que c'est un sous-espace vectoriel de \mathbb{R}^4 grâce à la caractérisation des sous-espaces vectoriels.
 - On a bien $E \subset \mathbb{R}^4$.
 - E est non vide car $(0, 0, 0, 0) \in E$.
 - Soient (x_1, y_1, z_1, t_1) et (x_2, y_2, z_2, t_2) deux éléments de E et $\lambda \in \mathbb{R}$. Montrons que

$$(x_1, y_1, z_1, t_1) + \lambda(x_2, y_2, z_2, t_2) \in E.$$

On a :

$$(x_1, y_1, z_1, t_1) + \lambda(x_2, y_2, z_2, t_2) = (x_1 + \lambda x_2, y_1 + \lambda y_2, z_1 + \lambda z_2, t_1 + \lambda t_2).$$

Or, puisque (x_1, y_1, z_1, t_1) et (x_2, y_2, z_2, t_2) appartiennent à E :

$$\begin{aligned} 2(x_1 + \lambda x_2) + (y_1 + \lambda y_2) - (t_1 + \lambda t_2) &= \underbrace{2x_1 + y_1 - t_1}_{=0 \text{ car } (x_1, y_1, z_1, t_1) \in E} + \lambda(\underbrace{2x_2 + y_2 - t_2}_{=0 \text{ car } (x_2, y_2, z_2, t_2) \in E}) \\ &= 0, \end{aligned}$$

et

$$y_1 + \lambda y_2 = t_1 + \lambda t_2.$$

Ainsi :

$$(x_1, y_1, z_1, t_1) + \lambda(x_2, y_2, z_2, t_2) \in E.$$

On a donc montré que

$$\forall ((x_1, y_1, z_1, t_1), (x_2, y_2, z_2, t_2)) \in E^2, \forall \lambda \in \mathbb{R}, (x_1, y_1, z_1, t_1) + \lambda(x_2, y_2, z_2, t_2) \in E.$$

D'après la caractérisation des sous-espaces vectoriels, E est donc un sous-espace vectoriel de \mathbb{R}^4 . En particulier, c'est un espace vectoriel.

3. **Ce n'est pas un espace vectoriel** : l'addition des polynômes n'est pas une loi de composition interne pour E : en effet $X \in E$ et $X + 1 \in E$ mais $X + (X + 1) \notin E$.

4. **C'est un espace vectoriel** : on va montrer que c'est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ grâce à la caractérisation des sous-espaces vectoriels. Notons E l'ensemble des suites de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ convergentes.

- On a bien $E \subset \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.
- E est non vide car la suite nulle converge.
- Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux éléments de E et $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors, par opérations sur les limites, la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} + \lambda(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge. Ainsi :

$$\forall ((u_n)_{n \in \mathbb{N}}, (v_n)_{n \in \mathbb{N}}) \in E^2, \forall \lambda \in \mathbb{R}, (u_n)_{n \in \mathbb{N}} + \lambda(v_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E.$$

D'après la caractérisation des sous-espaces vectoriels, E est donc un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. En particulier, c'est un espace vectoriel.

5. **Ce n'est pas un espace vectoriel** : l'addition des suites n'est ici pas une loi de composition interne pour E : en effet la suite $(n)_{n \in \mathbb{N}}$ diverge, la suite $(-n)_{n \in \mathbb{N}}$ aussi mais $(n)_{n \in \mathbb{N}} + (-n)_{n \in \mathbb{N}}$ ne diverge pas.

Exercice 2. On cherche s'il existe des réels a, b et c tels que

$$\forall n \in \mathbb{N}, (n + 4)^2 = a(n + 2)^2 + b(n + 1)^2 + c(n - 1).$$

Raisonnons par analyse-synthèse.

- **Analyse** : supposons qu'il existe des réels a, b et c tels que

$$\forall n \in \mathbb{N}, (n + 4)^2 = a(n + 2)^2 + b(n + 1)^2 + c(n - 1).$$

Alors, pour $n = 0, n = 1$ et $n = 2$ on obtient :

$$\begin{cases} 4a + b - c = 16 \\ 9a + 4b = 25 \\ 16a + 9b + c = 36. \end{cases}$$

Or

$$\begin{aligned} & \begin{cases} 4a + b - c = 16 \\ 9a + 4b = 25 \\ 16a + 9b + c = 36 \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} 4a + b - c = 16 \\ 9a + 4b = 25 \\ 20a + 10b = 52 \end{cases} \quad (L_3 \leftarrow L_3 + L_1) \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} 4a + b - c = 16 \\ 9a + 4b = 25 \\ 2a + 2b = 2 \end{cases} \quad (L_3 \leftarrow L_3 - 2L_2) \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} 4a + 1 - a - c = 16 \\ 9a + 4(1 - a) = 25 \\ b = 1 - a \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} a = \frac{21}{5} \\ b = -\frac{16}{5} \\ c = -\frac{12}{5} \end{cases} \end{aligned}$$

• **Synthèse** : réciproquement, soit $n \in \mathbb{N}$. Alors :

$$\begin{aligned} \frac{21}{5}(n+2)^2 - \frac{16}{5}(n+1)^2 - \frac{12}{5}(n-1) &= \frac{21}{5}(n^2 + 4n + 4) - \frac{16}{5}(n^2 + 2n + 1) - \frac{12}{5}(n-1) \\ &= n^2 + 8n + 16 \\ &= (n+4)^2. \end{aligned}$$

Ainsi

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = \frac{21}{5}v_n - \frac{16}{5}w_n - \frac{12}{5}x_n.$$

La suite u est donc combinaison linéaire des suites v , w et x .

Exercice 3.

1. On va montrer que F est un sous-espace vectoriel de E grâce à la caractérisation des sous-espaces vectoriels.

- On a bien $F \subset E$.
- F est non vide car la suite nulle converge vers 0.
- Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux éléments de F et $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0.$$

Donc, par opérations sur les limites, la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} + \lambda(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 0. Ainsi :

$$\forall ((u_n)_{n \in \mathbb{N}}, (v_n)_{n \in \mathbb{N}}) \in F^2, \forall \lambda \in \mathbb{R}, (u_n)_{n \in \mathbb{N}} + \lambda(v_n)_{n \in \mathbb{N}} \in F.$$

D'après la caractérisation des sous-espaces vectoriels, F est donc un sous-espace vectoriel de E .

2. On va montrer que F est un sous-espace vectoriel de E grâce à la caractérisation des sous-espaces vectoriels.

- On a bien $F \subset E$.
- F est non vide car la fonction nulle est continue en 1.
- Soient f et g deux éléments de F et $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors f et g sont continues en 1. Donc, par opérations sur les fonctions continues, la fonction $f + \lambda g$ est continue en 1. Ainsi :

$$\forall (f, g) \in F^2, \forall \lambda \in \mathbb{R}, f + \lambda g \in F.$$

D'après la caractérisation des sous-espaces vectoriels, F est donc un sous-espace vectoriel de E .

3. On va montrer que F est un sous-espace vectoriel de E grâce à la caractérisation des sous-espaces vectoriels.

- On a bien $F \subset E$.
- F est non vide car la matrice nulle est symétrique.
- Soient A et B deux éléments de F et $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors :

$${}^t A = A \quad \text{et} \quad {}^t B = B.$$

Donc, par linéarité de la transposition :

$${}^t(A + \lambda B) = {}^t A + \lambda {}^t B = A + \lambda B.$$

Ainsi :

$$\forall (A, B) \in F^2, \forall \lambda \in \mathbb{R}, A + \lambda B \in F.$$

D'après la caractérisation des sous-espaces vectoriels, F est donc un sous-espace vectoriel de E .

Exercice 4. On va montrer que $F \cap G$ est un sous-espace vectoriel de E grâce à la caractérisation des sous-espaces vectoriels.

- On a bien $F \cap G \subset E$.
- Comme F est un sous-espace vectoriel de E alors $0_E \in F$. De même, comme G est un sous-espace vectoriel de E alors $0_E \in G$. Ainsi $0_E \in F \cap G$. En particulier $F \cap G$ est non vide.
- Soient x et y deux éléments de $F \cap G$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Comme $x \in F$ et $y \in F$ et que F est un sous-espace vectoriel de E alors

$$x + \lambda y \in F.$$

De même, comme $x \in G$ et $y \in G$ et que G est un sous-espace vectoriel de E alors

$$x + \lambda y \in G.$$

Donc : $x + \lambda y \in F \cap G$. Ainsi :

$$\forall (x, y) \in (F \cap G)^2, \forall \lambda \in \mathbb{R}, x + \lambda y \in F \cap G.$$

D'après la caractérisation des sous-espaces vectoriels, $F \cap G$ est donc un sous-espace vectoriel de E .

Exercice 5.

1. L'espace vectoriel $\text{Vect}(X^3, X^2, X, 1)$ est l'ensemble des combinaisons linéaires de $1, X, X^2, X^3$:

$$\text{Vect}(X^3, X^2, X, 1) = \{a_3 X^3 + a_2 X^2 + a_1 X + a_0; (a_3, a_2, a_1, a_0) \in \mathbb{R}^4\} = \mathbb{R}_3[X].$$

2. D'après les propriétés sur les sous-espaces engendrés :

$$\begin{aligned} \text{Vect}(X+1, X+2, X+3) &= \text{Vect}(X+1, X+2 - (X+1), X+3) \\ &= \text{Vect}(X+1, 1, X+3) \\ &= \text{Vect}(X+1 - 1, 1, X+3) \\ &= \text{Vect}(X, 1, X+3) \\ &= \text{Vect}(X, 1) \text{ car } X+3 \text{ est combinaison linéaire de } X \text{ et } 1 \\ &= \mathbb{R}_1[X]. \end{aligned}$$

3. Comme $(2, -4) = -2(-1, 2)$ alors :

$$\text{Vect}((-1, 2), (2, -4)) = \text{Vect}((-1, 2)) = \{(-a, 2a); a \in \mathbb{R}\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = -2x\}.$$

Il s'agit de la droite de \mathbb{R}^2 d'équation $y = -2x$.

4. On a

$$\text{Vect}((1, 0), (0, 1)) = \{x(1, 0) + y(0, 1); x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}\} = \{(x, y); x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R}^2.$$

Exercice 6.

- **Méthode 1** : on procède par double inclusion.

— Montrons que $\text{Vect}(\vec{u}, \vec{v}) \subset \text{Vect}(\vec{s}, \vec{t})$. Pour cela, d'après la proposition 6, il suffit de montrer que \vec{u} et \vec{v} appartiennent à $\text{Vect}(\vec{s}, \vec{t})$ c'est-à-dire que \vec{u} et \vec{v} sont combinaisons linéaires de \vec{s} et de \vec{t} .

On voit facilement que

$$\vec{u} = \vec{s} + \vec{t} \quad \text{et} \quad \vec{v} = \vec{s} + 2\vec{t}.$$

Ainsi \vec{u} et \vec{v} appartiennent à $\text{Vect}(\vec{s}, \vec{t})$. Donc :

$$\text{Vect}(\vec{u}, \vec{v}) \subset \text{Vect}(\vec{s}, \vec{t}).$$

— De même, montrons que $\text{Vect}(\vec{s}, \vec{t}) \subset \text{Vect}(\vec{u}, \vec{v})$. Pour cela, d'après la proposition 6, il suffit de montrer que \vec{s} et \vec{t} appartiennent à $\text{Vect}(\vec{u}, \vec{v})$ c'est-à-dire que \vec{s} et \vec{t} sont combinaisons linéaires de \vec{u} et de \vec{v} .

On voit facilement que

$$\vec{s} = 2\vec{u} - \vec{v} \quad \text{et} \quad \vec{t} = \vec{v} - \vec{u}.$$

Ainsi \vec{s} et \vec{t} appartiennent à $\text{Vect}(\vec{u}, \vec{v})$. Donc :

$$\text{Vect}(\vec{s}, \vec{t}) \subset \text{Vect}(\vec{u}, \vec{v}).$$

Ainsi : $\text{Vect}(\vec{u}, \vec{v}) = \text{Vect}(\vec{s}, \vec{t})$.

• Méthode 2 :

$$\begin{aligned} \text{Vect}(\vec{u}, \vec{v}) &= \text{Vect}(\vec{u}, \vec{v} - \vec{u}) \\ &= \text{Vect}(\vec{u}, \vec{t}) \\ &= \text{Vect}(\vec{u} - \vec{t}, \vec{t}) \\ &= \text{Vect}(\vec{s}, \vec{t}) \end{aligned}$$

Exercice 7.

Dans chaque cas, on va écrire F sous la forme $\text{Vect}(u_1, \dots, u_n)$ avec $u_i \in E$. En particulier, cela montrera que F est un sous-espace vectoriel de E dont une famille génératrice est (u_1, \dots, u_n) .

1. L'ensemble F est décrit par un système d'équations.

- (a) On écrit les conditions sous lesquelles un vecteur appartient à F sous forme d'un système.

Soit $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. Alors

$$(x, y, z) \in F \iff \begin{cases} x & + & 2y & - & z & = & 0 \\ x & + & y & + & z & = & 0 \end{cases}$$

- (b) Ici le système est déjà sous forme triangulaire.

- (c) On exprime les inconnues principales en fonctions des autres.

$$\begin{cases} x & + & y & + & z & = & 0 \\ x & + & 2y & - & z & = & 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x & = & -y - z \\ 2y & = & z \end{cases} \iff \begin{cases} x & = & -3y \\ z & = & 2y \end{cases}$$

- (d) Finalement, $(x, y, z) \in F \iff \begin{cases} x & = & -3y \\ z & = & 2y \end{cases}$. Donc

$$F = \{(-3y, y, 2y) \in \mathbb{R}^3 \mid y \in \mathbb{R}\} = \{y(-3, 1, 2) \in \mathbb{R}^3 \mid y \in \mathbb{R}\} = \text{Vect}((-3, 1, 2)).$$

Ainsi, F est un sous-espace vectoriel de E et $((-3, 1, 2))$ est une famille génératrice de F .

2. L'ensemble F est décrit par une équation.

On écrit les conditions sous lesquelles un vecteur appartient à F sous forme d'un système.

Soit $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. Alors

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in F \iff a = 2c$$

Ainsi :

$$\begin{aligned} F &= \left\{ \begin{pmatrix} 2c & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \mid b \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R}, d \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \left\{ c \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \mid b \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R}, d \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right). \end{aligned}$$

Ainsi, F est un sous-espace vectoriel de E et $\left(\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right)$ est une famille génératrice de F .

3. L'ensemble F est donné sous forme paramétrique.

$$\begin{aligned} F &= \{(a+c)X + (2aX+b)X^2 - cX^2, (a,b,c) \in \mathbb{R}^3\} \\ &= \{a(X+2X^3) + bX^2 + c(X-X^2), (a,b,c) \in \mathbb{R}^3\} \\ &= \text{Vect}(X+2X^3, X^2, X-X^2) \end{aligned}$$

Ainsi, F est un sous-espace vectoriel de E et $(X+2X^3, X^2, X-X^2)$ est une famille génératrice de F .

4. L'ensemble F est décrit par un système d'équations.

On écrit les conditions sous lesquelles un vecteur appartient à F sous forme d'un système.

Soit $P = aX^2 + bX + c \in \mathbb{R}_2[X]$. Alors

$$P \in F \iff P(1) = P(2) \iff a + b + c = 4a + 2b + c \iff b = -3a.$$

Ainsi

$$\begin{aligned} F &= \{aX^2 - 3aX + c \mid a \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R}\} \\ &= \{a(X^2 - 3X) + c \mid a \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R}\} \\ &= \text{Vect}(X^2 - 3X, 1). \end{aligned}$$

Ainsi, F est un sous-espace vectoriel de E et $(X^2 - 3X, 1)$ est une famille génératrice de F .

Exercice 8. Il s'agit de montrer que

$$\{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid 2x + y + 2z - t = 0 \text{ et } x + y + z = 0\} = \text{Vect}(2, -1, -1, 1), (0, 1, -1, -1)).$$

On va commencer par déterminer une famille génératrice de

$$F = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid 2x + y + 2z - t = 0 \text{ et } x + y + z = 0\}.$$

L'ensemble F est décrit par un système d'équations.

1. On écrit les conditions sous lesquelles un vecteur appartient à F sous forme d'un système.

Soit $(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4$. Alors

$$(x, y, z, t) \in F \iff \begin{cases} 2x + y + 2z - t = 0 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$$

2. Ici le système est déjà sous forme triangulaire.

3. On exprime les inconnues principales en fonctions des autres.

$$\begin{cases} 2x + y + 2z - t = 0 \\ x + y + z = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} t = 2x + y + 2z \\ x = -y - z \end{cases} \iff \begin{cases} t = -y \\ x = -y - z \end{cases}$$

4. Finalement, $(x, y, z, t) \in F \iff \begin{cases} t = -y \\ x = -y - z \end{cases}$. Donc

$$\begin{aligned} F &= \{(-y - z, y, z, -y) \in \mathbb{R}^4 \mid y \in \mathbb{R}, z \in \mathbb{R}\} \\ &= \{y(-1, 1, 0, -1) + z(-1, 0, 1, 0) \in \mathbb{R}^4 \mid z \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}\} \\ &= \text{Vect}((-1, 1, 0, -1), (-1, 0, 1, 0)). \end{aligned}$$

Or

$$\begin{aligned} \text{Vect}((-1, 1, 0, -1), (-1, 0, 1, 0)) &= \text{Vect}((-1, 1, 0, -1) + (-1, 0, 1, 0), (-1, 0, 1, 0)) \\ &= \text{Vect}((-2, 1, 1, -1), (-1, 0, 1, 0)) \\ &= \text{Vect}((2, -1, -1, 1), (-1, 0, 1, 0)) \\ &= \text{Vect}((2, -1, -1, 1), (-2, 0, 2, 0)) \\ &= \text{Vect}((2, -1, -1, 1), (-2, 0, 2, 0) + (2, -1, -1, 1)) \\ &= \text{Vect}((2, -1, -1, 1), (0, -1, 1, 1)) \\ &= \text{Vect}(2, -1, -1, 1), (0, 1, -1, -1)). \end{aligned}$$

Ainsi :

$$\{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid 2x + y + 2z - t = 0 \text{ et } x + y + z = 0\} = \text{Vect}(2, -1, -1, 1), (0, 1, -1, -1)).$$

Exercice 9.

1. Déterminons un système d'équations caractérisant les éléments de F .

(a) On écrit la condition pour qu'un vecteur appartienne à F sous forme d'un système (non-homogène).

Soit $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. Alors

$$(x, y, z) \in F \iff \exists (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2, \quad (x, y, z) = \lambda(1, 1, 1) + \mu(-1, 2, 1)$$

$$\iff \exists (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2, \quad (S) \begin{cases} \lambda - \mu = x \\ \lambda + 2\mu = y \\ \lambda + \mu = z \end{cases}$$

Ainsi

$$(x, y, z) \in F \iff (S) \text{ possède au moins une solution.}$$

(b) On met le système sous forme triangulaire. Soit $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$.

$$\begin{cases} \lambda - \mu = x \\ \lambda + 2\mu = y \\ \lambda + \mu = z \end{cases} \iff \begin{cases} \lambda - \mu = x \\ 3\lambda = y + 2x \\ 2\lambda = x + z \end{cases}$$

(c) Ainsi, (S) possède des solutions si et seulement si $\frac{y+2x}{3} = \frac{x+z}{2}$. Donc

$$(x, y, z) \in F \iff \frac{y+2x}{3} = \frac{x+z}{2} \iff x + 2y - 3z = 0.$$

Finalement,

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + 2y - 3z = 0\}.$$

2. Déterminons un système d'équations caractérisant les éléments de F .

(a) On écrit la condition pour qu'un vecteur appartienne à F sous forme d'un système (non-homogène).

Soit $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. Alors

$$(x, y, z) \in F \iff \exists (\lambda, \mu, \gamma) \in \mathbb{R}^3, \quad (x, y, z) = \lambda(2, 1, -3) + \mu(1, 1, -2) + \gamma(1, 0, 0)$$

$$\iff \exists (\lambda, \mu, \gamma) \in \mathbb{R}^3, \quad (S) \begin{cases} 2\lambda + \mu + \gamma = x \\ \lambda + \mu = y \\ -3\lambda - 2\mu = z \end{cases}$$

Ainsi

$$(x, y, z) \in F \iff (S) \text{ possède au moins une solution.}$$

(b) On met le système sous forme triangulaire. Soit $(\lambda, \mu, \gamma) \in \mathbb{R}^3$.

$$\begin{cases} 2\lambda + \mu + \gamma = x \\ \lambda + \mu = y \\ -3\lambda - 2\mu = z \end{cases} \iff \begin{cases} 2\lambda + \mu + \gamma = x \\ \lambda + \mu = y \\ -\lambda = z + 2y \end{cases} \\ \iff \begin{cases} \gamma = x + y + z \\ \mu = 3y + z \\ \lambda = -z - 2y \end{cases}.$$

(c) Ainsi, (S) possède des solutions pour tout $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. Donc

$$F = \mathbb{R}^3.$$