

El mérito de **hacer una buena obra**
a los más pequeños es suyo...



- 
- Más del **70%** de los lactantes **regurgita** en el primer año de vida y sólo **algunos** desarrollan ERGE^{1,2}

Reflujo Fisiológico

Paso del contenido gástrico hacia el esófago o la orofaringe; con o sin vómito¹

- Los síntomas **no causan problemas**¹
- El 95% se resuelve espontáneamente¹

Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico (ERGE)


Se desarrolla cuando el reflujo del contenido gástrico causa síntomas molestos y/o complicaciones¹

- En lactantes, la prevalencia clínica de ERGE es hasta del 20%³⁻⁵
- El 40% de los lactantes que continúan vomitando a los 6 meses, presentan una exposición esofágica al ácido⁷



- La exposición prolongada al ácido, elemento clave de la sintomatología y las complicaciones⁸

Superior eficacia y seguridad en el control del ácido⁹



Ahora en lactantes que requieren supresión ácida...

Nuevo
Nexium® 2.5mg
esomeprazol

*El poder en el control del ácido,
único IBP con presentación pediátrica...*

1 vez
al día¹⁰



Caja con
28^{os} sobres


*Nexium® 2.5 mg granulado...
porque el bebé necesita un mundo que se adapte a él*





Ahora
aprobado para
lactantes

● **Nexium**[®] controla y mantiene el pH intragástrico >4 por más tiempo en lactantes¹¹



● **Nexium**[®] disminuye el número total promedio de episodios de reflujo ácido en 24 hrs.¹¹

● **Nexium**[®] proporciona una supresión ácida efectiva¹¹

● **Nexium**[®] es seguro y bien tolerado en lactantes^{11,12}



Porque el bebé necesita un mundo que se adapte a él...

Ahora
aprobado para
lactantes

● **Dosificación de acuerdo al peso corporal¹⁰**

Peso	Concentración	Duración
De 3 a 5 kg	2.5 mg al día	6 semanas
>5 a 7.5 kg	5 mg al día	
>7.5 a 12 kg	10 mg al día*	

1 vez
al día¹⁰

*Dosis arriba de 1.33 mg/kg/día no se han estudiado.

● **Formulación apropiada para lactantes¹⁰**



Ahora en lactantes con ERGE que requieren supresión ácida...



*El poder en el control del ácido,
único IBP con presentación pediátrica⁸*

- Nexium® controla y mantiene el pH intragástrico >4 por más de 16 hrs. en lactantes⁹
- Nexium® disminuye el número total promedio de episodios de reflujo ácido en 24 hrs.⁹
- Nexium® es seguro y bien tolerado en lactantes^{9,10}
- Dosificación de acuerdo al peso corporal⁸
- Formulación apropiada para lactantes¹¹

**1 vez
al día⁸**



**Caja con
28 sobres**

Para uso exclusivo del Representante de AstraZeneca México.

A Guiding Star in Gastroenterology

No SSA xxxxx

AstraZeneca 