En pacientes con enfermedades ácido pépticas...





Clave SS: 5188
Esomeprazol 40 mg / 14 tabs



Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico

Indicaciones	Posología	Duración
	Adultos-Adolescentes > 12 años	
Tratamiento sintomático inicial	40mg / día	4 a 8 semanas
Cicatrización de esofagitis		
Evitar recurrencia en esofagitis cicatrizada	20mg / día	Tiempo indefinido
ERGE sintomática sin esofagitis	20mg / día	4 semanas*
Tratamiento a largo plazo de la ERGE	20mg / día	Tiempo indefinido o a demanda

^{*}Si los síntomas persisten después de 4 semanas, debe investigarse al paciente con mayor profundidad.

- Proporciona un alivio rápido y sostenido de la pirosis¹⁻⁴
- Superior tasa de curación de esofagitis1-4
- Más pacientes libres de síntomas y recaídas con un tratamiento a largo plazo⁵⁻⁸

Referencias:

 Richter J, et al. Am J Gastroenterol 2001;96:656-65 2. Kahrikas P, et al. Alimenti Prermacol Ther 2000;14:1249-58 3. Castell D, et al. Am J Gastroenterol 2002;97:575-83 4. Laberr J, et al. Alimenti Prermacol Ther 2005;217:39-46 5. Laberr J, et al. Alimenti Prermacol Ther 2005;22:803-11. 6. Lautisten K, et al. Alimenti Prermacol Ther 2005;17:333-41. 7. Talley N, et al. Alimenti Prermacol Ther 2001;15:347-54.
 Talley N, et al. Eur. | Contingentum Hendrich 2000;14:87-63.

Fator a lettra (formante anno anno anno anno anno atra la IDD anto al anno an la considera and ad anno Márica an

