

RÁPIDO y SEGURO

Symbicort®

budesonida/formoterol

**Alivio rápido de síntomas y control
seguro del asma y la EPOC¹**

**Clave SS
0445**



**Clave SS
0446**



Reg. No. 310M2001 SSA IV

PRESENTACIONES

 **Turbuhaler®:** 80/4.5 µg 60 dosis

Turbuhaler®: 160/4.5 µg 60 dosis

DOSIS:

Asma:

Niños (mayores de cuatro años) y adolescentes (mayores de 12 años):

80/4.5 µg o 160/4.5 µg: Una o dos inhalaciones 2 veces al día

Adultos (mayores de 18 años): 160/4.5 µg: Una o dos inhalaciones 2 veces al día

EPOC:

Adultos: 320/9 µg: Una o dos inhalaciones 2 veces al día

Iniciativa Global para el Tratamiento del Asma (GINA)



Opciones de control***		Dosis bajas de Cl + Teofilina de liberación sostenida	Teofilina de liberación sostenida	Tratamiento Anti-IgE
Modificadores de los leucotrienos**	Dosis bajas de Cl + modificadores de los leucotrienos	Dosis moderadas o altas de Cl + modificadores de los leucotrienos	Modificadores de los leucotrienos	Corticosteroides orales (la dosis más baja)
		Dosis bajas de Cl + agonistas β_2 de larga acción (LABA)	Dosis moderadas o altas de Cl + agonistas β_2 de larga acción (LABA)	Para cambiar al paso 4, añada cualquiera
		Selección uno	Selección uno	Para cambiar al paso 3, seleccione uno o más
				Para cambiar al paso 4, añada cualquiera
				Para cambiar al paso 5
Paso 1	Paso 2	Paso 3	Paso 4	Paso 5

*Cl: Corticosteroides inhalados

**: Antagonistas de los receptores o inhibidores de la síntesis

***: Se deben preferir las opciones de control que se muestran en las cajas sombreadas

1. Pocket Guide for Asthma Management And Prevention for Adults and Children Older than 5 Years.
GINA (Global Initiative for Asthma) 2009. 2010 Medical Communication Resources, Inc.