

Evaluación de la intensidad del dolor en pacientes críticos sedados o inconscientes

Cortesía de Hospira

Escala de Campbell

	0	1	2	Puntuaciói Parcial
Musculatura Facial	Relajada	En tensión, ceño fruncido y/o mueca de dolor	Ceño fruncido en forma habitual y/o dientes apretados	
"Tranquilidad"	Tranquilo, relajado, movimientos normales	Movimientos ocasionales de inquietud y/o de posición	Movimientos frecuentes, incluyendo cabeza o extremidades	
Tono muscular*	Normal	Aumentado. Flexión de dedos de manos y/o pies	Rígido	
Respuesta verbal**	Normal	Quejas, lloros, quejidos o gruñidos ocasionales	Quejas, lloros, quejidos o gruñidos frecuentes	
Confortabilidad	Confortable y/o tranquilo	Se tranquiliza con el tacto y/o la voz. Fácil de distraer	Dificil de confortar con el tacto o hablándole	
* En ca	so de lesión medular o hemiple	ejia, valorar el lado sano ** Puede ser	poco valorable en vía aérea artificia	
* En ca 0 Sin dolor		1-3 4	-6	l >6 nuy intenso

• Pardo C, Muñoz T, Chamorro C, Grupo de Trabajo de Analgesia y Sedación de la SEMICYUC. Monitorización del dolor. • Recomendaciones del grupo de trabajo de analgesia y sedación de la SEMICYUC. Med Intensiva 2006;30:379–385.