En pacientes con enfermedades ácido pépticas...





Clave SS: 5188
Esomeprazol 40 mg / 14 tabs



## Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico

Indicaciones	Posología	Duración
	Adultos-Adolescentes > 12 años	
Tratamiento sintomático inicial	40mg / día	4 a 8 semanas
Cicatrización de esofagitis		
Evitar recurrencia en esofagitis cicatrizada	20mg / día	Tiempo indefinido
ERGE sintomática sin esofagitis	20mg / día	4 semanas*
Tratamiento a largo plazo de la ERGE	20mg / día	Tiempo indefinido o a demanda

\*Si los síntomas persisten después de 4 semanas, debe investigarse al paciente con mayor profundidad.

- Proporciona un alivio rápido y sostenido de la pirosis<sup>1-4</sup>
- Superior tasa de curación de esofagitis1-4
- Más pacientes libres de síntomas y recaídas con un tratamiento a largo plazo<sup>5-8</sup>

## Referencias:

Richter J, et al. Am J Gastroenterol 2001;96:656-65 2. Kahrikas P, et al. Aliment Pramacol Ther 2000;14:1249-58 3. Castell D, et al. Am J Gastroenterol 2002;97:575-83 4. Laberr J, et al. Aliment Pramacol Ther 2005;27:809-81. 5. Laberr J, et al. Aliment Pramacol Ther 2005;22:809-11. 6. Launtisen K, et al. Aliment Pramacol Ther 2003;17:333-41. 7. Taley N, et al. Aliment Pramacol Ther 2001;15:347-54.
 Taleon M et al. Err. | Continuation of March 2000;14:867-69.

"Fator a lettre ((company) and a series and a la IPD and a fator de annual fator de annual fator de la IPD and a fator de la IPD and

