# TP 8.1 – Fusion de la glace

## Objectifs:

- Comprendre le lien entre énergie et température.
- Comprendre la notion de transformation endothermique et exothermique.

**Contexte**: Si on veut refroidir une boisson tiède, on peut la placer dans un réfrigérateur, mais une solution bien plus rapide est de rajouter des glaçons dedans.

→ Comment modéliser le changement de température lié à l'ajout des glaçons?

## Document 1 - Un peu de vocabulaire

Dans ce chapitre on va s'intéresser à l'évolution de la température et des états des objets. Cette branche de la physique s'appelle la **thermodynamique** (« *thermos* » : *chaud* en grec. Thermodynamique : « évolution de la chaleur »). Pour pouvoir définir ce qui est étudié, on utilise un vocabulaire particulier en thermodynamique.

- Corps: objet macroscopique continu avec des propriétés physiques bien définies (température, pression, état).
- **Système** : ensemble de corps dont on étudie l'évolution.
- Milieu extérieur : tous les corps qui ne sont pas le système.

⚠ Il faut faire attention à bien définir le système étudié et le milieu extérieur!

## Document 2 - Transfert thermique

Un corps chaud en contact avec un corps froid lui transfert de l'énergie, ce qui se traduit par une modification de la température des deux corps : on parle de **transfert thermique**.

L'énergie transférée se note Q, son unité est le Joule J. Un corps qui **reçoit un transfert** thermique positif (Q > 0) voit sa température augmenter.

Sous certaines conditions, ce transfert thermique peut mener un des deux corps à changer d'état (solide à liquide par exemple) : on parle de **transformation physique**.

<u>A</u> le transfert thermique va **toujours** du corps chaud vers le corps froid! Si un corps pur change d'état, sa température ne varie pas au cours du transfert thermique.

#### Document 3 - Calorimètre

Un calorimètre (« calor » : chaleur en latin) est un récipient qui sert à mesurer des transferts thermiques. Un calorimètre est un vase qui isole son contenu de tous transfert thermique avec l'extérieur : aucune chaleur n'y rentre ni n'en sort. Tous les transferts thermiques se passent donc entre les corps que contient le calorimètre.



#### Document 4 - Protocole de mesure de la variation de température

- Placer le calorimètre sur la balance et appuyer sur tare.
- Verser environ  $200\,\mathrm{mL}$  d'eau et mesurer la masse  $m_{\mathrm{eau}}$  introduite.
- Fermer le calorimètre et introduire le thermomètre. Mesurer la température initiale de l'eau  $T_i$ .
- Mesurer la masse  $m_{\rm glacons}$  d'au moins deux glaçons sur une balance.
- Introduire rapidement ces glaçons dans le calorimètre et le refermer.
- Quand les glaçons ont entièrement fondus, agiter l'eau et mesurer sa température finale  $T_f$ .

#### Mesures réalisées :

Grandeur mesurée	$m_{ m eau}$	$m_{ m glaçons}$	$T_i$	$T_f$
Mesure				

#### A - Premier système étudié : l'eau liquide

🗸 🗲 Réaliser le protocole du document 4 en notant les valeurs des mesures expérimentales.

1 - L'eau liquide a-t-elle gagné ou perdu de l'énergie par transfert thermique?

2 — On peut calculer le transfert thermique reçu par l'eau liquide à partir de sa masse et de sa variation de température

$$Q = m_{\rm eau} \times c_{\rm eau} \times (T_f - T_i)$$

où  $c_{\rm eau}=4{,}180\,{\rm J\cdot g^{-1}\cdot ^{\circ}C^{-1}}$  est la capacité calorifique de l'eau. Cette constante mesure la quantité d'énergie nécessaire pour augmenter la température de 1°C pour 1 g d'eau. Calculer la valeur de Q avec vos mesures.

.....

## B - Second système étudié : les glaçons

## Document 5 – Énergie de changement d'état

Pour faire fondre de la glace, il faut un transfert thermique entre la glace et un autre corps.

L'énergie nécessaire pour changer d'état s'appelle l'énergie de changement d'état et on la note L, son unité est le Joule J.

Plus la masse de la glace est élevée et plus l'énergie de changement d'état sera élevée.


On peut définir l'énergie de changement d'état massique notée  $L_m$ , qui est propre à chaque corps pur et s'exprime en Joule par gramme  $J \cdot g^{-1}$ :

$$L_m = \frac{L}{m_{\rm glace}}$$

ourni l'état
 l'état
 ion 3
 e pai

## Document 6 - Transformations endothermique et exothermique

- Si l'énergie du système **augmente**, Q > 0, pendant une transformation physique, on parle de **transformation endothermique**.
- Si l'énergie du système **diminue**, Q < 0, pendant une transformation physique, on parle de **transformation exothermique**.



## ▲ Attention aux signes!

- Pour une réaction endothermique le système reçoit de l'énergie et Q > 0, ce qui implique que le milieu extérieur va se refroidir.
- Au contrainte pour une réaction **exothermique** le système perd de l'énergie et Q < 0, ce qui implique que le milieu extérieur va se réchauffer.