# Activité 4.1 – Onde lumineuse

# Objectifs de la séance :

- > Connaître la vitesse de la lumière.
- > Comprendre la notion de longueur d'onde.
- **>** Comprendre la notion de rayonnement monochromatique.

La lumière est en fait une onde électromagnétique, constitué d'un champs électrique et d'un champs magnétique.

→ Quelles sont les propriétés de cette onde électromagnétique?

#### Document 1 – Onde électromagnétique

Une onde est une perturbation qui se propage.

Une onde électromagnétique a un certain nombre de propriétés qui la définisse. Cette année on va se concentrer sur sa **vitesse de propagation** et sur sa **longueur d'onde**, notée  $\lambda$ .

Une onde est dite **monochromatique** (une couleur) si elle a une longueur d'onde bien définie.

Une onde est dite **polychromatique** (plusieurs couleurs) si elle est la superposition de plusieurs ondes monochromatique.


## Document 2 – Vitesse de propagation

Dans le vide, une onde électromagnétique se propage à la vitesse de la lumière notée  $\boldsymbol{c}$ 

$$c = 3,00 \times 10^8 \text{ m.s}^{-1}$$

## Document 3 – Spectre électromagnétique

Le spectre électromagnétique est le classement des ondes électromagnétique par longueur d'onde.



Le domaine visible se trouve entre 380 nm (bleu) et 700 nm (rouge) de longueur d'onde et représente une petite partie du spectre électromagnétique.

1 - Le soleil est une source de lumière qui émet une onde électromagnétique
$\square$ monochromatique, avec une longueur d'onde.
$\hfill\Box$ polychromatique, avec plusieurs longueurs d'onde.
Pour mieux visualiser la vitesse de la lumière, on va la comparer avec la vitesse d'un TGV. Un TGV a une vitesse de pointe de 300 km.h <sup>-1</sup> = 1080 m.s <sup>-1</sup> .  2 - Calculer le temps que met le TGV pour parcourir 1000 km = 10 <sup>6</sup> m (distanc Paris-Marseille).
3 – Calculer le temps que met la lumière pour parcourir 10 <sup>6</sup> m. Comparer les deux temps de parcours.
Document 4 – Longueur d'onde et énergie
L'énergie d'une onde électromagnétique est liée à sa longueur d'onde. Plus la longueur d'onde est petite et plus l'énergie d'une onde électromagnétique est élevée. Il peut être dangereux d'être exposé à une onde électromagnétique avec une énergie élevée, qui pourrait endommager les tissus vivants.  Une onde électromagnétique très énergétique, dans le domaine des rayons X, peut briser les liaisons covalentes d'une molécules ou arracher des électrons d'un atome,
ce qui peut tuer des cellules vivantes.
4 – Expliquer pourquoi un laser rouge est moins dangereux qu'un laser bleu.