

## Activité 6.5 – Saponification d'une matière grasse

### Objectifs de la séance :


- Comprendre la réaction de saponification.
- Calculer le rendement d'une réaction de saponification.

**Contexte :** En ajoutant une base forte comme la soude dans une matière grasse, on peut transformer la matière grasse en savon, c'est la **saponification**.

→ Quelle réaction décrit la formation d'un savon à partir d'une matière grasse ?

### Document 1 – Réaction de saponification

La **saponification** est l'hydrolyse d'un triglycéride en **milieu basique**. Cette réaction va transformer le triester en glycérol et en 3 ions carboxylate.



Les ions carboxylate  $\text{R}-\text{CO}_2^-$  sont **amphiphile** : ils possèdent une tête ionique hydrophile et une chaîne carbonée hydrophobe.

Grâce à leur caractère amphiphile, les ions carboxylate vont venir se placer à l'interface entre les matière grasse et l'eau, ce qui permet d'enlever les résidus gras et en fait de bon détergents.

### Document 2 – Réalisation pratique

En pratique on réalise du savon en mélangeant une **base forte** avec une **matière grasse** et en chauffant à reflux. Le **chauffage à reflux** a deux intérêts :


- chauffer le milieu réactionnel pour accélérer la réaction de saponification ;
- ne pas perdre de matière en condensant les vapeurs qui s'échappent du ballon avec le réfrigérant.

Le plus souvent on utilise de la soude NaOH ou de la potasse KOH comme base forte.

D'après la réaction de saponification du document 1, pour 1 mole de triglycéride, on produira 3 moles de savon, soit

$$n_{\text{savon}} = 3 \times n_{\text{triglycéride}}$$

En pratique la réaction n'est pas totale et on perd un



peu de matière avec le chauffage au cours de la réaction, on a donc un **rendement**  $\eta$  (« eta ») inférieur à 100 %. On calcule le rendement grâce à la relation

$$\eta = \frac{n_{\text{savon obtenu}}}{n_{\text{savon théorique}}}$$

### Document 3 – L'huile d'olive

On va considérer que l'huile d'olive est constituée à 70 % en masse de trioléine, un acide gras composé de trois acides oléique.

La masse molaire de la trioléine est  $M = 884 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ .

**1 –** On introduit 10 g d'huile d'olive dans un ballon. Calculer la quantité de matière de trioléine  $n_o$  introduite dans le ballon.

.....

.....

.....

.....

**2 –** Calculer la quantité de matière de savon  $n_{\text{savon}}$  que l'on s'attendrait à produire avec la réaction de saponification de la trioléine.

.....

.....

.....

.....

**3 –** Expérimentalement, on obtient une quantité de matière de savon  $n_{\text{exp}} = 1,9 \times 10^{-2} \text{ mol}$ . Calculer le rendement  $\eta$  de cette réaction.

.....

.....

.....

.....