

Combinatorică

Programa școlară ne pune cel mai adesea în situația de a număra pentru o mulțime finită nevidă A :

- (sub)mulțimi finite de elemente din A ,
- (sub)mulțimi ordonate finite de elemente din A ,
- sisteme ordonate finite de elemente din A .

Să începem cu ultimele dintre ele. Un *sistem ordonat finit de elemente din A* este un element (a_1, a_2, \dots, a_k) al produsului cartezian $\underbrace{A \times \dots \times A}_{k \text{ mulțimi}}$ ($k \in \mathbb{N}$). O simplă schimbare de reprezentare — eliminarea parantezelor și a virgulelor — conduce la scrierea

$$a_1 a_2 \dots a_k,$$

care justifică denumirea de *cuvânt de lungime k peste A* sau *cuvânt cu elemente din A* pe care o preferăm celei de mai sus. Numărul k se numește *lungimea cuvântului*, iar elementele a_1, \dots, a_k se numesc *componentele cuvântului*. Pentru două cuvinte $a_1 a_2 \dots a_k$ și $b_1 b_2 \dots b_s$,

$$a_1 a_2 \dots a_k = b_1 b_2 \dots b_s \Leftrightarrow k = s \text{ și } a_i = b_i, \forall i = 1, 2, \dots, k.$$

Cuvântul vid (peste A) este singurul cuvânt (peste A) care are lungimea 0.

Observațiile 1 *i) Subliniem câteva deosebiri esențiale între mulțime și cuvânt:*

- Într-o mulțime, ordinea în care scriem elementele nu contează, pe când în cuvânt ordinea componentelor este importantă.
- Elementele unei mulțimi sunt distincte, în timp ce componentele unui cuvânt pot să coincidă.
- ii) Dacă A are n elemente (scriem $|A| = n$), atunci numărul cuvintelor de lungime k peste A este*

$$|A^k| = n^k \quad (k, n \in \mathbb{N}, n \neq 0).$$

Acest număr este egal cu numărul funcțiilor de la $\{1, \dots, k\}$ la A (și, printr-o generalizare simplă, și cu numărul funcțiilor de la o mulțime cu k elemente la o mulțime cu n elemente).

O submulțime finită a mulțimii nevide A în care elementele sunt aranjate într-o anumită ordine se numește submulțime ordonată a mulțimii A . Dacă evidențiem ordinea prin numerotarea elementelor, o submulțime ordonată cu k elemente din A ($k \in \mathbb{N}$) este un sistem ordonat (a_1, a_2, \dots, a_k) cu toate componentele distincte, adică un cuvânt $a_1 a_2 \dots a_k$ (peste A) care are componentele distincte.

Definiția 2 Fie A o mulțime cu $|A| = n$ ($n \in \mathbb{N}^*$) și fie $k \in \mathbb{N}$, $0 \leq k \leq n$. Submulțimile ordonate de k elemente ale lui A se numesc aranjamente de n (elemente) luate câte k .

Observația 3 Două aranjamente de n luate câte k se deosebesc prin natura elementelor lor sau prin ordinea elementelor lor (sau ambele).

Notăția 4 Notăm cu A_n^k numărul aranjamentelor de n luate câte k .

Observația 5 Dacă $k, n \in \mathbb{N}$, $k \leq n$ atunci

$$A_n^k = n(n-1)(n-2) \dots (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

Cum pentru un alfabet vid se poate forma un singur cuvânt, cuvântul vid, iar acesta nu are componente care să se repete, putem scrie $A_0^0 = 1$. Așadar, $A_n^0 = 1$ chiar și atunci când $n = 0$.

Definiția 6 Fie A o mulțime finită (nevidă) cu $|A| = n$. Se numește permutare a mulțimii A sau permutare de n elemente orice mulțime ordonată (cuvânt cu componentele distincte) care se poate forma cu toate cele n elemente ale mulțimii A . Cu alte cuvinte, o permutare de n elemente este un aranjament de n elemente luate câte n .

Observația 7 Două permutări de n elemente se deosebesc doar prin ordinea elementelor lor.

Notația 8 Notăm cu P_n numărul permutărilor mulțimii A cu n elemente.

Observația 9 Ținând cont de definiția permutărilor, $P_n = A_n^n$. Așadar,

$$P_n = n! = n(n-1)(n-2) \cdots 3 \cdot 2 \cdot 1, \forall n \in \mathbb{N}. \quad \checkmark$$

Definiția 10 Pentru o mulțime (nevidă) A cu n elemente, submulțimile lui A având fiecare câte k elemente, unde $k \in \mathbb{N}$, $0 \leq k \leq n$, se numesc combinații de n (elemente) luate câte k .

Observația 11 Două combinații de n luate câte k se deosebesc prin natura elementelor lor.

Notația 12 Notăm cu C_n^k numărul combinațiilor de n luate câte k .

Observația 13 Dacă $k, n \in \mathbb{N}$, $k \leq n$ atunci

$$C_n^k = \frac{n(n-1)(n-2) \cdots (n-k+1)}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \quad (k \leq n). \quad \checkmark$$

Chiar și când $A = \emptyset$ există o singură submulțime cu 0 elemente a mulțimii A , prin urmare putem scrie $C_n^0 = 1$ pentru orice $n \in \mathbb{N}$.

Enunțuri

1. a) În câte moduri poate fi ordonată mulțimea $\{1, 2, 3, \dots, 14\}$ astfel încât fiecare număr par să aibă (o poziție de) rang par?
b) În câte moduri pot fi așezați 7 băieți și 7 fete pe un rând cu 14 de scaune astfel încât să nu avem 2 vecini de același sex?
2. În câte moduri se pot împărți 6 creioane de culori diferite la 10 copii de vârste diferite în așa fel încât fiecare copil să primească cel mult un creion? Dar dacă cel mai mic dintre copii primește neapărat un creion?
3. Fie $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 5$. În plan sunt date n puncte astfel încât oricare 3 dintre ele sunt necoliniare.
a) Câte linii poligonale cu 4 segmente având vârfurile în aceste puncte se pot construi?
→ b) Prin câte segmente se pot uni aceste puncte? ← *formați subm. cu 2 elem. dintre cele n*
c) Câte triunghiuri diferite cu vârfurile în aceste puncte există? ← *— — — 3 elem. — — —*
4. Fie $k, n \in \mathbb{N}$, $n \geq k \geq 3$. În plan sunt date n puncte dintre care, în afară de k puncte care sunt situate pe o aceeași dreaptă, oricare 3 puncte sunt necoliniare.
→ a) Prin câte drepte se pot uni aceste puncte?
b) Câte triunghiuri diferite cu vârfurile în aceste puncte există?
5. Considerăm cifrele 0, 1, 2, 3, 4 și 5. *$A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$.*
a) Câte numere de 8 cifre pot fi formate cu aceste cifre? Câte dintre acestea sunt pare?
b) Câte numere pot fi formate cu toate aceste cifre astfel încât în fiecare număr fiecare cifră apare exact o dată? Câte dintre acestea sunt pare?
✓ c) Câte numere de 4 cifre pot fi formate cu aceste cifre astfel încât în fiecare număr fiecare cifră apare o singură dată? Câte dintre acestea sunt pare?
d) Câte numere pot fi formate cu aceste cifre astfel încât în fiecare număr fiecare cifră apare cel mult o dată? Câte dintre acestea sunt pare?
e) Câte numere de 4 cifre pot fi formate cu aceste cifre astfel încât în fiecare număr fiecare cifră este strict mai mică (respectiv mai mare) decât precedentă? Câte dintre acestea sunt pare?
6. Să se determine numărul legilor de compoziție ce pot fi definite pe o mulțime M cu 4 elemente. Câte dintre acestea sunt comutative? Câte legi de compoziție admit element neutru? Să se generalizeze la o mulțime cu n elemente ($n \in \mathbb{N}^*$). *(acasă).*

...

k cäsute


- b) $7! \cdot 7!$ moduri de aranjare dacă începem cu un băiat } \Rightarrow
 — " ——— " ——— " ——— " ——— fată
 \Rightarrow răsp. este $2 \cdot 7! \cdot 7!$

- În cazul în care celui mai mic copil îi dăm neapărat un creion
 \Rightarrow nr. cântot este $\underbrace{6 \cdot A_g^r}_g = \dots$


- $$P: \frac{1}{2} \cdot A^5$$

R: $\frac{1}{2 \cdot 4} \cdot A_n^4$

active
they expand or
contract vary



- c) $R: C_k^3$

- 4). 

a) R: $C_n^2 - C_k^2 + 1 \stackrel{\text{dreierte d.}}{=} \dots$

4 2 pcte de pe d
determină aceeași dreptă pe d

b) R: $C_n^3 - C_k^3 \leftarrow \forall 3 \text{ pte de pe } d \text{ au formarea } \Delta.$
 $= \dots$

J. a) curenți \leftrightarrow număr

Potem forma 6^8 cuvinte cu cele 6 cifre date. Dintre acestea sunt numere cu 8 cifre doar acelea care nu încep cu 0.

Curante care încep cu 0 : $6^7 \leftarrow$

\Rightarrow nr. căutat este $6^8 - 6^7 = J \cdot 6^7$.

Diante acutia mult pare ...

- ultima cifră este 0, 2, 4 $\Rightarrow 3 \cdot (6^7 - 6^6)$ numere.

6) Numărul permutărilor. Nr. cursivelor ce pot fi formate cu cerința
din enunț = nr. permut. mult. lui $A = 6! /$

Corrente care încep cu 0: $J!$

! \Rightarrow ar. căutat este $6! - 5!$

Dintre acestea sunt pare ...

- cu ultima cifra 0 : 5!

- cu ultima cifră 0 : $5!$
- cu ultima cifră 2 sau 4 : $2(5! - 4!)$

} \Rightarrow nr. căutat este $5! + 2(5! - 4!)$.

c) Căruți de lungime 4 pe la A cu comp. distructe $\rightarrow A_6^4$

Curvinte — a — " — a — care
Incep cu 0: A_5^3 .

\Rightarrow w. cântat este $A_6^4 - A_5^3$.

Dintre acestea mult pare ...

- cu 0 ultima cifra: A_5^3

— cu 2 sau 4 — : $2 \cdot (A_5^3 - A_4^2) \checkmark \Rightarrow$ nr. cautat. este $A_5^3 - 2(A_5^3 - A_4^2)$

d) Nr. cu 6 cifre: $A_6^6 - A_5^5 = 6! - 5!$

$$\rightarrow -\sqrt{-1} : A_6^5 - A_7^4$$

$$\dots, i, 6 \quad \vdots \quad (0 \text{ continue})$$

Teuă: ...

e) ... nr. unică decât precedenta ... (ordinea cifrelor în
cuvânt / nr. este s. descrescătoare)
 \Rightarrow nr. căutat este C_6^4 .

Dintre acestea sunt pare ...

- cu 0 ultima cifră: C_5^3
- - - 2 - - - : 1
- - - 4 - - - : 0 } \Rightarrow nr. căutat este
 $C_5^3 + 1$

Restul: Teuă

...