

# 第12回 級数による解法

## 一階微分方程式

$$y' = f(x, y) \tag{1}$$

において、 $f(x, y)$  が点  $x(x_0, y_0)$  の近くで偏微分可能で、 $f_x(x, y)$ 、 $f_y(x, y)$  が連続ならば  $y(x_0) = y_0$  を満たす解  $y = g(x)$  がただ1つ存在する。(p.5 定理1.1)

この解  $y$  を  $x = x_0$  でテイラー級数の形で表す。

$$y = A_0 + A_1(x - x_0) + A_2(x - x_0)^2 + \cdots + A_n(x - x_0)^n + \cdots \tag{2}$$

微分方程式を解く → 微分方程式を満たすように係数  $A_i$ , ( $i = 0, \dots, n, \dots$ ) を決める。

- 1.  $x = x_0$  で  $y = y_0$  より、 $A_0 = y_0$
- 2. (2)を微分

$$y' = A_1 + 2A_2(x - x_0) + \cdots + nA_n(x - x_0)^{n-1} + \cdots$$

これを(1)に代入して、 $A_1, A_2, \dots$  を決める。

$x_0 = 0$  のとき、初期条件が与えられていないときは、

$$y = A_0 + A_1x + A_2x^2 + \cdots + A_nx^n + \cdots$$

とする (マクローリン級数)。

### p.66 例題1

$y' - 2xy = x$  を  $x$  のべき級数による解法で解け。

$$\begin{aligned} y &= A_0 + A_1x + A_2x^2 + \cdots + A_nx^n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} A_nx^n \\ y' &= A_1 + 2A_2x + \cdots + nA_nx^{n-1} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)A_{n+1}x^n \\ -2xy &= -2A_0x - 2A_1x^2 - \cdots - 2A_{n-1}x^n + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} -2A_{n-1}x^n \end{aligned}$$

より、

$$y' - 2xy = A_1 + \sum_{n=1}^{\infty} \{(n+1)A_{n+1} - 2A_{n-1}\} x^n = x$$

- $n = 0$  のとき、両辺の  $x$  の0次項を比較して、 $A_1 = 0$
- $n = 1$  のとき、両辺の  $x$  の1次項を比較して、 $2A_2 - 2A_0 = 1 \rightarrow A_2 = (1 + 2A_0)/2$
- $n = 2$  のとき、両辺の  $x$  の2次項を比較して、 $3A_3 - 2A_1 = 0 \rightarrow A_3 = (2/3)A_1 = 0$
- $n = 3$  のとき、両辺の  $x$  の3次項を比較して、 $4A_4 - 2A_2 = 0 \rightarrow A_4 = (1/2)A_2$
- $n = 4$  のとき、両辺の  $x$  の4次項を比較して、 $5A_5 - 2A_3 = 0 \rightarrow A_5 = (2/5)A_3 = 0$
- $n = 5$  のとき、両辺の  $x$  の5次項を比較して、 $6A_6 - 2A_4 = 0 \rightarrow A_6 = (1/3)A_4$
- $\vdots$

$$\begin{aligned} \text{偶数次項：} A_2 &= \frac{1}{2}(1 + 2A_0), \quad A_{2m} = \frac{1}{m}A_{2m-2} \quad (m \geq 2) \\ A_{2m} &= \frac{1}{2} \frac{1}{m!} (1 + 2A_0) \quad (m \geq 1) \\ \text{奇数次項：} A_1 &= A_3 = A_5 = \cdots = A_{2m+1} = \cdots = 0 \quad (m \geq 0) \end{aligned}$$

以上より、

$$\begin{aligned} y &= A_0 + \frac{1}{2}(1 + 2A_0) \left\{ x^2 + \frac{1}{2!}x^4 + \frac{1}{3!}x^6 + \cdots + \frac{1}{m!}x^{2m} \right\} \\ &= -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}(1 + 2A_0) \left\{ 1 + x^2 + \frac{1}{2!}x^4 + \frac{1}{3!}x^6 + \cdots + \frac{1}{m!}x^{2m} \right\} \\ &= -\frac{1}{2} + c \left\{ 1 + x^2 + \frac{1}{2!}x^4 + \frac{1}{3!}x^6 + \cdots + \frac{1}{m!}x^{2m} \right\} \\ &= -\frac{1}{2} + ce^{x^2} \end{aligned}$$

### 解の公式 (p.13 (2)) による例題1の解法

$$y' - 2xy = x \rightarrow P(x) = -2x, Q(x) = x$$

$$\begin{aligned} y &= e^{-\int P(x)dx} \left( \int Q(x)e^{\int P(x)dx} + c \right) \\ &= -\frac{1}{2} + ce^{x^2} \quad \leftarrow \text{級数による解法と同じ} \end{aligned}$$

### p.67 例題2

$y'' - 2xy' + 2y = 0$  (エルミットの微分方程式) を  $x$  のべき級数による解法で解け。

(定数係数でないので、これまでの解法では解けない)

$$\begin{aligned}y &= a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} a_nx^n \\y' &= a_1 + 2a_2x + \cdots + na_nx^{n-1} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)a_{n+1}x^n \\y'' &= 2a_2 + 2 \cdot 3a_3x + \cdots + n(n+1)a_{n+1}x^{n-1} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(n+2)a_{n+2}x^n \\-2xy' &= -2 \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)a_{n+1}x^{n+1} = -2 \sum_{n=1}^{\infty} na_nx^n \\y'' - 2xy' + 2y &= \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(n+2)a_{n+2}x^n - 2 \sum_{n=1}^{\infty} na_nx^n + 2 \sum_{n=0}^{\infty} a_nx^n \\&= 2a_2 + 2a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \{(n+1)(n+2)a_{n+2} - 2na_n + 2a_n\} x^n \\&= 2(a_0 + a_2) + \sum_{n=1}^{\infty} \{(n+1)(n+2)a_{n+2} - 2(n-1)a_n\} x^n = 0\end{aligned}$$

より、

- 両辺の0次項を比較して、 $2(a_0 + a_2) = 0 \rightarrow a_2 = -a_0$
- 両辺の1次項を比較して、 $2 \cdot 3a_3 = 0 \rightarrow a_3 = 0$
- 両辺の2次項を比較して、 $3 \cdot 4a_4 - 2a_2 = 0 \rightarrow a_4 = (1/6)a_2$
- 両辺の3次項を比較して、 $4 \cdot 5a_5 - 2 \cdot 2a_3 = 0 \rightarrow a_5 = (1/5)a_3 = 0$
- 両辺の $n$ 次項を比較して、 $(n+1)(n+2)a_{n+2} - 2(n-1)a_n = 0 \rightarrow a_{n+2} = 2(n-1)/(n+1)(n+2)a_n$

$$\begin{aligned}\text{偶数次項: } a_{2m} &= \frac{2(2m-3)}{(2m-1)2m} a_{2m-2} = \frac{2(2m-3)}{(2m-1)2m} \frac{2(2m-5)}{(2m-3)(2m-2)} a_{2m-4} \\&= -\frac{1}{(2m-1)m!} a_0 \quad (m \geq 1) \\\text{奇数次項: } A_3 = A_5 = A_7 = \cdots = A_{2m+1} = \cdots = 0 \quad (m \geq 1)\end{aligned}$$

以上より、

$$y = a_0 \left( 1 - x^2 - \frac{1}{2!3} x^4 - \cdots - \frac{1}{n! (2n-1)} x^{2n} - \cdots \right) + a_1 x$$