



# Практикум з математичного аналізу

для студентів спеціальності “Інженерія програмного забезпечення”  
факультету комп’ютерних наук та кібернетики

Семестр 1

Ляшко С. І., Аджубей Л. Т., Затула Д. В., Гуляницький А. Л.



# Зміст

<b>Передмова</b> .....	<b>3</b>
 <b>Розділ 1. Вступ до математичного аналізу</b>	
<b>Тема 1.</b> Логічні символи. Множини. Бінарні відношення. Відображення (функції). Упорядковані простори .....	<b>4</b>
 <b>Розділ 2. Числові послідовності</b>	
<b>Тема 2.</b> Означення та властивості границі послідовності. Монотонні послідовності. Число $e$ .....	<b>13</b>
<b>Тема 3.</b> Фундаментальні послідовності. Підпослідовності. Критерій Коші. Теореми Коші та Штольца .....	<b>17</b>
 <b>Розділ 3. Границя та неперервність функції</b>	
<b>Тема 4.</b> Границя функції в точці. Порівняння функцій в околі граничної точки. Асимптотичні формули .....	<b>22</b>
<b>Тема 5.</b> Неперервність функції. Класифікація точок розриву .....	<b>31</b>
<b>Тема 6.</b> Рівномірно неперервні функції .....	<b>35</b>
 <b>Розділ 4. Диференційне числення</b>	
<b>Тема 7.</b> Похідна та диференціал функції. Правила диференціального числення .....	<b>38</b>
<b>Тема 8.</b> Похідні та диференціали вищих порядків. Формула Лейбніца ..	<b>44</b>
<b>Тема 9.</b> Формули Тейлора та Маклорена. Правила Лопітала .....	<b>48</b>
<b>Тема 10.</b> Основні теореми диференціального числення. Локальні екстремуми. Опуклі функції. Дослідження функцій за допомогою похідної .....	<b>52</b>
<b>Відповіді та вказівки</b> .....	<b>59</b>
<b>Рекомендовані джерела</b> .....	<b>62</b>

# Передмова

Курс математичного аналізу є основою фундаментальної математичної підготовки для випускників природничих спеціальностей у класичних університетах.

Даний практикум з математичного аналізу призначений студентам спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення” факультету комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Він відповідає програмі курсу, яка складається з 58 годин лекцій та 56 годин практичних занять. Практикум складається з двох частин, кожна з яких містить 14 практичних занять і відповідає матеріалу одного семестру.

Основною метою, яку переслідували автори, є забезпечення навчальним матеріалом практичних занять в рамках стислого курсу математичного аналізу. В посібнику кожна тема містить всі необхідні означення і твердження, що дозволяє розв’язувати запропоновані задачі без додаткової літератури. В якості основного теоретичного матеріалу і практичних завдань використані підручники і збірник задач з математичного аналізу авторів І.І. Ляшко, С.І. Ляшко, В. Ф. Ємельянов, О.К. Боярчук, І.М. Александрович, О.І. Молодцов, Д.А. Номіровський, Б.В. Рубльов та інші [1–3, 7].

## Тематичний план практичних занять. Семестр 1

<b>Логічні символи. Множини. Відображення. Упорядковані простори</b>
1. Логічні символи. Множини. Метод математичної індукції.
2. Числові функції. Графіки у декартовій та полярній системах координат.
3. Бінарні відношення. Відображення (функції). Упорядковані простори.
<b>Числові послідовності</b>
4. Границя числової послідовності.
5. Критерій Коші. Теорема Вейєрштрасса. Число $\epsilon$ . Теорема Штольца.
6. Підпослідовності. Верхня та нижня границі. Рекурентні послідовності.
<b>Границя та неперервність функції</b>
7. Границя функції в точці. Символи Ландау.
8. Асимптотичні формули. Порівняння функцій в околі граничної точки.
9. Неперервність функції. Класифікація точок розриву.
10. Рівномірно неперервні функції.
<b>Диференційне числення</b>
11. Похідна та диференціал функції.
12. Похідні та диференціали вищих порядків. Формула Лейбніца.
13. Формули Тейлора та Маклорена. Правила Лопітала.
14. Основні теореми диференціального числення. Побудова графіків функцій з повним дослідженням.

# Розділ 1. Вступ до математичного аналізу

## Тема 1. Логічні символи. Множини. Бінарні відношення. Відображення (функції). Упорядковані простори

У курсі математичного аналізу використовуються такі символи:

- $\forall$  — *квантор загальності*, еквівалентний вислову “для будь-якого”;
- $\exists$  — *квантор існування*, еквівалент слова “існує”;
- $\exists!$  — еквівалентний вислову “існує єдиний”;
- $\Rightarrow$  — *імплікація*, визначається у записах типу  $A \Rightarrow B$  як вислів “із істинності твердження  $A$  випливає твердження  $B$ ”;
- $\Leftrightarrow$  — *символ еквівалентності*, запис типу  $A \Leftrightarrow B$  означає, що одночасно виконуються імплікації  $A \Rightarrow B$  та  $B \Rightarrow A$ , або ж “для того, щоб  $A$  було істинним, необхідно та достатньо, щоб  $B$  було істинним”;
- $\vee$  — *символ диз’юнкції*, запис  $A \vee B$  означає виконання або  $A$ , або  $B$ ;
- $\wedge$  — *символ кон’юнкції*, запис  $A \wedge B$  означає одночасне виконання  $A$  та  $B$ ;
- $\stackrel{def}{=}$  — “дорівнює за означенням”;
- $\stackrel{def}{\Leftrightarrow}$  — “визначається за означенням”,

та позначення:

- $i = \overline{n, m}$  — запис означає, що величина (індекс)  $i$  набуває по чергові усіх цілих значень, починаючи з  $n$  і закінчуючи  $m$  включно;
- $\sum_{i=1}^n a_i \stackrel{def}{=} a_1 + a_2 + \dots + a_n$  — *сума  $n$  доданків*;
- $\prod_{i=1}^n a_i \stackrel{def}{=} a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n$  — *добуток  $n$  множників*;
- $n! \stackrel{def}{=} \prod_{k=1}^n k$  — *факторіал* (визначається для натуральних чисел),  $0! \stackrel{def}{=} 1$ ;
- $(2n)!! \stackrel{def}{=} \prod_{k=1}^n (2k)$ ,  $(2n+1)!! \stackrel{def}{=} \prod_{k=1}^n (2k+1)$  — *подвійні факторіали*;
- $C_n^k \stackrel{def}{=} \frac{n!}{k!(n-k)!}$  — *біноміальні коефіцієнти*;
- $\emptyset$  — *порожня множина*;
- $a \in A$  ( $a \notin A$ ) — означає, що  $a \in$  (не  $\in$ ) елементом множини  $A$ ;
- $A \subset B$  —  $A$  є *підмножиною*  $B$  (в нестрогому розумінні), тобто  $\forall a : (a \in A \Rightarrow a \in B)$ ;
- $A \not\subset B$  —  $A$  не є підмножиною  $B$ , тобто  $\exists a \in A \wedge a \notin B$ ;

- $A = B$  — *рівність множин*, тобто  $(A \subset B) \wedge (B \subset A)$ ;
- $B = \{a \in A \mid P(a)\}$  — це означає, що  $B$  складається з елементів множини  $A$ , які мають задану *властивість*  $P$ ;
- $\exp M \left(2^M\right)$  — *універсальна множина*, тобто множина усіх підмножин множини  $M$ .

Визначимо операції над множинами, вважаючи, що усі множини є підмножинами деякої універсальної множини  $M$ , тобто вони належать  $\exp M$  [1, с. 9]:

- $A \cap B \stackrel{def}{=} \{a \mid (a \in A) \wedge (a \in B)\}$  — *перетин* множин  $A$  і  $B$ ;
- $A \cup B \stackrel{def}{=} \{a \mid (a \in A) \vee (a \in B)\}$  — *об'єднання* множин  $A$  і  $B$ ;
- $A \setminus B \stackrel{def}{=} \{a \mid (a \in A) \wedge (a \notin B)\}$  — *різниця* множин  $A$  і  $B$ ;
- $A \Delta B \stackrel{def}{=} (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$  — *симетрична різниця* множин  $A$  і  $B$ ;
- $CA \stackrel{def}{=} M \setminus A$  — *доповнення* множини  $A$ .

Узагальнимо поняття об'єднання та перетину для скінченної сукупності множин  $A_i$ ,  $i = \overline{1, n}$ :

- $\bigcap_{i=1}^n A_i \stackrel{def}{=} \{a \mid \forall i = \overline{1, n} \ a \in A_i\}$  — *перетин* множин;
- $\bigcup_{i=1}^n A_i \stackrel{def}{=} \{a \mid \exists i = \overline{1, n} \ a \in A_i\}$  — *об'єднання* множин,

та для зліченної сукупності множин  $A_i$ ,  $i \in \mathbb{N}$ :

- $\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \stackrel{def}{=} \{a \mid \forall i \in \mathbb{N} \ a \in A_i\}$  — *перетин* множин;
- $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \stackrel{def}{=} \{a \mid \exists i \in \mathbb{N} \ a \in A_i\}$  — *об'єднання* множин.

Деякі основні числові множини:

- $\mathbb{N}$  — *множина натуральних чисел*;
- $\mathbb{Z}$  — *множина цілих чисел*;
- $\mathbb{Q}$  — *множина раціональних чисел*;
- $\mathbb{R}$  — *множина дійсних чисел*;
- $\mathbb{C}$  — *множина комплексних чисел*.

Також, якщо до символів  $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$  додається індекс “+” чи “−”, то це означає, що розглядається лише *невід’ємна* (*недодатна*) частина множини. Наприклад,  $\mathbb{Z}^+$  — цілі невід’ємні числа,  $\mathbb{R}^-$  — дійсні недодатні числа; обидві ці множини містять нуль.

**Принцип двоїстості.** Довільне математичне твердження можна записати за допомогою логічних символів ( $\forall, \exists$  та деякої умови  $C$ ). Заперечення сформульованого твердження (тобто протилежне твердження) отримується шляхом заміни кожного квантора на протилежний ( $\exists, \forall$ ), а умови  $C$  на її заперечення.

## Поняття відображення (функції)

Пара  $(x, y)$  є *впорядкованою*, якщо вказано порядок:  $x$  — перший елемент,  $y$  — другий елемент. Аналогічно визначається *впорядкована система* із  $n$  елементів  $(x_1, x_2, \dots, x_n)$  [1, с. 10].

**Декартовим добутком** множин  $X$  та  $Y$  називається множина

$$X \times Y \stackrel{\text{def}}{=} \{(x, y) \mid x \in X \wedge y \in Y\}.$$

Аналогічно *декартовим добутком*  $n$  множин  $X_1, X_2, \dots, X_n$  називається множина

$$X_1 \times X_2 \times \dots \times X_n \stackrel{\text{def}}{=} \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_k \in X_k, k = \overline{1, n}\}.$$

Якщо множини  $X$  та  $Y$  співпадають (або ж  $\forall i = \overline{1, n} X_i = X$ ), то їх декартів добуток позначається як  $X \times X = X^2$  ( $X_1 \times X_2 \times \dots \times X_n = X^n$ ).

Множина  $\Gamma$  називається **бінарним відношенням** між елементами множин  $X$  та  $Y$ , якщо  $\Gamma \subset X \times Y$ .

**Першою (другою) проекцією** бінарного відношення  $\Gamma \subset X \times Y$  називається множина  $\Gamma_1 = \text{pr}_1 \Gamma = \{x \in X \mid \exists y \in Y : (x, y) \in \Gamma\}$  ( $\Gamma_2 = \text{pr}_2 \Gamma = \{y \in Y \mid \exists x \in X : (x, y) \in \Gamma\}$ ).

Множина  $\Gamma_1(x) = \{y \in Y \mid (x, y) \in \Gamma\}$  ( $\Gamma_2(y) = \{x \in X \mid (x, y) \in \Gamma\}$ ) називається **першим (другим) перерізом**  $\Gamma$  за допомогою елемента  $x(y)$ .

Для кожного бінарного відношення  $\Gamma \subset X \times Y$  можна визначити **обернене бінарне відношення**  $\Gamma^{-1} \subset Y \times X$  за правилом:  $\Gamma^{-1} = \{(y, x) \mid (x, y) \in \Gamma\}$ .

Бінарне відношення  $\Gamma$  називається **функціональним**, якщо воно не містить різних упорядкованих пар з однаковими першими компонентами.

Впорядкована трійка множин  $(X, Y, \Gamma)$  називається **відображенням (функцією)** з множини  $X$  в множину  $Y$ , якщо  $\Gamma$  є функціональним бінарним відношенням між елементами множин  $X$  та  $Y$ , і позначається довільною літерою, наприклад,  $f$ . При цьому замість  $f = (X, Y, \Gamma)$  записують  $f : X \rightarrow Y$ , або  $y = f(x)$ ,  $x \in X$ , або  $x \mapsto f(x)$ ,  $x \in X$ , де  $\Gamma$  — **графік відображення**.

Перша проекція графіка  $\Gamma$  відображення  $f$  називається **областю (множиною) визначення** відображення  $f$  та позначається  $D_f$ . Друга проекція графіка відображення  $f$  — **область (множина) значень**, позначається  $E_f$ .

Якщо  $x \in D_f$  і пара  $(x, y) \in \Gamma$ , то елемент  $y$  називається **значенням функції**  $f$  на елементі  $x$  і позначається  $f(x)$ .

Якщо відома область визначення  $D_f$  і значення  $f(x) \forall x \in D_f$ , то графік  $\Gamma(f)$  відображення  $f$  будується за правилом:  $\Gamma(f) = \{(x, f(x)) \mid x \in D_f\}$ .

Нехай  $f : X \rightarrow Y$ . Якщо  $(x, y) \in \Gamma_f$ , то елемент  $y$  називається **образом елемента**  $x$  при відображенні  $f$ , а елемент  $x$  називається **прообразом елемента**  $y$  і позначається  $f^{-1}(y)$ . **Образом множини**  $A \subset D_f$  є підмножина  $E_f$ , що визначається як  $f(A) = \{f(x) \mid x \in A\}$ . Аналогічно для будь-якої множини  $B \subset E_f$  підмножина  $D_f$ , що визначається як  $f^{-1}(B) = \{x \in D_f \mid \exists y \in B : y = f(x)\}$  називається **прообразом множини**  $B$ .

Нехай  $f : X \rightarrow Y$  і  $U \subset X$ . Визначимо відображення  $g : U \rightarrow Y$ , поклавши  $g(x) = f(x)$ ,  $x \in U$ . Тоді  $g$  називається **звуженням** відображення  $f$  на  $U$ , а відображення  $f$  — **продовженням** відображення  $g$  на  $X$ .

Нехай  $f : X \rightarrow Y$ ,  $g : Y \rightarrow Z$ . Відображення  $h : X \rightarrow Z$ , що визначається формулою  $h(x) = g(f(x))$ ,  $x \in X$ , називається **суперпозицією** відображень  $f$  та  $g$  і позначається так:  $h = g \circ f$  [1, с. 15].

Якщо задані відображення  $T \xleftarrow{\varphi} X$ ,  $T \xrightarrow{\psi} Y$ , то існує відображення  $X \xrightarrow{f=\psi \circ \varphi^{-1}} Y$ . Це відображення називається **параметрично заданим** за допомогою відображень  $\varphi$  та  $\psi$ , а змінна  $t$  при цьому називається **параметром**.

Розглянемо відображення  $X \times Y \xrightarrow{F} G$ , а також рівняння

$$F(x, y) = c, \quad (1)$$

де  $c \in G$ . Якщо  $\forall x \in X \exists ! y = f(x) \in Y$  такий, що  $F(x, f(x)) = c$ , тоді вважаємо, що визначено функцію  $X \xrightarrow{f} Y$ . При цьому  $f$  називається **неявною функцією**, що задається рівнянням 1.

### Упорядковані простори

Нехай задано множину  $M$ . Бінарне відношення  $\sigma \subset M \times M$  називається **відношенням часткового порядку** на множині  $M$ , якщо виконуються такі умови (аксіоми) [1, с. 20]:

1.  $\forall a \in M (a, a) \in \sigma$  (*рефлексивність*);
2.  $(a, b) \in \sigma \wedge (b, a) \in \sigma \Rightarrow a = b$  (*антисиметричність*);
3.  $(a, b) \in \sigma \wedge (b, c) \in \sigma \Rightarrow (a, c) \in \sigma$  (*транзитивність*).

Поряд з позначенням  $(a, b) \in \sigma$  будемо також вживати позначення  $a \leq b$  навіть якщо частковий порядок не задається умовою “менше або дорівнює”.

Упорядкована пара  $\Omega = (M, \sigma)$  (або  $(M, \leq)$ ), яка складається з множини  $M$  (**основний простір**) та відношення часткового порядку  $\sigma$  на ній називається **частковим упорядкованим простором**, елементи множини  $M$  — **точками** цього простору. Точки  $x_1, x_2$  називаються **порівнюваними**, якщо  $x_1 \leq x_2$  або  $x_2 \leq x_1$ , в протилежному випадку — **непорівнюваними**. Якщо простір не містить непорівнюваних елементів, то він називається **упорядкованим простором** або **лінійно упорядкованим простором**.

Нехай  $\Omega = (M, \sigma)$  — частково упорядкований простір,  $X$  — деяка множина простору (тобто  $X \subset M$ ). Елемент  $x_{\max} \in X$  ( $x_{\min} \in X$ ) називається **найбільшим (найменшим) елементом** множини  $X$ , якщо  $\forall x \in X : x \leq x_{\max}$  ( $x_{\min} \leq x$ ). Зрозуміло, що навіть в упорядкованому просторі не кожна множина має найбільший чи найменший елемент.

Елемент  $\bar{x} \in M$  ( $\underline{x} \in M$ ) називається **мажорантою (мінорантою)** множини  $X$ , якщо  $\forall x \in X x \leq \bar{x}$  ( $\underline{x} \leq x$ ). Якщо множина  $X$  має мажоранту (міноранту), то вона називається **обмеженою зверху (знизу)**. Множина, що обмежена зверху і знизу, називається **обмеженою**. Найменша мажоранта (найбільша міноранта) множини  $X$ , якщо вона існує, називається **верхньою**

(нижньою) межею множини  $X$ , або *супремумом (інфімумом)* та позначається  $\sup X$  ( $\inf X$ ).

## Метод математичної індукції

Розглянемо метод доведення тверджень Блеза Паскаля (1623 – 1662). Він відомий як **метод математичної індукції (ММІ)** [1, с.8] та базується на перевірці виконання двох лем Паскаля для тверджень  $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n, \dots$  ( $n \in \mathbb{N}$ ).

**Лема 1.** Твердження  $A_1$  — істинне.

**Лема 2.**  $\forall n \in \mathbb{N}$  із істинності твердження  $A_n$  випливає істинність  $A_{n+1}$ .

Тоді всі твердження  $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n, \dots$  — істинні.

Множина  $\mathbb{N}$  всіх натуральних чисел не обмежена зверху. У ній визначена операція додавання та мають місце такі властивості:

1.  $n \in \mathbb{N} \Rightarrow (n+1) \in \mathbb{N}$ ;

2.  $(1 \in M \wedge n \in M \Rightarrow (n+1) \in M) \Rightarrow \mathbb{N} \subset M$  (аксіома індукції).

## Практичне заняття 1

**Приклад 1.** Доведемо, що  $\forall n \in \mathbb{N} : \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$ .

Г При  $n = 1$  маємо правильну рівність  $1 = \frac{1 \cdot 2}{2}$  (база індукції). Припустимо, що рівність правильна при  $n = m$ , та доведемо її при  $n = m + 1$  (крок індукції).  
Маємо:

$$\sum_{k=1}^{m+1} k = \sum_{k=1}^m k + (m+1) = \frac{m(m+1)}{2} + (m+1) = \frac{(m+1)(m+2)}{2}.$$

Отже, за принципом математичної індукції, рівність вірна при всіх натуральних  $n$ . ┘

**Приклад 2.** Доведемо, що  $\forall n \in \mathbb{N} : \prod_{k=1}^n (1+x_k) \geq 1 + \sum_{k=1}^n x_k$ , де  $x_k$  — числа одного знаку та  $x_k \geq -1$ ,  $k = \overline{1, n}$  (нерівність Бернуллі).

Г При  $n = 1$  нерівність очевидна. Припустимо, що нерівність справедлива при  $n$ . Доведемо її справедливості при  $n + 1$ :

$$\prod_{k=1}^{n+1} (1+x_k) \geq \left(1 + \sum_{k=1}^n x_k\right) (1+x_{n+1}) = 1 + \sum_{k=1}^{n+1} x_k + x_{n+1} \cdot \sum_{k=1}^n x_k \geq 1 + \sum_{k=1}^{n+1} x_k.$$

Остання нерівність вірна, оскільки  $x_{n+1} \cdot \sum_{k=1}^n x_k \geq 0$  для довільних чисел  $x_k$ ,  $k = \overline{1, n}$ , одного знаку. ┘



Застосовуючи ММІ, доведіть рівності  $\forall n \in \mathbb{N} (n \geq n_0)$ :

$$1.1 \quad \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6};$$

$$1.2 \quad \sum_{k=1}^n k^3 = \left( \sum_{k=1}^n k \right)^2;$$

$$1.3 \quad \sum_{k=1}^{n-1} (-1)^{k-1} k^2 = (-1)^n \frac{(n-1)n}{2}, \\ n \geq 2;$$

$$1.4 \quad \sum_{k=1}^n k k! = (n+1)! - 1;$$

$$1.5 \quad \sum_{k=1}^n k(k+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3};$$

$$1.6 \quad \sum_{k=1}^n \operatorname{arctg} \frac{1}{2k^2} = \operatorname{arctg} \frac{n}{n+1};$$

$$1.7 \quad \sum_{k=1}^n \sin kx = \frac{\sin \frac{nx}{2} \cdot \sin \frac{(n+1)x}{2}}{\sin \frac{x}{2}}, \\ x \neq 2\pi m, m \in \mathbb{Z};$$

$$1.8 \quad \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos kx = \frac{\sin \frac{2n+1}{2}x}{2 \sin \frac{x}{2}}, \\ x \neq 2\pi m, m \in \mathbb{Z};$$

$$1.9 \quad \forall \{a, b\} \in \mathbb{R} : (a+b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^k b^{n-k} \text{ (біном Ньютона)}.$$

Застосовуючи ММІ, доведіть виконання нерівностей  $\forall n \in \mathbb{N} (n \geq n_0)$ :

$$1.10 \quad \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} > \frac{13}{24}, n \geq 2;$$

$$1.11 \quad \sqrt{n} < \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} < 2\sqrt{n}, n \geq 2;$$

$$1.12 \quad \frac{\prod_{k=1}^n (4k-1)}{\prod_{k=1}^n (4k+1)} < \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{4n+3}};$$

$$1.13 \quad \left| \sum_{k=1}^n x_k \right| \leq \sum_{k=1}^n |x_k|, \forall x_k \in \mathbb{R}, \\ k = \overline{1, n};$$

$$1.14 \quad \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} \leq 2 - \frac{1}{n};$$

$$1.15 \quad n^n \geq (2n-1)!!;$$

$$1.16 \quad (1+x)^n \geq 1+nx, x \geq -1;$$

$$1.17 \quad n^{n+1} > (n+1)^n, n \geq 3.$$


## Практичне заняття 2

**Полярна система координат.** Виберемо на площині промінь (числову напівпрямую  $[0, \infty)$ ). Позначимо початок променя точкою  $O$  — ця точка називається *полюсом*, а сам промінь — *полярною віссю*. З'єднаємо полюс  $O$  з деякою точкою площини  $A$  відрізком. Величину кута між полярною віссю та відрізком  $AO$  називають *полярним кутом* і вважають першою координатою точки  $A$  (позначається  $\varphi$ ), а довжина цього відрізка  $\rho = |AO|$  називається *полярним радіусом* і є другою координатою  $A$ .

Перехід від полярних координат точки до декартових координат виконується за формулами:

$$x = \rho \cos \varphi, \quad y = \rho \sin \varphi.$$

Побудову графіка функції  $\rho = f(\varphi)$  у полярній системі координат здійснюють так: будують для функції  $\rho = f(\varphi)$  відповідну функцію  $y = f(x)$ , досліджують функцію  $\rho = f(\varphi)$ , порівнюючи її з відповідною функцією  $y = f(x)$  з врахуванням особливостей графіка функції  $\rho = f(\varphi)$ . У найпростіших випадках графіки функцій будують за точками.



Надалі вважатимемо, що полярний кут набуває значень із множини  $\mathbb{R}^+$ .


**Приклад 1.** Побудуємо графік у полярній системі координат:  $\rho = a\varphi$ ,  $a > 0$  (спіраль Архімеда).

Складемо таблицю значень для  $\varphi \geq 0$  (значення подані наближено):

$\varphi$	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\pi$
$\rho$	0	$0,8a$	$1,6a$	$2,4a$	$3,1a$

$\varphi$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{2}$	$2\pi$	$\frac{5\pi}{2}$	$3\pi$
$\rho$	$3,9a$	$4,7a$	$6,3a$	$7,9a$	$9,4a$



Тепер побудуємо точки на координатній площині і з'єднаємо їх плавною лінією, таким чином отримавши графік.

**Приклад 2.** Побудуємо графік у полярній системі координат:  $\rho = \frac{\varphi}{\varphi + 1}$ .


Складемо таблицю значень для  $\varphi \geq 0$  (значення подані наближено):

$\varphi$	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\pi$	$\frac{5\pi}{4}$
$\rho$	0	0,44	0,61	0,7	0,76	0,8

$\varphi$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{7\pi}{4}$	$2\pi$	$\frac{5\pi}{2}$	$3\pi$
$\rho$	0,82	0,85	0,86	0,887	0,904

Побудуємо точки на координатній площині і з'єднаємо їх плавною лінією. Відзначимо, що значення дробу  $\frac{\varphi}{\varphi + 1}$  наближається до 1 зі збільшенням  $\varphi$ .



Побудуйте графіки дробово-лінійних функцій  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ :

**2.1**  $f(x) = \frac{6+x}{x}$ ;

**2.2**  $f(x) = \frac{7-x}{2x}$ .

Побудуйте графіки функцій  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  методом додавання:

**2.3**  $f(x) = |x| + \frac{1}{|x|}$ ;

**2.4**  $f(x) = x^2 + \frac{1}{|x|}$ ;

**2.5**  $f(x) = x + \sin x$ ;

**2.6**  $f(x) = x - \cos x$ ;

**2.7**  $f(x) = \operatorname{sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$   
(синус гіперболічний);

**2.8**  $f(x) = \operatorname{ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$   
(косинус гіперболічний).

Побудуйте графіки функцій  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  методом множення:

$$2.9 \quad f(x) = x \sin x;$$

$$2.10 \quad f(x) = e^x \cos x;$$

$$2.11 \quad f(x) = \operatorname{th} x = \frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \\ (\text{тангенс гіперболічний});$$

$$2.12 \quad f(x) = \operatorname{cth} x = \frac{\operatorname{ch} x}{\operatorname{sh} x} = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}} \\ (\text{котангенс гіперболічний});$$

$$2.13 \quad f(x) = \arctg x \cdot \cos x.$$

Побудуйте графіки функцій  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ :

$$2.14 \quad f(x) = [2^x];$$

$$2.15 \quad f(x) = [\sin x];$$

$$2.16 \quad f(x) = 2^x[x];$$

$$2.17 \quad f(x) = \sin[x];$$

$$2.18 \quad f(x) = \{x^2\};$$

$$2.19 \quad f(x) = \sqrt{\{x\}};$$

$$2.20 \quad f(x) = \frac{1}{1 - x^2};$$

$$2.21 \quad f(x) = \sin \frac{1}{x};$$

$$2.22 \quad f(x) = (\arccos x)^{-1};$$

$$2.23 \quad f(x) = \arccos \frac{1}{x};$$

$$2.24 \quad f(x) = e^{\frac{2x}{1-x^2}};$$

$$2.25 \quad f(x) = e^{\sin x};$$

$$2.26 \quad f(x) = \frac{1}{1 - 2^{\frac{x}{1-x}}};$$

$$2.27 \quad f(x) = \arctg \left( \frac{1}{x-1} + \frac{1}{x-2} + \frac{1}{x-3} \right);$$

$$2.28 \quad f(x) = \ln \left( \arctg \left( \frac{2x+3}{x+3} + \frac{6x-1}{2-2x} \right) + \frac{\pi}{2} \right).$$

Побудуйте графіки функцій, що задані у полярній системі координат:

$$2.29 \quad r = \frac{\pi}{\varphi};$$

$$2.30 \quad r = \frac{1}{2 \cos \varphi};$$

$$2.31 \quad r = 2a \cos \varphi, \quad a > 0;$$

$$2.32 \quad r = 1 + 2 \cos \varphi;$$

$$2.33 \quad r = \operatorname{tg} \varphi;$$

$$2.34 \quad r^2 + \varphi^2 = 1;$$

$$2.35 \quad r = 7 \sin 3\varphi;$$

$$2.36 \quad r = 2^{\frac{\varphi}{2\pi}};$$

$$2.37 \quad r = \frac{1}{\sin \varphi + \cos \varphi};$$

$$2.38 \quad r = -\frac{1}{\varphi - \frac{\pi}{4}};$$

$$2.39 \quad r = 2 |\sin 4\varphi|;$$

$$2.40 \quad r = a + b \cos \varphi, \text{ де } \mathbf{1)} \ a > b > 0; \\ \mathbf{2)} \ a = b > 0; \ \mathbf{3)} \ b > a > 0.$$

## Практичне заняття 3

**Приклад 1.** Перевіримо, чи буде функціональним бінарне відношення  $\Gamma$ , якщо  $\Gamma \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$  та  $(x, y) \in \Gamma \Leftrightarrow |x| + |y| = 3$ .

Г

Це бінарне відношення не є функціональним: наприклад,  $(1, 2) \in \Gamma$  і  $(1, -2) \in \Gamma$ , тобто існують дві різні упорядковані пари  $(x, y) \in \Gamma$  з однаковими першими компонентами.


┘

**Приклад 2.** Знайдемо першу та другу проекції, а також перерізи бінарного відношення  $\Gamma = \{(x, y) \mid x + 1 \leq y \leq x + 4\}$ ,  $X = Y = [0, 7]$ .

Зобразимо це бінарне відношення. Тепер можемо знайти усі проекції та перерізи:  
 $\text{pr}_1 \Gamma = [0, 6]$ ;  $\text{pr}_2 \Gamma = [1, 7]$ ;

$$\Gamma_1(x) = \begin{cases} [x + 1, x + 4], & x \in [0, 3], \\ [x + 1, 7], & x \in (3, 6], \\ \emptyset, & x \in (6, 7]; \end{cases}$$

$$\Gamma_2(y) = \begin{cases} \emptyset, & y \in [0, 1), \\ [0, y - 1], & y \in [1, 4], \\ [y - 4, y - 1], & y \in (4, 7]. \end{cases}$$



З'ясуйте, чи будуть функціональними бінарні відношення  $\Gamma$ , якщо:

**3.1**  $\Gamma \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$  та  $(x, y) \in \Gamma \Leftrightarrow x = y^2$ ;

**3.2**  $\Gamma \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$  та  $(x, y) \in \Gamma \Leftrightarrow x^2 + y^2 = 25$ .

Для відображень  $f : X \rightarrow Y$  вкажіть області визначення та значень, якщо:

**3.3**  $f(x) = \cos x$ , **1)**  $X = Y = \mathbb{R}$ ;

**2)**  $X = \{0, \pi\}$ ,  $Y = \mathbb{R}$ ;

**3)**  $X = [0, \pi]$ ,  $Y = [0, 1]$ ;

**3.4**  $f(x) = [x]$ , **1)**  $X = Y = \mathbb{R}$ ;

**2)**  $X = \mathbb{N}$ ,  $Y = \{1, 2, \dots, n\}$ ;

**3)**  $X = \mathbb{R}$ ,  $Y = \mathbb{N}$ ;

**3.5**  $f(x) = \frac{1}{\sin \pi x}$ , **1)**  $X = Y = \mathbb{R}$ , **2)**  $X = [-1, 1]$ ,  $Y = \mathbb{R}$ , **3)**  $X = \mathbb{R}$ ,  $Y = \mathbb{Z}$ .

Знайдіть образи множин  $A$  та прообрази множин  $B$  для функції  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ :

**3.6**  $f(x) = 4 - x^2$ , **1)**  $A = \mathbb{R}$ , **2)**  $A = [-1, 1]$ , **3)**  $B = \mathbb{R}^-$ , **4)**  $B = [0, 2]$ .

Побудуйте першу та другу проекції вказаних бінарних відношень  $\Gamma \subset X \times Y$ :

**3.7**  $\Gamma = \{(x, y) \mid x \cdot y - \text{непарне число}\}$ ,  $X = Y = \mathbb{Z}$ ;

**3.8**  $\Gamma = \{(x, y) \mid x^2 - 2x + y^2 - 4y + 1 \leq 0\}$ ,  $X = Y = [0, 10]$ .

Побудуйте звуження функції Діріхле  $(\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R})$  на вказану множину  $A$ :

**3.9**  $D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}, \end{cases}$  **1)**  $A = \mathbb{Q}$ , **2)**  $A = [0, 1]$ , **3)**  $A = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ , **4)**  $A = \mathbb{N}$ .

У частково впорядкованому просторі  $(M, \leq)$ ,  $\forall a, b \in M : a \leq b \Leftrightarrow a \leq b$  знайдіть максимальний та мінімальний елементи, мажоранту, міноранту,  $\sup X$  та  $\inf X$  (якщо вони існують) для множини  $X$ , якщо:

**3.10**  $M = [-1, 1]$ , **1)**  $X = \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$ , **2)**  $X = (0, 1)$ , **3)**  $X = \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{3}\right) \cup \left\{\frac{1}{2}\right\}$ ;

**3.11**  $M = \mathbb{R}$ , **1)**  $X = \left\{\frac{3n}{n^3 + 3} \mid n \in \mathbb{N}\right\}$ , **2)**  $X = \left\{\frac{n^5}{n^6 + 1} \mid n \in \mathbb{Z}\right\}$ .

# Розділ 2. Числові послідовності

## Тема 2. Означення та властивості границі послідовності. Монотонні послідовності. Число $e$

Надалі розглядатимемо лише упорядкований простір  $(\overline{\mathbb{R}}, \leq)$ , де  $\overline{\mathbb{R}}$  — розширена числова вісь:  $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$  [1, с. 50].

**Числовою послідовністю**  $(x_n)$  називається відображення  $\mathbb{N} \xrightarrow{f} \mathbb{R}$ , де  $x_n = f(n)$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , називається  **$n$ -им членом** послідовності. Іноді послідовності також позначають таким чином:  $(x_n)_{n \in A}$  ( $A \subset \mathbb{Z}$ ), або просто  $x_1, x_2, \dots$ .

Нехай  $x_0$  — довільна точка на  $\mathbb{R}$ .  $\varepsilon$ -**околом** точки  $x_0$  називається інтервал з центром у точці  $x_0$  і радіусом  $\varepsilon$ :

$$S_\varepsilon(x_0) = \{x \mid |x - x_0| < \varepsilon\} = (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon) \subset \mathbb{R},$$


множини  $S_\varepsilon(-\infty) = (-\infty, -\varepsilon)$ ,  $S_\varepsilon(+\infty) = (\varepsilon, +\infty)$ ,  $S_\varepsilon(\infty) = (-\infty, -\varepsilon) \cup (\varepsilon, +\infty)$  називаються відповідно  $\varepsilon$ -**околами**  $-\infty$ ,  $+\infty$  та просто  $\infty$ .

Точка  $a \in \mathbb{R}$  називається **границею** послідовності  $(x_n)$ , якщо

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) : \forall n \geq N(\varepsilon) \Rightarrow |x_n - a| < \varepsilon$$

(метричне означення границі), при цьому будемо записувати  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ , або  $x_n \rightarrow a$  при  $n \rightarrow \infty$  (або просто  $x_n \rightarrow a$ ).

За означенням, всі члени послідовності з номерами  $n \geq N$  потрапляють у  $\varepsilon$ -окіл точки  $a$ , яким би малим цей окіл не був, а поза цим околом може залишатись лише скінченна кількість членів послідовності  $(x_n)$ , не більша за  $N - 1$ , тобто  $x_1, x_2, \dots, x_{N-1}$ .



Тому, якщо використати поняття околу в упорядкованому просторі, можна дати еквівалентне **топологічне означення границі**: точка  $a$  називається **границею** послідовності  $(x_n)$ , якщо  $\forall S_\varepsilon(a) \exists N(\varepsilon) : \forall n \geq N(\varepsilon) \Rightarrow x_n \in S_\varepsilon(a)$ .

Розглянемо випадок, коли послідовність має нескінченну границю. В такому разі послідовність називається **нескінченно великою**. Нехай  $\mathbb{N} \xrightarrow{f} \mathbb{R}$ :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty \stackrel{\text{def}}{\Leftrightarrow} \forall E > 0 \exists N(E) : \forall n \geq N(E) \Rightarrow x_n > E;$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty \stackrel{\text{def}}{\Leftrightarrow} \forall E > 0 \exists N(E) : \forall n \geq N(E) \Rightarrow x_n < -E;$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty \stackrel{\text{def}}{\Leftrightarrow} \forall E > 0 \exists N(E) : \forall n \geq N(E) \Rightarrow |x_n| > E.$$

Якщо  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ , то послідовність  $(x_n)$  називається **нескінченно малою**, при цьому будемо записувати  $x_n = o(1)$  ( **$o$ -мале**). Послідовність  $(x_n)$  нази-

вається **обмеженою**, якщо існує таке число  $M \geq 0$ , що  $|x_n| \leq M \quad \forall n \in \mathbb{N}$ , при цьому будемо записувати  $x_n = O(1)$  (**О-велике**). Символи  $o(1)$  та  $O(1)$  називаються **символами Ландау** [1, с. 49]. Для них справедливі такі дії:

$$\begin{aligned} O(1) + O(1) &= O(1); & O(1) \cdot O(1) &= O(1); \\ o(1) + o(1) &= o(1); & o(1) \cdot o(1) &= o(1); \\ O(1) + o(1) &= O(1); & o(1) \cdot O(1) &= o(1). \end{aligned}$$

Якщо послідовність має скінченну границю, вона називається **збіжною**, в протилежному випадку — **розбіжною**.

Для довільної послідовності  $(x_n)$  позначимо  $\sup_{n \in \mathbb{N}} x_n$  (або  $\sup x_n$ ) та  $\inf_{n \in \mathbb{N}} x_n$  ( $\inf x_n$ ) відповідно верхню та нижню межі множини значень послідовності  $\{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ .

Послідовність  $(x_n)$  називається **неспадною (зростаючою)**, якщо  $\forall n \in \mathbb{N}$ :  $x_n \leq x_{n+1}$  ( $x_n < x_{n+1}$ ); послідовність  $(x_n)$  називається **незростаючою (спадною)**, якщо  $\forall n \in \mathbb{N}$ :  $x_n \geq x_{n+1}$  ( $x_n > x_{n+1}$ ). Незростаючі та неспадні послідовності називаються **монотонними**, а зростаючі та спадні послідовності — **строго монотонними** [1, с. 31].

**Теорема (про арифметичні дії над збіжними послідовностями).**  
Якщо  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x \in \mathbb{R}$  та  $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y \in \mathbb{R}$ , то:

- 1)  $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n \pm y_n) = x \pm y$ ;
- 2)  $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n y_n) = xy$ ;
- 3)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \frac{x}{y}, y \neq 0 \wedge (y_n \neq 0 \quad \forall n \in \mathbb{N})$ ;

**Теорема (“про двох поліцаїв”).** Якщо для послідовностей  $(x_n), (y_n), (z_n)$   $\exists N^* : \forall n \geq N^* \quad y_n \leq x_n \leq z_n$  і  $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = a$ , то  $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ .

**Теорема (Вейерштрасса).** Кожна монотонна і обмежена послідовність має скінченну границю [1, с. 31].

**Число  $e$ .** Розглянемо послідовність  $x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n, n \in \mathbb{N}$ . За теоремою Вейерштрасса існує границя послідовності  $(x_n)$ , яку позначають літерою  $e$ :  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = e \approx 2,718281\dots$  [1, с. 56].

## Практичне заняття 4

**Приклад 1.** Доведемо, що  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n-3}{4n+5} = \frac{1}{2}$ .

Г

Для довільного  $\varepsilon > 0$  маємо:

$$\left| \frac{2n-3}{4n+5} - \frac{1}{2} \right| < \varepsilon \Leftrightarrow \frac{11}{8n+10} < \frac{11}{8n} < \varepsilon \Leftrightarrow n > \frac{11}{8\varepsilon}.$$

Отже, обираючи в якості  $N(\varepsilon) = \left\lceil \frac{11}{8\varepsilon} \right\rceil + 1$ , отримаємо вірне твердження за означенням. ┘

**Приклад 2.** Знайдемо границю послідовності  $x_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{(2k-1)^2(2k+1)^2}$ . ┘

Спростимо суму:

$$\begin{aligned} x_n &= \sum_{k=1}^n \frac{k}{(2k-1)^2(2k+1)^2} = \frac{1}{8} \sum_{k=1}^n \left( \frac{1}{(2k-1)^2} - \frac{1}{(2k+1)^2} \right) = \\ &= \frac{1}{8} \left( 1 - \frac{1}{9} + \frac{1}{9} - \frac{1}{25} + \frac{1}{25} - \frac{1}{49} + \dots + \frac{1}{(2n-1)^2} - \frac{1}{(2n+1)^2} \right) = \\ &= \frac{1}{8} \left( 1 - \frac{1}{(2n+1)^2} \right) \rightarrow \frac{1}{8}, \quad n \rightarrow \infty. \end{aligned}$$
┘

**Приклад 3.** Знайдемо  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \operatorname{arctg} n}{n^2 + 3}$ . ┘

Оскільки  $\operatorname{arctg} n = O(1)$  та  $\frac{n}{n^2 + 3} = o(1)$ , то згідно із операціями над символами Ландау:

$$\frac{n \operatorname{arctg} n}{n^2 + 3} = o(1) \cdot O(1) = o(1) \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty.$$
┘

**Приклад 4.** Знайдемо  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n + 3 \cdot 2^n + \ln n}{n^2 - 2^n - \ln n}$ . ┘

В границях послідовностей, які містять функції  $n^\alpha$ ,  $a^n$ ,  $\ln n$ ,  $n!$ , доцільно визначати *головний член*, тобто функцію, яка найшвидше зростає, і порівнювати з ним всі інші функції, використовуючи рівності 4.28–4.31. Таким чином, у рівностях 4.28–4.31 головними членами є, відповідно, функції  $a^n$ ,  $n!$ ,  $n$ ,  $n$ .

В даному прикладі головним членом чисельника дробу є  $2^n$  відповідно до рівності 4.28, знаменника — також  $2^n$ . Тому достатньо розглянути лише границю відношення між ними:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n + 3 \cdot 2^n + \ln n}{n^2 - 2^n - \ln n} = - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 \cdot 2^n}{2^n} = -3.$$
┘

Використовуючи означення границі послідовності, знайдіть границі:

**4.1**  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n}{n^3 + 2};$

**4.2**  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 - 1}{5n^2 + 1};$

**4.3**  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^3 + 2n^2 + 1}{n^4 + 2n - 2};$

**4.4**  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[3]{4n - 11}};$

**4.5**  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin n}{\sqrt{n}};$

**4.6**  $\lim_{n \rightarrow \infty} 3^{\sqrt[3]{n}};$

**4.7**  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1 + n^2)}{2^n};$

**4.8**  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n}.$

Доведіть за означенням, що число  $a$  не є границею послідовності  $(x_n)$ , якщо:

$$4.9 \quad x_n = \frac{n}{n+2}, \quad a = 0;$$

$$4.10 \quad x_n = \frac{n^2}{2n+3}, \quad a = 1.$$

З'ясуйте, чи є послідовності обмеженими, нескінченно великими. Вкажіть на множині  $\mathbb{R}$  найбільший та найменший члени послідовності, якщо такі існують:

$$4.11 \quad x_n = (2n+1) \sin n\pi;$$

$$4.12 \quad x_n = n \sin \frac{n\pi}{2}.$$

Знайдіть границі послідовностей  $(x_n)$ :

$$4.13 \quad x_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)};$$

$$4.14 \quad x_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{(k+1)(k+2)(k+3)};$$

$$4.15 \quad x_n = \sum_{k=1}^n \frac{k^3 + 6k^2 + 11k + 5}{(k+3)!};$$

$$4.16 \quad x_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{(k+1)!};$$

$$4.17 \quad x_n = \sum_{k=1}^n \frac{2k+1}{(2k+2)!};$$

$$4.18 \quad x_n = \sum_{k=1}^n \cos \frac{2k+1}{k^2+k} \sin \frac{1}{k^2+k}.$$

Знайдіть границі, користуючись теоремами про збіжні послідовності:

$$4.19 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=0}^m a_k n^k}{\sum_{k=0}^l b_k n^k} \quad (a_k \in \mathbb{R} \ (k = \overline{0, m}), \ b_k \in \mathbb{R} \ (k = \overline{0, l}), \ a_m \cdot b_l \neq 0);$$

$$4.20 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + n + 1} - \sqrt{n^2 - 1});$$

$$4.21 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt[3]{n^2 - n^3} + n);$$

$$4.22 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \sqrt{n + \sqrt{n + \sqrt{n}}} - \sqrt{n} \right);$$

$$4.23 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^2 + 1} + \sqrt{n}}{\sqrt[4]{n^3 + n} - \sqrt{n}};$$

$$4.24 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{2n} \sin n^3 - \frac{3n}{6n+1} \right);$$

$$4.25 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{\sqrt{n}} \operatorname{arctg} \frac{3^n}{2n} + \frac{\sin n - n}{1 - 4n} \right);$$

$$4.26 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{\operatorname{arctg} n}{\sqrt{n} - \sqrt[3]{n}} + \frac{\{n^3 - \frac{2}{3}n\}}{\ln n} + 1 \right);$$

$$4.27 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{n}{2n^2 - 1} \cdot \cos \frac{n+1}{2n-1} - \frac{n}{1-2n} \cdot \frac{n \cdot (-1)^n}{n^2 + 1} \right).$$

Доведіть рівності:

$$4.28 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^\alpha}{a^n} = 0 \quad (\alpha \in \mathbb{R}, \ a > 1);$$

$$4.29 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n!} = 0 \quad (a > 0);$$

$$4.30 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} na^n = 0 \quad (|a| < 1);$$

$$4.31 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = 0;$$

$$4.32 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1 \quad (a > 0);$$

$$4.33 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1.$$

Знайдіть границі:

$$4.34 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{n} - \ln(n^9 - n) + \ln(n \cdot e^n)}{\log_3(n^{17} + 2) + 3n + \cos n}; \quad 4.35 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{11} - e^n + n! - \ln(n+1)}{6^n - 36^n + n^7 - 1}.$$



# Тема 3. Фундаментальні послідовності. Підпослідовності. Критерій Коші. Теореми Коші та Штольца

Послідовність  $(x_n)$  називається **фундаментальною**, якщо  $\forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon): \forall (n \geq N(\varepsilon), p \in \mathbb{N}) \Rightarrow |x_{n+p} - x_n| < \varepsilon$ .

Нехай  $(x_n)$  — деяка послідовність,  $(n_k)$  — зростаюча послідовність натуральних чисел. Тоді послідовність  $(y_k) = (x_{n_k})$  називається **підпослідовністю** послідовності  $(x_n)$ .

Точка  $a$  називається **частковою границею послідовності**  $(x_n)$ , якщо існує підпослідовність  $(x_{n_k})$ , границя якої дорівнює  $a$ .

Нехай послідовність  $(x_n)$  з  $\mathbb{R}$  є обмеженою, тоді  $\forall n \in \mathbb{N}$  множина  $A_n = \{x_n, x_{n+1}, \dots\}$  — обмежена, та внаслідок повноти  $\mathbb{R}$  існує число  $\overline{x_n} = \sup_{k \geq n} A_n = \sup_{k \geq n} x_k$ . Згідно із властивістю верхньої межі  $(A_{n+1} \subset A_n)$ , послідовність  $(\overline{x_n})$  — монотонно незростаюча, і крім того є обмеженою. Тому за теоремою Вейерштрасса має границю, яка називається **верхньою границею послідовності**  $(x_n)$  і позначається  $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$ , тобто  $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{k \geq n} x_k$ . Анало-

гічно визначається **нижня границя послідовності**:  $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{k \geq n} x_k$ .

**Теорема (Больцано–Вейерштрасса).** *З кожної обмеженої послідовності  $(x_n)$  можна виділити збіжну підпослідовність [1, с. 35].*

**Критерій Коші.** *Послідовність  $(x_n)$  дійсних чисел збігається тоді і тільки тоді, коли вона є фундаментальною [1, с. 52].*

Наведемо теореми, які використовуються при знаходженні границь послідовностей [1, с. 53–55].

**Теорема (Коші).** *Якщо існує  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l \in \overline{\mathbb{R}}$ , то  $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n a_k}{n} = l$ .*

**Теорема (Штольца).** *Якщо послідовність  $(y_n)$  монотонно прямує до  $+\infty$  та  $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} = l \in \overline{\mathbb{R}}$ , то  $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = l$ .*

**Теорема.** *Якщо для послідовності додатних чисел  $(x_n) \exists \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{x_{n-1}} = l \in \overline{\mathbb{R}}$ , то  $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} = l$ .*

## Практичне заняття 5

**Приклад 1.** Дослідимо на збіжність послідовність  $x_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$ .

Г

Покажемо, що послідовність є фундаментальною, а тому збігається за критерієм Коші. Оберемо довільне  $\varepsilon > 0$ . Тоді:

$$\begin{aligned} |x_{n+p} - x_n| &= \sum_{k=n+1}^{n+p} \frac{1}{k^2} < \sum_{k=n+1}^{n+p} \frac{1}{k^2 - k} = \sum_{k=n+1}^{n+p} \frac{1}{k(k-1)} = \\ &= \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+p-1} - \frac{1}{n+p} = \\ &= \frac{1}{n} - \frac{1}{n+p} < \frac{1}{n} < \varepsilon \quad \forall p \in \mathbb{N}. \end{aligned}$$

Таким чином, обираючи в якості  $N(\varepsilon) = \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil + 1$ , фундаментальність послідовності доведена.

Методом математичної індукції можна довести нерівність 1.14 з практичного заняття 1. При  $n \rightarrow \infty$  отримаємо, що  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 2$ . ┐

**Приклад 2.** Дослідимо на збіжність послідовність  $x_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n$ .

Г

Покажемо спочатку, що послідовність  $(x_n)$  є монотонно спадною:

$$x_{n+1} - x_n = \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k} - \ln(n+1) - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} + \ln n = \frac{1}{n+1} - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < 0,$$

оскільки  $\forall n \in \mathbb{N}$  виконується нерівність:

$$\frac{1}{n+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}. \quad (2)$$

Крім того, згідно із нерівністю (2) послідовність  $(x_n)$  є обмеженою знизу:

$$\begin{aligned} x_n &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n > \sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) - \ln n = \ln \prod_{k=1}^n \frac{k+1}{k} - \ln n = \\ &= \ln \frac{2}{1} \cdot \frac{3}{2} \cdot \dots \cdot \frac{n+1}{n} \cdot \frac{1}{n} = \ln \frac{n+1}{n} > 0. \end{aligned}$$

Отже, за теоремою Вейєрштрасса послідовність  $(x_n)$  є збіжною, її границя називається *сталю Ейлера*. Будемо позначати  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \gamma$ . Також відповідно до отриманого результату справедливою є така рівність:  $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \ln n + \gamma + o(1)$ . ┐

**Приклад 3.** Знайдемо границю послідовності  $x_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}}$ .

Г

Скористаємося теоремою Штольца, обираючи  $a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}}$ ,  $b_n = \sqrt{n}$ . Одержимо:

$$\frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = \frac{\frac{1}{\sqrt{n}}}{\sqrt{n} - \sqrt{n-1}} = \frac{\frac{1}{\sqrt{n}}(\sqrt{n} + \sqrt{n-1})}{(\sqrt{n})^2 - (\sqrt{n-1})^2} = \frac{\sqrt{n} + \sqrt{n-1}}{\sqrt{n}} \rightarrow 2, n \rightarrow \infty.$$

Отже,  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 2$ . ┘

Користуючись критерієм Коші дослідіть на збіжність послідовності:

$$5.1 \quad x_n = \sum_{k=1}^n \frac{\cos k}{2^k};$$

$$5.2 \quad x_n = \sum_{k=1}^n \frac{\sin(k!)}{k(k+1)};$$

$$5.3 \quad x_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k};$$

$$5.4 \quad x_n = \sum_{k=2}^n \frac{1}{\ln k};$$

5.5  $(x_n)$  — послідовність обмеженої варіації, тобто  $\exists c \in \mathbb{R} : \forall n \in \mathbb{N}$

$$\sum_{k=1}^n |x_{k+1} - x_k| < c.$$

Доведіть твердження:

5.6 послідовність  $x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , — монотонно зростаюча і обмежена;

5.7 послідовність  $y_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , — монотонно спадна, обмежена і  $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = e$ ;

5.8  $\forall n \in \mathbb{N} : \frac{1}{n+1} < \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}$ .

Доведіть збіжність на  $\mathbb{R}$  таких послідовностей:

$$5.9 \quad x_n = \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{2^k}\right);$$

$$5.10 \quad x_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} - 2\sqrt{n};$$

$$5.11 \quad x_n = \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!};$$

$$5.12 \quad x_n = \left(1 + \frac{m}{n}\right)^n, \quad m \in \mathbb{R}.$$

Знайдіть границю послідовності  $(x_n)$ , якщо:

$$5.13 \quad x_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2n+2k-1};$$

$$5.14 \quad x_n = \frac{1}{\ln n} \sum_{k=2}^n \frac{1}{k};$$

$$5.15 \quad x_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{2^n} \frac{1}{k};$$

$$5.16 \quad x_n = \frac{1}{n^3} \sum_{k=1}^n k^2;$$

$$5.17 \quad x_n = \frac{1}{n\sqrt{n}} \sum_{k=1}^n \sqrt{k};$$

$$5.18 \quad x_n = \frac{n}{a^n} \sum_{k=1}^n \frac{a^{k-1}}{k}, \quad a > 1;$$

$$5.19 \quad x_n = \frac{\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}}}{\sqrt{n} + (-1)^n};$$

$$5.20 \quad x_n = \frac{\sum_{k=1}^n \sqrt{k}}{n\sqrt{n} + (-1)^n n}.$$

## Практичне заняття 6

**Приклад 1.** Знайдемо  $\inf_{n \in \mathbb{N}} x_n$ ,  $\sup_{n \in \mathbb{N}} x_n$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$  та  $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$  на  $\mathbb{R}$  для послідовності  $x_n = (-1)^n \frac{n+1}{n+2} + \sin \frac{n\pi}{2}$ .

Г

Виділимо 4 підпослідовності із  $x_n$ , враховуючи, що період функції  $\sin \frac{n\pi}{2}$  дорівнює 4:  $x_{4k-3} = -\frac{4k-2}{4k-1} + 1$ ,  $x_{4k-2} = \frac{4k-1}{4k}$ ,  $x_{4k-1} = -\frac{4k}{4k+1} - 1$  та  $x_{4k} = \frac{4k+1}{4k+2}$  ( $k \in \mathbb{N}$ ). Знайдемо границі кожної з підпослідовностей, а також інфімум та супремум їх значень:

	$\lim_{m \rightarrow \infty} x_m$	$\inf_{m \in \mathbb{N}} x_m$	$\sup_{m \in \mathbb{N}} x_m$
$m = 4k$	1	$4/5$	1
$m = 4k - 1$	-2	-2	$-9/5$
$m = 4k - 2$	1	$3/4$	1
$m = 4k - 3$	0	0	$1/3$

Таким чином,  $\inf_{n \in \mathbb{N}} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -2$ ,  $\sup_{n \in \mathbb{N}} x_n = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$ .

┘

**Приклад 2.** Нехай  $x_1 = \sqrt{3}$ ,  $x_{n+1} = \sqrt{3 + 2x_n}$ ,  $n \in \mathbb{N}$ . Дослідимо послідовність  $(x_n)$  на збіжність та знайдемо її границю.

Г

Припустимо, що  $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \alpha$ . Тоді можна перейти до границі при  $n \rightarrow \infty$  в рекурентному співвідношенні  $x_{n+1} = \sqrt{3 + 2x_n}$ :

$$\alpha = \sqrt{3 + 2\alpha} \Leftrightarrow \alpha^2 - 2\alpha - 3 = 0.$$

Корені цього рівняння — числа  $\alpha_1 = 3$ ,  $\alpha_2 = -1$ . Таким чином, якщо послідовність  $(x_n)$  — збіжна, то вона збігається або до  $\alpha_1$ , або до  $\alpha_2$ .

Доведемо обмеженість зверху послідовності  $(x_n)$  методом математичної індукції. При  $n = 1$ :  $x_1 = \sqrt{3} \leq 3$ . Припустимо, що для деякого  $n \in \mathbb{N}$ :  $x_n \leq 3$ . Тоді  $x_{n+1} = \sqrt{3 + 2x_n} \leq \sqrt{3 + 2 \cdot 3} = 3$ , тобто обмеженість зверху доведена. Тому послідовність  $(x_n)$  є обмеженою (обмеженість знизу очевидна).

Дослідимо на монотонність:  $x_{n+1}^2 - x_n^2 = 3 + 2x_n - x_n^2 = -(x_n - 3)(x_n + 1) \geq 0$  при  $x_n \in [-1, 3]$ . Тому  $(x_n)$  — неспадна послідовність, а за теоремою Вейєрштрасса є збіжною. Отже,  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 3$ .

┘


**Приклад 3.** Побудуємо графік функції  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ :

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1+x^n}, \quad x \geq 0.$$

┌

Знайдемо границю послідовності в залежності від  $x$ :

$$\begin{aligned} f(x) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1+x^n} = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x^n \left( \frac{1}{x^n} + 1 \right)} = \begin{cases} x, & x > 1; \\ 1, & 0 \leq x \leq 1. \end{cases} \end{aligned}$$



Для послідовності  $(x_n)$  знайдіть  $\inf_{n \in \mathbb{N}} x_n$ ,  $\sup_{n \in \mathbb{N}} x_n$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$  та  $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$  на  $\overline{\mathbb{R}}$ , якщо:

$$6.1 \quad x_n = 1 + \frac{n}{n+1} \sin \frac{n\pi}{2};$$

$$6.2 \quad x_n = \frac{(-1)^n}{n} + \frac{1 + (-1)^n}{2};$$

$$6.3 \quad x_n = 1 - n \cos \frac{n\pi}{2};$$

$$6.4 \quad x_n = \frac{n-1}{n+1} \cos \frac{2n\pi}{3}.$$

Дослідіть на збіжність послідовності, що задані рекурентно:

$$6.5 \quad x_1 = 5, x_{n+1} = \sqrt{5+x_n}, \quad n \geq 1; \quad 6.6 \quad x_1 = 0, x_{n+1} = \frac{1}{5} + 2x_n^2, \quad n \geq 1;$$

$$6.7 \quad x_{n+1} = x_n^2 - 2x_n + 2, \quad n \geq 1, x_1 \in (1, 2);$$

$$6.8 \quad x_1 = \frac{3}{2}, x_{n+1}^2 = 3x_n - 2, \quad n \geq 2, x_n \geq 0.$$

Побудуйте графіки функцій  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , де:

$$6.9 \quad f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{2+x^n}, \quad x \geq 0;$$

$$6.10 \quad f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^x - n^{-x}}{n^x + n^{-x}};$$

$$6.11 \quad f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n + x^{-n}}{x^n - x^{-n}}, \quad x \neq 0;$$

$$6.12 \quad f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(x^n + 3^n)}{n}, \quad x \geq 0;$$

$$6.13 \quad f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1+x^n + \left(\frac{x^2}{2}\right)^n}, \quad x \geq 0.$$

# Розділ 3. Границя та неперервність функції

## Тема 4. Границя функції в точці. Порівняння функцій в околі граничної точки. Асимптотичні формули

Нехай  $X \subset \mathbb{R}$ , точка  $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$  називається **граничною точкою** множини  $X$ , якщо  $\forall \varepsilon > 0 : S_\varepsilon(x_0) \cap (X \setminus \{x_0\}) \neq \emptyset$ . Точка множини  $X$ , яка не є граничною, називається **ізолюваною** ( $\exists \varepsilon > 0 : S_\varepsilon(x_0) \cap (X \setminus \{x_0\}) = \emptyset$ ) [1, с. 386].

Нехай  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  і  $x_0$  — гранична точка множини  $D_f$ . Число  $\alpha \in \overline{\mathbb{R}}$  називається **частковою границею функції  $f$  в точці  $x_0$** , якщо  $\exists (x_n) \subset D_f : (x_n \rightarrow x_0) \wedge (\forall n \in \mathbb{N} x_n \neq x_0) \wedge (f(x_n) \rightarrow \alpha)$  при  $n \rightarrow \infty$ . Множину всіх часткових границь функції  $f$  у точці  $x_0$  позначимо  $E_f(x_0)$ .

Аналогічно послідовностям, визначимо **верхню** та **нижню границі функції  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  в точці  $x_0$** , граничній для  $D_f$ , за формулами:

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x) \stackrel{\text{def}}{=} \sup E_f(x_0); \quad \underline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x) \stackrel{\text{def}}{=} \inf E_f(x_0).$$

Нехай  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  і  $x_0$  — гранична точка множини  $D_f$ . Якщо множина  $E_f(x_0)$  складається з одного числа  $\alpha \in \overline{\mathbb{R}}$ , то воно називається **границею функції  $f$  в точці  $x_0$**  і позначається  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$  (**границя за Гейне**).

Нехай  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $x_0$  — гранична точка  $D_f$ . Число  $\alpha$  називається **границею функції  $f$  в точці  $x_0$**  (при  $x \rightarrow x_0$ ), якщо  $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in D_f : 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - \alpha| < \varepsilon$  (**границя за Коші**).

Нехай  $f : \mathbb{R} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  і  $x_0$  — гранична точка множини  $D_f \cap \{x \in \mathbb{R} | x < x_0\}$  ( $D_f \cap \{x \in \mathbb{R} | x > x_0\}$ ). Покладемо

$$f(x_0 - 0) \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x < x_0}} f(x) \quad \left( f(x_0 + 0) \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x > x_0}} f(x) \right),$$

якщо ця границя існує. Числа  $f(x_0 - 0)$ ,  $f(x_0 + 0)$  називаються відповідно **лівою** та **правою границями функції  $f$  в точці  $x_0$** . Якщо  $f(x_0 - 0) = \pm\infty$  або  $f(x_0 + 0) = \pm\infty$ , то відповідні границі називаються **нескінченними**.

**Критерій існування границі функції в точці.** Функція  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  має границю в точці  $x_0$ , граничній для множин  $D_f \cap \{x \in \mathbb{R} | x < x_0\}$  та  $D_f \cap \{x \in \mathbb{R} | x > x_0\}$  тоді і тільки тоді, коли одночасно існують і рівні між собою односторонні границі  $f(x_0 - 0)$  і  $f(x_0 + 0)$ .

Зауважимо, що у випадках  $x_0 = \pm\infty$  мова йде лише про односторонні границі, які будемо позначати відповідно  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ .

Для вивчення поведінки функції в околі деякої точки та порівняння різних функцій в околі точки аналогічно послідовностям використовуються **символи Ландау**  $O$  ( **$O$ -велике**) і  $o$  ( **$o$ -мале**).

Вираз  $f = O(1)$  при  $x \rightarrow x_0$  означає, що функція  $f$  — *обмежена в точці*  $x_0$ . Якщо  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$ , то функція  $f$  — *нескінченно мала в точці*  $x_0$ , позначення:  $f = o(1)$ .

Нехай функції  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $x_0$  — гранична точка множини  $X = D_f = D_g$ . Тоді:

- 1) якщо існує  $M > 0$  і окіл  $S_\delta(x_0)$  точки  $x_0$ , такі що  $\forall x \in S_\delta(x_0) \setminus \{x_0\}$  виконується нерівність:  $|g(x)| \leq M|f(x)|$ , то записуємо  $g = O(f)$  (*O-велике*);
- 2) якщо одночасно  $g = O(f) \wedge f = O(g)$ , то кажуть, що  $f$  і  $g$  — **функції одного порядку**;
- 3) якщо  $\forall \varepsilon > 0$  існує окіл  $S_\delta(x_0)$  такий, що  $\forall x \in S_\delta(x_0) \setminus \{x_0\}$  виконується нерівність:  $|g(x)| \leq \varepsilon|f(x)|$ , то записуємо  $g = o(f)$  (*o-мале*);
- 4) якщо  $f - g = o(g)$ , то функції  $f$  і  $g$  називаються **еквівалентними**, при цьому записують  $f \sim g$ .

**Умова функцій одного порядку та критерій еквівалентності функцій.** Функції  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  в точці  $x_0$  — граничній для множини  $D_f = D_g$ , тоді:

- 1) якщо  $\exists \varepsilon > 0 : \forall x \in S_\varepsilon(x_0) \setminus \{x_0\} \ g(x) \neq 0$  і  $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$  то функції  $f$  і  $g$  одного порядку в околі точки  $x_0$ ;
- 2) якщо  $\exists \varepsilon > 0 : \forall x \in S_\varepsilon(x_0) \setminus \{x_0\} \ g(x) > 0$ , то  $f \sim g$  тоді і тільки тоді, коли  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$ .

### Властивості символів Ландау:

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| 1. $O(f) = O(O(f))$ ;   | 2. $O(f) \cdot O(g) = O(fg)$ ; |
| 3. $\forall \lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\} : O(\lambda f) = O(f)$ ; | 4. $O(f) + O(f) = O(f)$ ;      |
| 5. $o(o(f)) = o(f)$ ;   | 6. $o(f) \cdot o(g) = o(fg)$ ; |
| 7. $o(f) + o(f) = o(f)$ ;   | 8. $O(f) + o(f) = O(f)$ ;      |
| 9. $o(O(f)) = o(f)$ .   |                                |

### Властивості o-малих функцій в околі точки 0:

- |   |   |
|---|---|
| 1. $x^m = o(x^n)$ , $m > n$ , $m, n \in \mathbb{R}^+$ ; | 2. $o(cx^n) = c \cdot o(x^n) = o(x^n)$ , $c \neq 0$ ; |
| 3. $o(x^n) + o(x^m) = o(x^n)$ , $m > n$ ;               | 4. $x^n \cdot o(x^m) = o(x^{n+m})$ ;                  |
| 5. $o(x^n) \cdot o(x^m) = o(x^{n+m})$ ;                 | 6. $O(x^n) \cdot o(x^m) = o(x^{n+m})$ .               |

Функція  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  називається *обмеженою* на множині  $X \subset D_f$ , якщо множина  $f(X)$  — обмежена.

Якщо  $f(x) = ag(x) + o(g(x))$  ( $a \neq 0$ ) в деякому околі  $S_\varepsilon(x_0) \setminus \{x_0\}$ , то  $f \sim ag$ , при цьому функція  $x \mapsto ag(x)$ ,  $x \in S_\varepsilon(x_0) \setminus \{x_0\}$  називається **головною частиною функції  $f$  при  $x \rightarrow x_0$** .

При знаходженні границь можливі такі типи невизначеностей:

1.  $\frac{0_1}{0_2}; \quad 2. \frac{\infty_1}{\infty_2} = \frac{\frac{1}{\infty_2}}{\frac{1}{\infty_1}} \rightarrow \frac{0_2}{0_1}; \quad 3. 0_1 \cdot \infty = \frac{0_1}{\frac{1}{\infty}} = \frac{0_1}{0_2};$
4.  $\infty_1 - \infty_2 = \infty_1 \left(1 - \frac{\infty_2}{\infty_1}\right) = \begin{cases} \infty_1 \cdot 0, & \text{якщо } \left(1 - \frac{\infty_2}{\infty_1}\right) \rightarrow 0, \\ \text{немає невизначеності,} & \text{якщо } \left(1 - \frac{\infty_2}{\infty_1}\right) \not\rightarrow 0; \end{cases}$
5.  $1^\infty = e^{\infty \ln 1} \rightarrow e^{\infty \cdot 0}; \quad 6. \infty^0 = e^{0 \ln \infty} \rightarrow e^{0 \cdot \infty}; \quad 7. 0_1^{0_2} = e^{0_1 \ln 0_2} \rightarrow e^{0_1 \cdot \infty}.$

Зокрема, невизначенність типу  $[1^\infty]$  розкривається таким чином:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (u(x))^{v(x)} = e^{\lim_{x \rightarrow x_0} v(x)(u(x)-1)}, \text{ якщо } u(x) \rightarrow 1 \wedge v(x) \rightarrow \infty, x \rightarrow x_0.$$

Використаємо відомі границі  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$  для одержання так званих асимптотичних формул:

1.  $\frac{\sin x}{x} = 1 + o(1), x \rightarrow 0 \Rightarrow \sin x = x + o(x) = o(1);$
2.  $\cos x = 1 - 2 \sin^2 \frac{x}{2} = 1 - 2 \left(\frac{x}{2} + o\left(\frac{x}{2}\right)\right)^2 = 1 - 2 \cdot \frac{x^2}{4} + o(x^2) =$   
 $= 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2) \Rightarrow \cos x = 1 + o(1) = 1 + o(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2);$
3.  $\frac{\ln(1+x)}{x} = \ln(1+x)^{\frac{1}{x}} \rightarrow \ln e = 1, x \rightarrow 0 \Rightarrow \ln(1+x) = x + o(x) = o(1);$
4.  $\frac{e^x - 1}{x} = \left| \frac{e^x - 1 = t}{x = \ln(1+t)} \right| = \frac{t}{\ln(1+t)} \rightarrow 1, x \rightarrow 0 \Rightarrow e^x = 1 + x + o(x) = 1 + o(1);$
5.  $a^x = e^{x \ln a} = 1 + o(1) = 1 + x \ln a + o(x), x \rightarrow 0;$
6.  $\frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \frac{e^{\alpha \ln(1+x)} - 1}{x} = \frac{e^{\alpha \ln(1+x)}}{\alpha \ln(1+x)} \alpha \cdot \frac{\ln(1+x)}{x} \rightarrow \alpha, x \rightarrow 0 \Rightarrow$   
 $(1+x)^\alpha = 1 + o(1) = 1 + \alpha x + o(x), x \rightarrow 0.$

## Практичне заняття 7

**Приклад 1.** Користуючись означенням Коші, для функції  $f(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  запишемо таке твердження:  $\lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = b, \{a, b\} \subset \mathbb{R}.$

┌

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon, a) > 0 : \forall x \in (a - \delta, a) \Rightarrow |f(x) - b| < \varepsilon.$$

┐

**Приклад 2.** Користуючись означенням Коші, для функції  $x \mapsto y(x)$  запишемо таке твердження:  $y \rightarrow b - 0$  при  $x \rightarrow a, \{a, b\} \subset \mathbb{R}.$

┌

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon, a) > 0 : \forall x : 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow b - \varepsilon < f(x) < b.$$

┐

**Приклад 3.** Користуючись означенням Коші границі функції в точці, доведемо рівність:  $\lim_{x \rightarrow 2} x^3 = 8.$



Г

Нехай  $\varepsilon > 0$  — довільне. Для зручності розглянемо  $1 < x < 3$ , тобто  $|x - 2| < 1$ .  
Тоді

$$|x^3 - 8| = |x - 2| \cdot |x^2 + 2x + 4| < 19 \cdot |x - 2| < \varepsilon, \text{ якщо } |x - 2| < \frac{\varepsilon}{19}.$$

Отже, досить покласти  $\delta = \min \left\{ \frac{\varepsilon}{19}, 1 \right\} > 0$  і за означенням рівність є справедливою. ┐

**Приклад 4.** Нехай функція  $f$  визначена в деякому околі  $S_\varepsilon(x_0)$  точки  $x_0 \in \mathbb{R}$ .  
Доведемо, що  $O(f) + O(f) = O(f)$  при  $x \rightarrow x_0$ .  
Г

Позначимо  $u = O(f)$ . Це означає, що  $\exists M_1 > 0$  та окіл  $S_{\varepsilon_1}(x_0)$ :

$$\forall x \in S_{\varepsilon_1}(x_0) \setminus \{x_0\} \Rightarrow |u| \leq M_1 |f|.$$

Також для  $v = O(f)$  існує  $M_2 > 0$  та окіл  $S_{\varepsilon_2}(x_0)$ :

$$\forall x \in S_{\varepsilon_2}(x_0) \setminus \{x_0\} \Rightarrow |v| \leq M_2 |f|.$$

Тоді для  $\forall x \in S_\varepsilon(x_0) \setminus \{x_0\}$ ,  $\varepsilon = \min\{\varepsilon_1, \varepsilon_2\} \Rightarrow$

$$|u + v| \leq |u| + |v| \leq M_1 |f| + M_2 |f| = (M_1 + M_2) |f|,$$

тобто  $u + v = O(f)$ . ┐

**Приклад 5.** Доведемо, що  $x^m = o(x^n)$ ,  $m > n$  при  $x \rightarrow 0$  (в околі точки 0).  
Г

За означенням,  $\forall \varepsilon > 0 \exists S_\delta(0)$ :

$$\forall x \in S_\delta(0) \setminus \{0\} \Rightarrow |x^m| < \varepsilon |x^n| \Leftrightarrow |x^{m-n}| < \varepsilon \Leftrightarrow |x| < \varepsilon^{\frac{1}{m-n}}.$$

Отже, обираючи  $\delta = \varepsilon^{\frac{1}{m-n}}$ , маємо, що  $x^m = o(x^n)$ ,  $m > n$ . З іншого боку, справедливою є рівність  $x^{m-n} = o(1)$ ,  $x \rightarrow 0$ , тобто  $\lim_{x \rightarrow 0} x^{m-n} = 0$ ,  $m > n$ .

Аналогічно для довільних функцій  $f$  та  $g$ , визначених в околі точки  $x_0$ , умова  $f = o(g)$ ,  $x \rightarrow x_0 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$ . ┐

**Приклад 6.** Зробимо спрощення виразу  $(x - x^2 + x^3 + o(x^4))(1 - 2x + 2x^3 + o(x^4))$  при  $x \rightarrow 0$  (в околі точки 0).  
Г

$$\begin{aligned} (x - x^2 + x^3 + o(x^4)) (1 - 2x + 2x^3 + o(x^4)) &= x - 3x^2 - x^3 - 2x^5 + 2x^6 + o(x^4) - \\ &- x \cdot o(x^4) - x^2 \cdot o(x^4) + 3x^3 \cdot o(x^4) + o(x^4) \cdot o(x^4) = \\ &= x - 3x^2 - x^3 + o(x^4) = x - 3x^2 + o(x^2) = x + o(x). \end{aligned} \quad \text{┐}$$

**Приклад 7.** Знайдемо границю виразу  $\frac{x^3 - 2x^2 + o(x^3)}{x^4 + 4x^2 + o(x^3)}$  при  $x \rightarrow 0$ .  
Г

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 - 2x^2 + o(x^3)}{x^4 + 4x^2 + o(x^3)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2x^2 + o(x^2)}{4x^2 + o(x^2)} = -\frac{1}{2}. \quad \text{┐}$$

Користуючись означенням Коші, для функції  $f(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $\{a, b\} \subset \mathbb{R}$ , запишіть такі твердження:

**7.1**  $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = b$ ;

**7.2**  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$ ;

$$7.3 \quad \lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = +\infty;$$

$$7.4 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b;$$

$$7.5 \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty;$$

$$7.6 \quad \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty.$$

Користуючись означенням Коші, для функції  $x \mapsto y(x)$ ,  $\{a, b\} \subset \mathbb{R}$ , запишіть такі твердження:

$$7.7 \quad y \rightarrow b - 0 \text{ при } x \rightarrow a + 0;$$

$$7.8 \quad y \rightarrow b - 0 \text{ при } x \rightarrow -\infty;$$

$$7.9 \quad y \rightarrow b + 0 \text{ при } x \rightarrow a - 0;$$

$$7.10 \quad y \rightarrow b + 0 \text{ при } x \rightarrow \infty.$$

Користуючись означенням Коші границі функції в точці, доведіть рівності:

$$7.11 \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + 1}{x^2 - 1} = \frac{5}{3};$$

$$7.12 \quad \lim_{x \rightarrow 3} \frac{2(x-1)}{x+1} = 1;$$

$$7.13 \quad \lim_{x \rightarrow \pi} \sin x = 0;$$

$$7.14 \quad \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \operatorname{tg} x = 1;$$

$$7.15 \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 - 5}{x^2 + 5} = 2;$$

$$7.16 \quad \lim_{x \rightarrow 0,001} \operatorname{sgn} x = 1.$$

Нехай функції  $f$  та  $g$  визначені в деякому околі  $S_\varepsilon(x_0)$  точки  $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ . Доведіть, що при  $x \rightarrow x_0$  справедливі такі твердження:

$$7.17 \quad o(f) + o(f) = o(f);$$

$$7.18 \quad o(f) + O(f) = O(f);$$

$$7.19 \quad o(f) \cdot o(f) = o(f^2);$$

$$7.20 \quad O(f) \cdot O(f) = O(f^2);$$

$$7.21 \quad o(f) \cdot O(f) = o(f^2);$$

$$7.22 \quad O(o(f)) = o(f);$$

$$7.23 \quad o(O(f)) = o(f);$$

$$7.24 \quad o(f + o(f)) = o(f);$$

$$7.25 \quad |o(f^n)| = (o(f))^n, \quad n > 0;$$

$$7.26 \quad O(f) \cdot O(g) = O(fg);$$

$$7.27 \quad o(f) \cdot o(g) = o(fg);$$

$$7.28 \quad O(f) \cdot o(g) = o(f) \cdot O(g) = o(fg).$$

Доведіть справедливість таких рівностей при  $x \rightarrow 0$  (в околі точки 0):

$$7.29 \quad o(x^m) = o(x^n), \quad m > n;$$

$$7.30 \quad o(o(x^n)) = o(x^n);$$

$$7.31 \quad o(x^m) + o(x^n) = o(x^n), \quad m > n;$$

$$7.32 \quad c \cdot o(x^n) = o(x^n), \quad c \neq 0;$$

$$7.33 \quad o(cx^n) = o(x^n), \quad c \neq 0;$$

$$7.34 \quad O(x^m) = O(x^n), \quad m > n;$$

$$7.35 \quad O(x^m) + O(x^n) = O(x^n), \quad m > n;$$

$$7.36 \quad x^m \cdot o(x^n) = o(x^{m+n});$$

$$7.37 \quad O(x^m) \cdot o(x^n) = o(x^{m+n});$$

$$7.38 \quad o(x^m) \cdot o(x^n) = o(x^{m+n}).$$

Зробіть спрощення виразів при  $x \rightarrow 0$  до поліному степеня  $\leq k$  із додаванням  $o$ -малого відповідного степеня  $x$ :

$$7.39 \quad (x + x^2 + o(x^3)) (2 + 3x^2 + 4x^4 + o(x^5)), \quad k = 3;$$

$$7.40 \quad (1 - x^2 + o(x^4)) (2 + x^2 + o(x^4)) - (1 - x^3) (3 + x^2 + o(x^5)), \quad k = 4;$$

$$7.41 \quad (5x + 4x^2 - 3x^3 + o(x^3)) (1 + x^2 + 2x^3 + o(x^5)), \quad k = 3;$$

$$7.42 \quad (x + x^2 + x^3 + o(x^3)) (1 - x + x^2 - x^3 + o(x^4)) + 3x^2 - 5x, \quad k = 2;$$

$$7.43 \quad (x + 2x^2 + 3x^3 + o(x^5)) (1 - x - 2x^2 + o(x^4)) - 2x + 4x^3 + o(x^4), \quad k = 4.$$

Знайдіть, де це можливо, границі таких виразів при  $x \rightarrow 0$ :

$$7.44 \quad \frac{x^2 - x^3 + o(x^3)}{4x^4 + 2x^2 + o(x^2)};$$

$$7.45 \quad \frac{5x - x^2 + o(x^3)}{3x^3 - 2x + o(x^2)};$$

$$7.46 \quad \frac{-x^3 + o(x^3)}{x^2 + o(x^2)};$$

$$7.48 \quad \frac{o(x^2)}{o(x)};$$

$$7.50 \quad \frac{3x^4 - 5x^3 + o(x^4)}{x^3 + 4x^4 + o(x^3)};$$

$$7.47 \quad \frac{x^3 + o(x)}{x^4 + o(x^2)};$$

$$7.49 \quad \frac{2x^3 + o(x)}{x^2 + o(x)};$$

$$7.51 \quad \frac{x^2 - x^3 + x^4 + o(x^4)}{x^3 - x^2 + 2x + o(x^3)}.$$

## Практичне заняття 8

**Приклад 1.** Знайдемо границю  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^4 - (1+4x)}{2x^2 + x^4}$ .

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^4 - (1+4x)}{2x^2 + x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+4x+6x^2+o(x^2)-1-4x}{2x^2+o(x^2)} = 3.$$

**Приклад 2.** Знайдемо границю  $\lim_{x \rightarrow x_0} (u(x))^{v(x)}$ , де  $x_0 = 2$ ,  $u(x) = \frac{-2+x+2x^2}{2-x+x^2}$ ,

$$v(x) = \frac{1-x}{1+x^2}.$$

Оскільки  $\lim_{x \rightarrow 2} u(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-2+x+2x^2}{2-x+x^2} = 2$  та  $\lim_{x \rightarrow 2} v(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1-x}{1+x^2} = -\frac{1}{5}$ , то

$$\lim_{x \rightarrow 2} (u(x))^{v(x)} = \left( \lim_{x \rightarrow 2} u(x) \right)^{\lim_{x \rightarrow 2} v(x)} = 2^{-\frac{1}{5}}.$$

**Приклад 3.** Знайдемо границю  $\lim_{x \rightarrow \infty} (u(x))^{v(x)}$ , де  $u(x) = \frac{11+x}{6+x}$ ,  $v(x) = \frac{1+x}{1+\sqrt{x}}$ .

Оскільки  $\lim_{x \rightarrow \infty} u(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{11+x}{6+x} = 1$  та  $\lim_{x \rightarrow \infty} v(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1+x}{1+\sqrt{x}} = \infty$ , то побудуємо невизначеності  $[1^\infty]$  таким чином:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (u(x))^{v(x)} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} v(x)(u(x)-1)} = \exp \left( \lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{1+x}{1+\sqrt{x}} \cdot \frac{5}{6+x} \right) \right) = e^0 = 1.$$

**Приклад 4.** Для функції  $f(x) = \left( x + 3^{\frac{1}{3-x}} \right)^{-1}$  знайдемо односторонні границі при  $x \rightarrow x_0 + 0$  та  $x \rightarrow x_0 - 0$  для випадків: **1)**  $x_0 = 0$ , **2)**  $x_0 = 3$ .

У випадку  $x_0 = 0$ :  $\lim_{x \rightarrow 0+0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0-0} f(x) = \frac{1}{\sqrt{3}}$ . Якщо ж  $x_0 = 3$ , то

$$\lim_{x \rightarrow 3+0} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow 3 \\ x > 3}} \frac{1}{x + 3^{\frac{1}{3-x}}} = \frac{1}{3 + 3^{\frac{1}{0^-}}} = \frac{1}{3 + 3^{-\infty}} = \frac{1}{3};$$

$$\lim_{x \rightarrow 3-0} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow 3 \\ x < 3}} \frac{1}{x + 3^{\frac{1}{3-x}}} = \frac{1}{3 + 3^{\frac{1}{0^+}}} = \frac{1}{3 + 3^{+\infty}} = \frac{1}{+\infty} = 0.$$

**Приклад 5.** Порівняємо функції  $f(x) = \cos x$  та  $g(x) = \frac{\operatorname{ch} x - 1}{x^2}$  при  $x \rightarrow 0$ .

Оскільки  $\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1$ ,  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{ch} x - 1}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \frac{x^2}{2} + o(x^2) - 1}{x^2} = \frac{1}{2}$ , то  
 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 2$  та  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{f(x)} = \frac{1}{2}$ , тобто  $f = O(g) \wedge g = O(f)$  при  $x \rightarrow 0$ .

**Приклад 6.** Визначимо порядок відносно шкали  $x^n$  функції  $f(x) = x \sin \sqrt{x}$  при  $x \rightarrow 0$ .

Оскільки при  $x \rightarrow 0$ :  $f(x) = x \cdot (\sqrt{x} + o(\sqrt{x})) = x^{3/2} + o(x^{3/2})$ , то

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^m} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^{3/2} + o(x^{3/2})}{x^m} = 1 \Leftrightarrow m = \frac{3}{2}.$$

Знайдіть границі:

$$8.1 \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 2x^2 - 4x + 8}{x^4 - 8x^2 + 16};$$

$$8.3 \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^m - 1}{x^k - 1}, \quad m, k \in \mathbb{N};$$

$$8.5 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}}{\sqrt{x + 1}};$$

$$8.7 \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{a} + \sqrt{x - a}}{\sqrt{x^2 - a^2}};$$

$$8.9 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{2 + x}{3 - x} \right)^{\frac{1 + \sqrt{x}}{1 - x}};$$

$$8.11 \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{x^2 + 2}{x^2 - 2} \right)^{x^2};$$

$$8.13 \quad \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\operatorname{tg} x)^{\operatorname{tg} 2x};$$

$$8.15 \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{3x^2 + x - 1}{2x^2 - x + 1} \right)^{\frac{x^3}{1 - x}};$$

$$8.17 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sin x}{x - \sin x};$$

$$8.19 \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin(\pi x^a)}{\sin(\pi x^b)};$$

$$8.21 \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{\operatorname{ch} x - \operatorname{ch} a}{x - a};$$

$$8.23 \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{\operatorname{th} x - \operatorname{th} a}{x - a};$$

$$8.25 \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{\ln x - \ln a}{x - a}, \quad a > 0;$$

$$8.27 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + \operatorname{tg} x} - \sqrt{1 + \sin x}}{x^3};$$

$$8.2 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 + x)(1 + 2x)(1 + 3x) - 1}{x - x^3};$$

$$8.4 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 + mx)^k - (1 + kx)^m}{x^2};$$

$$8.6 \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{7 + x^3} - \sqrt{3 + x^2}}{1 - x};$$

$$8.8 \quad \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x + 13} - 2\sqrt{x + 1}}{x^2 - 9};$$

$$8.10 \quad \lim_{x \rightarrow 1} \left( \frac{2 + x}{3 - x} \right)^{\frac{1 - \sqrt{x}}{1 - x}};$$

$$8.12 \quad \lim_{x \rightarrow \pi} \left( \frac{1 + \operatorname{tg} x}{1 + \sin x} \right)^{\frac{1}{\sin^3 x}};$$

$$8.14 \quad \lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{x^2}};$$

$$8.16 \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{x^2 + 3x - 2}{2x^2 - x - 2} \right)^{\frac{1}{x}};$$

$$8.18 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \operatorname{sh} x}{x - \operatorname{sh} x};$$

$$8.20 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sh} x - x}{x^3};$$

$$8.22 \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{\operatorname{sh} x - \operatorname{sh} a}{x - a};$$

$$8.24 \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{e^x - e^a}{x - a};$$

$$8.26 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{th} x}{x};$$

$$8.28 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{\cos x}}{1 - \cos \sqrt{x}};$$

$$8.29 \quad \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left( \frac{\pi}{\cos x} - 2x \operatorname{tg} x \right);$$

$$8.30 \quad \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{\sin(1-2x)}{4x^2-1};$$

$$8.31 \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2^x - x^2}{2-x};$$

$$8.32 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{27+x} - \sqrt[4]{16-x} - e^x}{\ln(1+e^x - \cos x)};$$

$$8.33 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\cos x} - e^{1+\ln(1+x)}}{\sqrt{9+2x}-3};$$

$$8.34 \quad \lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \ln \cos \frac{\pi}{x};$$

$$8.35 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cos ax}{\ln \cos bx};$$

$$8.36 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(xe^x) - \cos(xe^{-x})}{x^3};$$

$$8.37 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x \sin x \cos 2x} - (x^2-1)^2}{e^{\operatorname{tg} x^2} - \cos x}.$$

Для функції  $f(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  знайдіть односторонні границі при  $x \rightarrow x_0 + 0$  та  $x \rightarrow x_0 - 0$ . Чи існує у кожному випадку  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ ?

$$8.38 \quad f(x) = [x], \quad \mathbf{1)} \ x_0 = 1, \quad \mathbf{2)} \ x_0 = \sqrt{3}, \quad \mathbf{3)} \ x_0 = 0,999;$$

$$8.39 \quad f(x) = \{x\}, \quad \mathbf{1)} \ x_0 = 0, \quad \mathbf{2)} \ x_0 = \sqrt{2}, \quad \mathbf{3)} \ x_0 = \frac{1}{3};$$

$$8.40 \quad f(x) = \operatorname{sgn} x, \quad \mathbf{1)} \ x_0 = 0, \quad \mathbf{2)} \ x_0 = e;$$

$$8.41 \quad f(x) = \frac{1}{e^{\{x\}} - 1}, \quad \mathbf{1)} \ x_0 = 0, \quad \mathbf{2)} \ x_0 = \frac{1}{3}, \quad \mathbf{3)} \ x_0 = -\frac{17}{8};$$

$$8.42 \quad f(x) = \frac{\sin x}{|x|}, \quad \mathbf{1)} \ x_0 = 0, \quad \mathbf{2)} \ x_0 = 2, \quad \mathbf{3)} \ x_0 = \pi;$$

$$8.43 \quad f(x) = \frac{1}{1-2^{\frac{x}{1-x}}}, \quad \mathbf{1)} \ x_0 = -1, \quad \mathbf{2)} \ x_0 = 0, \quad \mathbf{3)} \ x_0 = 1;$$

$$8.44 \quad f(x) = \operatorname{sgn}(\cos \pi x), \quad \mathbf{1)} \ x_0 = 0, \quad \mathbf{2)} \ x_0 = \frac{1}{2}, \quad \mathbf{3)} \ x_0 = 1.$$

Порівняйте функції  $f$  та  $g$  при  $x \rightarrow 0$  ( $x \rightarrow 0+$ ), тобто вкажіть, які з умов  $f = O(g)$ ,  $g = O(f)$ ,  $f = o(g)$ ,  $g = o(f)$ ,  $f \sim g$  виконуються:

$$8.45 \quad f(x) = \frac{\cos x - 1}{x}, \quad g(x) = \operatorname{tg} x;$$

$$8.46 \quad f(x) = [x], \quad g(x) = \{x\};$$

$$8.47 \quad f(x) = \{x\}, \quad g(x) = e^x - 1;$$

$$8.48 \quad f(x) = \cos x - 1, \quad g(x) = 1 - \operatorname{ch} x;$$

$$8.49 \quad f(x) = \frac{1}{x}, \quad g(x) = \frac{1}{x^2};$$

$$8.50 \quad f(x) = 1 - \cos x, \quad g(x) = x^{\frac{3}{2}};$$

$$8.51 \quad f(x) = x^x, \quad g(x) = 1;$$

$$8.52 \quad f(x) = \sin x \cdot \sin \frac{1}{x}, \quad g(x) = \operatorname{tg} x;$$

$$8.53 \quad f(x) = x \cos \frac{1}{x}, \quad g(x) = x;$$

$$8.54 \quad f(x) = x^{x^x}, \quad g(x) = \sin x.$$

Визначте порядок відносно шкали  $x^n$  функції  $f(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  при  $x \rightarrow 0$  ( $x \rightarrow 0+$ ):

$$8.55 \quad f(x) = e^{\sin x} - 1;$$

$$8.56 \quad f(x) = \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}};$$

$$8.57 \quad f(x) = \operatorname{arctg} \frac{1}{x};$$

$$8.58 \quad f(x) = \sqrt{1+x} - 1;$$

$$\mathbf{8.59} \quad f(x) = \ln(\cos \sqrt{x});$$

$$\mathbf{8.60} \quad f(x) = e^{x^2} - \cos(\sin x).$$

При яких значеннях параметрів  $\alpha$  та  $\beta$  справджується рівність  $f(x) = o(1)$  при  $x \rightarrow x_0$  ( $x \rightarrow x_0 + 0$ ), якщо:

$$\mathbf{8.61} \quad f(x) = \frac{\ln(1+x^\alpha)}{x^\beta}, \quad x_0 = 0;$$

$$\mathbf{8.62} \quad f(x) = x^\alpha \sin \frac{1}{x^\beta}, \quad x_0 = 0;$$

$$\mathbf{8.63} \quad f(x) = \frac{x^2 \operatorname{arctg} x}{1+x} - \alpha x^3 - \beta, \quad x_0 = 0;$$

$$\mathbf{8.64} \quad f(x) = \ln(1+e^{3x}) - \alpha x - \beta, \quad \mathbf{1)} \quad x_0 = 0, \quad \mathbf{2)} \quad x_0 = +\infty;$$

$$\mathbf{8.65} \quad f(x) = \frac{xe^x}{1+x} - \alpha x - \beta, \quad \mathbf{1)} \quad x_0 = -\infty, \quad \mathbf{2)} \quad x_0 = +\infty;$$

$$\mathbf{8.66} \quad f(x) = \sqrt{x^2+1} - \sqrt{x^2-1} + \frac{\alpha}{x} + \beta, \quad x_0 = +\infty.$$

## Тема 5. Неперервність функції. Класифікація точок розриву

З поняттям границі функції тісно пов'язане поняття неперервності функції.

Нехай  $x_0$  — гранична точка множини  $D_f$  і при цьому  $x_0 \in D_f$ . Функція  $f$  є **неперервною в точці**  $x_0$ , якщо виконується одна із еквівалентних умов:

- 1)  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ ;
- 2)  $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon, x_0) : \forall x \in D_f \ |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$  (означення неперервної функції в точці за Коші);
- 3)  $\forall (x_n)_{n \in \mathbb{N}} : (x_n) \in D_f \wedge (x_n) \rightarrow x_0$  при  $n \rightarrow \infty \Rightarrow f(x_n) \rightarrow f(x_0)$ ,  $n \rightarrow \infty$  (означення неперервної функції в точці за Гейне);
- 4)  $\Delta f(x_0) = f(x) - f(x_0) \rightarrow 0$  при  $\Delta x = x - x_0 \rightarrow 0$ .

Функція  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , яка не є неперервною в точці  $x_0 \in D_f$ , називається **розривною** в цій точці.

**Теорема (про арифметичні дії з неперервними функціями).** Нехай функції  $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  неперервні в точці  $x_0 \in D_f = D_g$ . Тоді неперервні в цій точці також і функції  $f + g, f - g, f \cdot g$  та  $\frac{f}{g}$  (якщо  $g(x_0) \neq 0$ ) [1, с. 136].

**Теорема (про неперервність суперпозиції функцій).** Нехай  $f$  неперервна в точці  $x_0 \in D_f$ , а  $g$  неперервна в точці  $\xi_0 \in D_g$ . Якщо  $g(\xi_0) = x_0$ , то суперпозиція  $f \circ g$  неперервна в точці  $\xi_0$  [1, с. 137].

**Теорема (про границю неперервної суперпозиції).** Нехай  $\xi_0$  — гранична точка множини  $D_{f \circ g}$ . Якщо  $\lim_{\xi \rightarrow \xi_0} g(\xi) = x_0$  і  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  — неперервна в точці  $x_0$ , то  $\lim_{\xi \rightarrow \xi_0} f(g(\xi)) = f(x_0)$  [1, с. 138].

Функція  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  називається **неперервною зліва (справа) в точці**  $x_0 \in D_f$ , граничній для множини  $D_f$ , якщо  $f(x_0 - 0) = f(x_0)$  ( $f(x_0 + 0) = f(x_0)$ ).

Нехай  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $x_0$  — гранична точка множини  $D_f$ . Якщо  $x_0 \notin D_f$ , то точка  $x_0$  називається **особливою** для функції  $f$ . Зокрема, якщо  $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \in \mathbb{R}$ , то точка  $x_0$  називається **усувною особливою**, а якщо  $\nexists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ , то точка  $x_0$  називається **істотно особливою** [1, с. 142].

### Класифікація точок розриву функції

Точки розриву та особливі точки функції  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , які є граничними одночасно для обох множин  $D_f \cap (x_0, +\infty)$  та  $D_f \cap (-\infty, x_0)$ , поділяються на такі типи:

1)  $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \in \mathbb{R}$  і  $f(x_0)$  або не існує, або  $f(x_0) \neq \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ ; тоді точка  $x_0$  називається **точкою усувного розриву**;

2)  $\exists f(x_0 - 0) \in \mathbb{R}, \exists f(x_0 + 0) \in \mathbb{R}$  і  $f(x_0 + 0) \neq f(x_0 - 0)$  називається **точкою розриву першого роду**; число  $\eta = f(x_0 + 0) - f(x_0 - 0)$  називається **стрибком функції**  $f$  у точці  $x_0$ ;

3) якщо односторонні границі в точці  $x_0$  або не існують, або хоча б одна з них — нескінченна, то точка  $x_0$  називається **точкою розриву другого роду**;

4) якщо  $\exists f(x_0 + 0) \in \overline{\mathbb{R}}, \exists f(x_0 - 0) \in \overline{\mathbb{R}}$  і хоча б одна з них — нескінченна, то точка розриву II роду  $x_0$  називається **полумом** [1, с. 141].

Функція  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  називається **неперервною на множині**  $X \subset D_f$ , якщо вона неперервна в кожній точці цієї множини. Клас усіх функцій, неперервних на  $X$ , позначають символом  $C(X)$  [1, с. 141].

**Властивість.** Всі елементарні функції є неперервними на своїх областях визначення.

Функція  $f : X \rightarrow \mathbb{R}$  називається **кусково-неперервною**, якщо вона неперервна в усіх внутрішніх точках множини  $X$ , за виключенням скінченної множини точок, які є точками розриву I роду або точками усувного розриву функції  $f$  [1, с. 142].

Зокрема, якщо  $X = [a, b]$ , то функція  $f$  називається **кусково-неперервною**, якщо вона неперервна в усіх внутрішніх точках сегмента  $[a, b]$ , за винятком скінченної множини точок, в кожній з яких має скінченні лівосторонню та правосторонню границі, і крім того має скінченні значення  $f(a + 0)$  та  $f(b - 0)$ .

**Теорема (Вейерштрасса).** Нехай  $f \in C[a, b]$ . Тоді функція  $f$  — обмежена та  $\exists \{x_*, x^*\} \subset [a, b] : f(x_*) = \inf_{x \in [a, b]} f(x), f(x^*) = \sup_{x \in [a, b]} f(x)$  [8, с. 70].

**Теорема (Коші про проміжне значення).** Нехай  $f \in C[a, b]$ . Тоді для будь-якого числа  $L$  з відрізка із кінцями у точках  $f(a)$  і  $f(b)$  існує  $c \in [a, b] : f(c) = L$  [8, с. 70].

## Практичне заняття 9

**Приклад 1.** Доведемо неперервність функції  $f(x) = \cos x$  на множині  $\mathbb{R}$ .

┐

Оскільки для довільної точки  $x_0 \in \mathbb{R}$  та  $\forall x \in \mathbb{R}$ :

$$|\cos x - \cos x_0| = \left| -2 \sin \frac{x + x_0}{2} \sin \frac{x - x_0}{2} \right| \leq 2 \left| \frac{x - x_0}{2} \right| < \varepsilon,$$

то за означенням Коші  $f$  є неперервною на  $\mathbb{R}$  за умови, що  $|x - x_0| < \delta = \varepsilon$ . ┐

**Приклад 2.** Дослідимо на неперервність функцію  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} :$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^3 - 1}{x - 1}, & x \neq 1, \\ 4, & x = 1. \end{cases}$$

┐

При  $x \neq 1$  функцію можна переписати у вигляді  $f(x) = x^2 + x + 1$ , а тому  $f \in C(\mathbb{R} \setminus \{1\})$ . Оскільки  $\lim_{x \rightarrow 1-0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1+0} f(x) = 3 \neq f(1)$ , то  $x = 1$  є точкою усувного розриву. ┐



**Приклад 3.** Дослідимо на неперервність функцію  $f(x) = \operatorname{arctg} \frac{1}{x}$  на  $\mathbb{R}$ .  
 $\Gamma$

На  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$  функція є неперервною за теоремою про неперервність суперпозиції неперервних функцій. Оскільки  $\lim_{x \rightarrow 0-0} f(x) = -\frac{\pi}{2}$  та  $\lim_{x \rightarrow 0+0} f(x) = \frac{\pi}{2}$ , то  $x = 0$  є точкою розриву I роду.

**Приклад 4.** Дослідимо на неперервність функцію  $f(x) = e^{x+\frac{1}{x}}$ ,  $x \in \mathbb{R}$ .  
 $\Gamma$

На  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$  функція є неперервною за теоремою про неперервність суперпозиції неперервних функцій. Оскільки  $\lim_{x \rightarrow 0-0} f(x) = 0$  та  $\lim_{x \rightarrow 0+0} f(x) = \infty$ , то  $x = 0$  є точкою розриву II роду типу полюс.

**Приклад 5.** Дослідимо на неперервність функцію  $f(x) = x[x]$ ,  $x \in \mathbb{R}$ .  
 $\Gamma$

Функція  $f$  є неперервною на множині  $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$ . Перевіримо точки  $n \in \mathbb{Z}$ :

$$\lim_{x \rightarrow n-0} f(x) = n \cdot (n-1) = n^2 - n, \quad \lim_{x \rightarrow n+0} f(x) = n \cdot n = n^2.$$

Отже, у точках  $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$  функція  $f$  має розриви I роду, а у точці 0 функція  $f$  — неперервна.

Доведіть неперервність функції  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  на  $D_f$  за означенням Коші, якщо:

**9.1**  $f(x) = \sin x$ ;

**9.2**  $f(x) = \operatorname{tg} x$ ;

**9.3**  $f(x) = \operatorname{ctg} x$ ;

**9.4**  $f(x) = \arcsin x$ ;

**9.5**  $f(x) = \operatorname{sh} x$ ;

**9.6**  $f(x) = \operatorname{ch} x$ ;

**9.7**  $f(x) = \sqrt{x}$ ;

**9.8**  $f(x) = x^3$ ;

**9.9**  $f(x) = e^x$ ;

**9.10**  $f(x) = \ln x$ .

Дослідіть на неперервність і встановіть характер точок розриву функції  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , а також побудуйте її графік, якщо:

**9.11**  $f(x) = \begin{cases} 2-x, & x \leq 2, \\ \frac{1}{x-2}, & x > 2; \end{cases}$

**9.12**  $f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0; \end{cases}$

**9.13**  $f(x) = \begin{cases} x, & |x| \leq 1, \\ \frac{x^3}{3} + \frac{2}{3} \operatorname{sgn} x, & |x| > 1; \end{cases}$

**9.14**  $f(x) = \begin{cases} \cos x, & x \leq -\frac{\pi}{4}, \\ \operatorname{tg} x, & -\frac{\pi}{4} < x < 0, \\ e^x - 1, & x \geq 0; \end{cases}$

**9.15**  $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{|x|}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0; \end{cases}$

**9.16**  $f(x) = \begin{cases} \left| \frac{\sin x}{x} \right|, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0; \end{cases}$

**9.17**  $f(x) = [x] \sin \pi x$ ;

**9.18**  $f(x) = 2^{-2^{\frac{1}{1-x}}}$ ;

**9.19**  $f(x) = \operatorname{arctg} \left( \frac{1}{x-1} + \frac{1}{x} \right)$ ;

**9.20**  $f(x) = \frac{1}{\ln |x|}$ ;

$$\mathbf{9.21} \quad f(x) = \frac{[x]}{\pi} ([x] - (-1)^{[x]} \cos \pi x); \quad \mathbf{9.22} \quad f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}, & x \neq 0, \\ e, & x = 0; \end{cases}$$

$$\mathbf{9.23} \quad f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{x^2 - 1}{x\sqrt{3}} + \frac{\pi}{2\sqrt{3}} \operatorname{sgn} x, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0; \end{cases}$$

$$\mathbf{9.24} \quad f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{5}} \operatorname{arctg} \frac{3 \operatorname{tg} \frac{x}{2} + 1}{\sqrt{5}} + \frac{\pi}{\sqrt{5}} \left[ \frac{x + \pi}{2\pi} \right], & x \neq (2n + 1)\pi, n \in \mathbb{Z}, \\ \frac{\pi}{\sqrt{5}} \left( n + \frac{1}{2} \right), & x = (2n + 1)\pi, n \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Підберіть значення параметрів  $\alpha$  та  $\beta$ , щоб функція  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  була неперервною на  $\mathbb{R}$ :

$$\mathbf{9.25} \quad f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 4}{x^3 - 8} + \frac{\sin x}{2x}, & x \notin \{0, 2\}, \\ \alpha, & x = 0, \\ \beta, & x = 2; \end{cases}$$

$$\mathbf{9.26} \quad f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt[3]{27+x} - \sqrt[3]{27-x} + x^2}{x + 2\sqrt[3]{x^4}}, & x \neq 0, \\ \alpha, & x = 0. \end{cases}$$

Дослідіть на неперервність зліва та справа функції  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  в усіх точках множини  $D_f$ , якщо:

$$\mathbf{9.27} \quad f(x) = [x^2];$$

$$\mathbf{9.28} \quad f(x) = (-1)^{[x]};$$

$$\mathbf{9.29} \quad f(x) = \frac{2x + 1}{6 - 2\frac{x+1}{x}}, x \neq 0 \text{ та: } \mathbf{1)} f(0) = 0, \mathbf{2)} f(0) = \frac{1}{6};$$

$$\mathbf{9.30} \quad f(x) = e^{-\frac{1}{x}}, x \neq 0 \text{ та: } \mathbf{1)} f(0) = 0, \mathbf{2)} f(0) = 1, \mathbf{3)} f(0) = e.$$

## Тема 6. Рівномірно неперервні функції

Функція  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  називається **рівномірно неперервною на множині**  $X \subset D_f$ , якщо  $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall (\{x_1, x_2\} \subset X) : |x_1 - x_2| < \delta \Rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$ .

Множина  $X \subset \mathbb{R}$  називається **компактною в собі** або **компактом**, якщо з будь-якої послідовності точок  $(x_n) \subset X$  можна виділити підпослідовність  $(x_{n_k})$ , збіжну до деякої точки  $x_0 \in X$  [1, с. 145].

**Теорема (критерій компактності).** Множина  $X \subset \mathbb{R}$  є компактом тоді і тільки тоді, коли вона одночасно замкнена і обмежена [1, с. 146].

**Теорема (Кантора).** Нехай функція  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  неперервна на множині  $X \subset D_f$ . Якщо  $X$  — компакт, то  $f$  є рівномірно неперервною на  $X$  [1, с. 157].

При дослідженні функцій на рівномірну неперервність можна використовувати властивості 1–3 і твердження 4–6.

1. Якщо  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  рівномірно неперервна на  $X \subset D_f$ , то  $\forall Y \subset X$  звуження  $f$  також є рівномірно неперервним на  $Y$  (*рівномірна неперервність звуження*).
2. Якщо функція  $f$  є рівномірно неперервною на множинах  $[a, b]$  та  $[b, c]$ , то вона є рівномірно неперервною на  $[a, c]$  ( $\{a, c\} \subset \mathbb{R}$ ) (*рівномірна неперервність на об'єднанні*).
3. Якщо  $f, g$  — рівномірно неперервні на  $X$  функції, то  $\forall \{\alpha, \beta\} \subset \mathbb{R}$  функція  $(\alpha f + \beta g)$  є рівномірно неперервною на  $X$  (*лінійність рівномірної неперервності*).
4. Функція  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  є рівномірно неперервною на  $X$  тоді і тільки тоді, коли  $\forall (x_n), (y_n) \subset X$  з умови  $x_n - y_n \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$  випливає:  $f(x_n) - f(y_n) \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$  (*рівномірна неперервність в термінах послідовностей*).
5. Якщо  $f \in C[a, +\infty)$  ( $f \in C(-\infty, a]$ ) і має скінченну границю  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b$  ( $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b$ ),  $b \in \mathbb{R}$ , то  $f$  є рівномірно неперервною на  $[a, +\infty)$  ( $(-\infty, a]$ ) (*рівномірна неперервність на нескінченності*).
6. Нехай  $f \in C(a, b)$ . Якщо  $\exists \lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = A \in \mathbb{R}, \exists \lim_{x \rightarrow b-0} f(x) = B \in \mathbb{R}$ , то  $f$  — рівномірно неперервна на  $(a, b)$ , інакше  $f$  не є рівномірно неперервною на  $(a, b)$  (*рівномірна неперервність на інтервалі*).

## Практичне заняття 10

**Приклад 1.** Дослідимо на рівномірну неперервність функцію  $f(x) = \sin x$  на множині  $\mathbb{R}$ .

Оскільки  $\forall x', x'' \in \mathbb{R}$ :

$$|\sin x' - \sin x''| = \left| 2 \sin \frac{x' - x''}{2} \cos \frac{x' + x''}{2} \right| \leq |x' - x''| < \varepsilon,$$

то за означенням функція  $f$  є рівномірно неперервною на  $\mathbb{R}$  за умови, що

$$|x' - x''| < \delta = \varepsilon.$$

┘

**Приклад 2.** Дослідимо на рівномірну неперервність функцію  $f(x) = \frac{1}{x-1}$  на множині  $X_1 = (2, 3)$ ,  $X_2 = (2, +\infty)$  та  $X_3 = (1, 2]$ .

┐

1. Функція  $f$  є неперервною на компактній множині  $[2, 3]$ . Тому  $f$  — рівномірно неперервна на  $[2, 3]$  за теоремою Кантора. Оскільки  $X_1 \subset [2, 3]$ , то за властивістю 1 функція  $f$  є рівномірно неперервною на множині  $X_1$ .

2. Оскільки  $f \in C([2, +\infty))$  та  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ , то за твердженням 5 функція  $f$  є рівномірно неперервною на множині  $X_2$ .

3. Оскільки  $\lim_{x \rightarrow 1+0} f(x) = +\infty$ , то за твердженням 6  $f$  не є рівномірно неперервною на множині  $X_3$ . Або ж за твердженням 4 вона також не є рівномірно неперервною на  $X_3$ : візьмемо дві послідовності  $x_n = 1 + \frac{1}{n}$ ,  $n \in \mathbb{N}$  та  $y_n = 1 + \frac{1}{n+1}$ ,  $n \in \mathbb{N}$ . Тоді  $|x_n - y_n| = \frac{1}{n(n+1)} \rightarrow 0$ ,  $n \rightarrow \infty$ . При цьому

$$|f(x_n) - f(y_n)| = |n - (n+1)| = 1 \not\rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty.$$

┘

**Приклад 3.** Дослідимо на рівномірну неперервність функцію  $f(x) = \sin \frac{1}{x}$  на множині  $(0, 1)$ .

┐

Оберемо  $x_n = \frac{1}{2\pi n}$ ,  $n \in \mathbb{N}$  та  $y_n = \frac{2}{\pi + 4\pi n}$ ,  $n \in \mathbb{N}$ . Тоді

$$|x_n - y_n| = \frac{1}{2\pi n(1 + 4n)} \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty.$$

З іншого боку,  $|f(x_n) - f(y_n)| = |0 - 1| = 1 \not\rightarrow 0$ ,  $n \rightarrow \infty$ . Отже, функція  $f$  не є рівномірно неперервною на інтервалі  $(0, 1)$  згідно із твердженням 4.

┘

Дослідіть функцію  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  на рівномірну неперервність на множині  $X$ , якщо:

**10.1**  $f(x) = \operatorname{tg} x$ , **1**)  $X = \left(0, \frac{\pi}{4}\right)$ , **2**)  $X = \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ ;

**10.2**  $f(x) = \frac{1}{x}$ , **1**)  $X = (0, 1)$ , **2**)  $X = \left(\frac{1}{100}, 100\right)$ , **3**)  $X = (2, +\infty)$ ;

**10.3**  $f(x) = \ln x$ , **1**)  $X = (0, 1)$ , **2**)  $X = (1, e)$ , **3**)  $X = (e, +\infty)$ ;

**10.4**  $f(x) = \sin \frac{\pi}{x}$ , **1**)  $X = (0, \pi)$ , **2**)  $X = (1, +\infty)$ ;

**10.5**  $f(x) = \begin{cases} \frac{|\sin x|}{x}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0, \end{cases}$  **1**)  $X = [0, 1)$ , **2**)  $X = [-1, 1]$ ;

**10.6**  $f(x) = e^{-\arcsin x}$ , **1**)  $X = (-1, 1)$ , **2**)  $X = [-1, 1]$ ;

**10.7**  $f(x) = \frac{1}{\operatorname{sh} x}$ , **1**)  $X = (-1, 0)$ , **2**)  $X = (0, +\infty)$ ;

**10.8**  $f(x) = \sqrt{x}$ , **1**)  $X = (0, 2)$ , **2**)  $X = (2, +\infty)$ ;

**10.9**  $f(x) = \cos x^2$ ,  $X = \mathbb{R}$ ;

**10.11**  $f(x) = \operatorname{arctg} x$ ,  $X = \mathbb{R}$ ;

**10.10**  $f(x) = x + \sin x$ ,  $X = \mathbb{R}$ ;

**10.12**  $f(x) = \operatorname{arcctg} x$ ,  $X = \mathbb{R}$ .

# Розділ 4. Диференційне числення

## Тема 7. Похідна та диференціал функції.

### Правила диференціального числення

Нехай функція  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $x_0 \in D_f$ . Функція  $f$  називається **диференційовною в точці**  $x_0$ , якщо існує така неперервна в точці  $x_0$  функція  $D_f \xrightarrow{\varphi} \mathbb{R}$ , що  $\forall x \in D_f$  виконується рівність:  $f(x) - f(x_0) = (x - x_0)\varphi(x)$ .

Якщо  $x_0$  — гранична точка множини  $D_f$ , то число  $\varphi(x_0)$  називається **похідною функції  $f$  в точці  $x_0$**  і позначається символом  $f'(x_0) = \varphi(x_0)$ .

Нехай  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $x_0 \in D_f$  та є граничною точкою  $D_f$ . Якщо  $f$  диференційовна в точці  $x_0$ , то

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0).$$

#### Правила диференціювання [1, с. 177–179].

Нехай функції  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  та  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  диференційовні в точці  $x_0$ , граничний для множини  $D_f = D_g$ .

**1. Лінійність диференціювання:**  $\forall \{\lambda, \mu\} \subset \mathbb{R}$  функція  $\lambda f + \mu g$  диференційовна в точці  $x_0$  і виконується рівність:

$$(\lambda f + \mu g)'(x_0) = \lambda f'(x_0) + \mu g'(x_0).$$

**2. Диференціювання добутку функцій:** функція  $(f \cdot g)$  диференційовна в точці  $x_0$  та виконується рівність:

$$(fg)'(x_0) = f'(x_0)g(x_0) + g'(x_0)f(x_0).$$

**3. Похідна частки:** якщо  $g(x_0) \neq 0$ , то функція  $\frac{f}{g}$  — диференційовна в точці  $x_0$  і виконується рівність:

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{g^2(x_0)}.$$

**Теорема (похідна суперпозиції функцій).** Нехай функція  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  диференційовна в точці  $x_0$ , граничний для  $D_f$ , а функція  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  диференційовна в точці  $\xi_0$ . Якщо  $x_0 = g(\xi_0)$  та  $\xi_0$  — гранична точка множини  $D_{f \circ g}$ , тоді суперпозиція  $f \circ g$  диференційовна в точці  $\xi_0$  і справджується рівність:

$$(f \circ g)'(\xi_0) = f'(x_0)g'(\xi_0).$$

**Теорема (похідна оберненої функції).** Нехай функція  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  — обертна,  $x_0 \in D_f$ ,  $x_0$  є граничною точкою множини  $D_f$  та  $y_0 = f(x_0)$ . Якщо існує  $f'(x_0) \neq 0$  і обернена функція  $f^{(-1)}$  неперервна в точці  $y_0$ , то вона диференційовна в цій точці. Якщо, крім того,  $y_0$  — гранична точка множини  $E_f = D_{f^{(-1)}}$ , то  $(f^{(-1)})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$  [1, с. 179].

Нехай  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ . Якщо  $x_0$  — гранична точка множини  $D_f \cap (-\infty, x_0)$  ( $D_f \cap (x_0, +\infty)$ ), то  $f'_\Lambda(x_0) \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x < x_0}} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$  ( $f'_\Pi(x_0) \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x > x_0}} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ ).

Числа  $f'_\Lambda(x_0)$  та  $f'_\Pi(x_0)$ , якщо вони існують, називаються відповідно **лівою** та **правою похідними функції  $f$  у точці  $x_0$** .

**Теорема (критерій диференційовності функції).** Для того, щоб неперервна функція  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  була диференційовною в точці  $x_0 \in D_f$ , граничний для множин  $D_f \cap (-\infty, x_0)$  та  $D_f \cap (x_0, +\infty)$ , необхідно й достатньо, щоб вона мала в цій точці скінченні ліву та праву похідні, і при цьому  $f'_\Lambda(x_0) = f'_\Pi(x_0)$ .

Функція (відображення)  $L : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  називається **лінійною**, якщо для довільних  $\{x_1, x_2, \lambda\} \subset \mathbb{R}$  виконуються умови:

1.  $L(x_1 + x_2) = L(x_1) + L(x_2)$  (**адитивність**);
2.  $L(\lambda x_1) = \lambda L(x_1)$  (**однорідність**).

За означенням,  $L(0) = 0$  та  $\forall x \in \mathbb{R} : L(x) = ax$ ,  $a = L(1) = \text{const}$ .

Нехай функція  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  — диференційовна в точці  $x_0 \in D_f$ , граничний для множини  $D_f$ , тобто має в цій точці похідну:

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f(x_0, \Delta x)}{\Delta x}.$$

Тоді за означенням границі функції маємо, що

$$\frac{\Delta f(x_0, \Delta x)}{\Delta x} = f'(x_0) + \alpha(\Delta x), \quad \text{де } \alpha(\Delta x) \rightarrow 0 \text{ при } \Delta x \rightarrow 0,$$

звідки

$$\Delta f(x_0, \Delta x) = f'(x_0) \cdot \Delta x + \alpha(\Delta x) \cdot \Delta x.$$

Перший доданок  $f'(x_0) \cdot \Delta x$  є лінійною функцією відносно  $\Delta x$  і є функцією одного порядку із  $\Delta x$  при  $\Delta x \rightarrow 0$  за умови, що  $f'(x_0) \neq 0$ . Другий доданок  $\alpha(\Delta x) \cdot \Delta x$  є нескінченно малою вищого порядку, ніж  $\Delta x$  при  $\Delta x \rightarrow 0$ , тому не є лінійною функцією відносно  $\Delta x$ .

Якщо функція  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  диференційовна в точці  $x_0 \in D_f$ , граничний для множини  $D_f$ , то **диференціалом функції  $f$  у точці  $x_0$**  називається головна частина приросту функції  $f(x)$  у цій точці, лінійна відносно  $\Delta x$ , і позначається символом  $df(x_0) = f'(x_0) \cdot \Delta x$ . Оскільки диференціал незалежної змінної  $x$  збігається з її приростом, то  $df(x_0) = f'(x_0) dx$ .

Нехай визначені функції  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  та  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  такі, що  $g(t_0) = x_0$ , точка  $t_0 \in D_{f \circ g}$  є граничною для цієї множини і суперпозиція  $f \circ g$  диференційовна в точці  $t_0$ . Тоді її похідна записується у вигляді:  $(f \circ g)'(t_0) = f'(x_0) \cdot g'(t_0)$ , а диференціал набуває вигляду:  $d(f \circ g)(t_0) = f'(x_0) g'(t_0) dt = f'(x_0) dx$ , де  $dt \in \mathbb{R}$ ,  $dx = g'(t_0) dt$ . З останнього співвідношення, а саме  $d(f \circ g)(t_0) = df(x_0)$ , маємо, що форма диференціала така ж сама, як і для випадку незалежної змінної  $x$ . Ця властивість називається **інваріантністю першого диференціалу**.

Нехай функція  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  задана параметрично рівняннями  $x = \varphi(t)$ ,  $y = \psi(t)$ ,  $t \in (a, b)$ . Припустимо, що  $\forall t \in (a, b)$  існують похідні  $\varphi'(t) \neq 0$  та

$\psi'(t)$ . Тоді функція  $\varphi(t)$  строго монотонна на інтервалі  $(a, b)$  та існує обернена функція  $\varphi^{(-1)} : E_\varphi \rightarrow (a, b)$ , яка має похідну  $t'(x) = (\varphi^{(-1)})'(x) = \frac{1}{\varphi'(t)}$ . Суперпозиція  $f = \psi \circ \varphi^{(-1)}$  має похідну  $\forall t \in (a, b)$ , яка обчислюється за формулою:

$$f'(x) = \psi'(\varphi^{(-1)}(x)) \cdot (\varphi^{(-1)})'(x) = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}, \quad x = \varphi(t).$$

## Практичне заняття 11

**Приклад 1.** Дослідимо на диференційовність функцію  $f(x) = |\operatorname{tg} x|$  на множині  $D_f$ .

Оскільки  $D_f = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z} \right\}$  та  $f(x)$  є диференційовною на множині  $D_f \setminus \{\pi k, k \in \mathbb{Z}\}$  як елементарна, то залишається перевірити точки  $\{\pi k, k \in \mathbb{Z}\}$ :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow k\pi - 0} \frac{-\operatorname{tg} x - \operatorname{tg}(k\pi)}{x - k\pi} &= \lim_{x \rightarrow k\pi - 0} -\frac{\operatorname{tg}(x - k\pi)}{x - k\pi} = -1, \\ \lim_{x \rightarrow k\pi + 0} \frac{\operatorname{tg} x - \operatorname{tg}(k\pi)}{x - k\pi} &= \lim_{x \rightarrow k\pi + 0} \frac{\operatorname{tg}(x - k\pi)}{x - k\pi} = 1. \end{aligned}$$

Отже, границя  $\lim_{x \rightarrow k\pi} \frac{f(x) - f(k\pi)}{x - k\pi}$  не існує  $\forall k \in \mathbb{Z}$ , тому функція  $f$  є диференційовною лише на множині  $D_f \setminus \{\pi k, k \in \mathbb{Z}\}$ . ┘

**Приклад 2.** Знайдемо похідну функції  $f(x) = \operatorname{arctg} \frac{1}{x}$ ,  $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ .

Позначимо  $f(t) = \operatorname{arctg} t$ ,  $t(x) = \frac{1}{x}$ . За правилом диференціювання складної функції  $f'_x = f'_t \cdot t'_x$ , тобто

$$f'(x) = (\operatorname{arctg} t)'_t \cdot t'_x = \frac{1}{1 + \left(\frac{1}{x}\right)^2} \cdot \frac{-1}{x^2} = -\frac{1}{x^2 + 1}.$$

**Приклад 3.** Знайдемо похідну функції  $f(x) = \arccos x^2$  за правилом диференціювання оберненої функції на множині  $(-1, 0)$  та у точці  $x_0 = -\frac{1}{2}$ .

Спочатку знайдемо обернену функцію до функції  $f$ :

$$y = \arccos x^2, x \in (-1, 0) \quad \Leftrightarrow \quad x = \sqrt{\cos y}, y \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right).$$

Тому  $f^{(-1)}(y) = \sqrt{\cos y}$ . За теоремою про диференціювання оберненої функції знайдемо похідну від оберненої функції до функції  $f^{(-1)}(y)$ :

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{(f^{(-1)})'(y)} = -\frac{2\sqrt{\cos y}}{\sin y} = \frac{-2x}{\sin(\arccos x^2)} = \\ &= \frac{-2x}{\sqrt{1 - \cos^2(\arccos x^2)}} = \frac{-2x}{\sqrt{1 - x^4}}, \quad x \in (-1, 0). \end{aligned}$$



Відповідне значення похідної у точці  $x_0 = -\frac{1}{2}$ :  $f'(x_0) = \frac{4}{\sqrt{15}}$ . ┘

**Приклад 4.** Вважаючи функції  $\varphi$  та  $\psi$  диференційовними на  $\mathbb{R}$ , знайдемо похідну показниково-степеневі функції  $f(x) = (\varphi(x))^{\psi(x)}$  на множині  $D_f$ .  
┐

Оскільки функцію  $f$  можна представити у вигляді  $f(x) = e^{\psi(x) \ln \varphi(x)}$ , то множина визначення функції  $f$  співпадає з множиною  $A = \{x : \varphi(x) > 0\}$ . Знайдемо похідну функції  $f$  на множині  $A$ :

$$f'(x) = \left( e^{\psi(x) \ln \varphi(x)} \right)' = (\varphi(x))^{\psi(x)} \cdot \left( \psi'(x) \ln \varphi(x) + \psi(x) \frac{\varphi'(x)}{\varphi(x)} \right). \quad \text{┘}$$

**Приклад 5.** Знайдемо похідну неявно заданої функції  $y^3 - x^2 = y^2 + x$  на множині її визначення та у точці  $P(-1, 1)$ .  
┐

Похідну функції  $y(x)$  можемо отримати, диференціюючи рівняння, що задає функцію:  $3y^2(x) \cdot y'(x) - 2x = 2y(x) \cdot y'(x) + 1$ . Звідси:

$$y'(x) = \frac{2x + 1}{y(x) \cdot (3y(x) - 2)}.$$

Відповідно похідна визначена на множині  $D_y \setminus \left\{ x : y(x) = 0 \vee y(x) = \frac{2}{3} \right\}$ , а у заданій точці  $P(-1, 1)$  дорівнює  $y'(-1, 1) = -1$ . ┘

**Приклад 6.** Вважаючи відомими диференціали функцій  $u$  та  $v$ , знайдемо диференціали функцій  $f_1 = \sin(u + v)$  та  $f_2 = \frac{1}{\sqrt{u^2 + v^2}}$ .  
┐

1. Нехай  $t = u + v$ . Тоді  $dt = du + dv$  та за властивістю інваріантності форми першого диференціалу маємо:

$$df_1 = d(\sin t) = \cos t \, dt = \cos(u + v) \cdot (du + dv).$$

2. Нехай  $t = \sqrt{u^2 + v^2}$ . Тоді  $dt = d(\sqrt{u^2 + v^2}) = \frac{d(u^2 + v^2)}{2\sqrt{u^2 + v^2}}$  та

$$df_2 = d\left(\frac{1}{t}\right) = -\frac{1}{t^2} dt = -\frac{1}{u^2 + v^2} \cdot \frac{d(u^2 + v^2)}{2\sqrt{u^2 + v^2}} = -\frac{udu + vdv}{(u^2 + v^2)^{3/2}}. \quad \text{┘}$$

Знайдіть похідні функцій  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , заданих явно, на області їх визначення:

**11.1**  $f(x) = 3^{\operatorname{tg} \frac{1}{x}};$

**11.2**  $f(x) = \sin(\operatorname{tg}(\cos^2 x));$

**11.3**  $f(x) = \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}};$

**11.4**  $f(x) = \frac{1}{\cos^n x};$

**11.5**  $f(x) = (\cos x)^{\sin x};$

**11.6**  $f(x) = x^{\frac{1}{x}};$

**11.7**  $f(x) = x^{\frac{25}{\ln x}};$

**11.8**  $f(x) = 10^{\frac{x}{\log x^3}};$

**11.9**  $f(x) = \ln \left| \frac{x^2 - 5x}{x^2 - 5x + 1} \right|;$

**11.10**  $f(x) = \operatorname{arctg} \frac{1+x}{1-x};$

**11.11**  $f(x) = a^{a^x} + a^{x^a} + x^{a^a} + a^{x^x} + x^{x^x}, \quad a > 0.$

Обчисліть похідну функції  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  у точці  $x_0$ , якщо:

$$\mathbf{11.12} \quad f(x) = (x-1)(x-2)^2(x-3)^3, \quad \mathbf{1)} \quad x_0 = 0, \quad \mathbf{2)} \quad x_0 = 1, \quad \mathbf{3)} \quad x_0 = 2;$$

$$\mathbf{11.13} \quad f(x) = 2^{\operatorname{tg} \frac{1}{x}}, \quad x_0 = \frac{1}{\pi}.$$

Знайдіть ліву та праву похідні функції  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  у точці  $x_0$  та зробіть висновок щодо її диференційовності у заданій точці:

$$\mathbf{11.14} \quad f(x) = \operatorname{sgn} x, \quad x_0 = 0;$$

$$\mathbf{11.15} \quad f(x) = \min \{x, \sin x\}, \quad \mathbf{1)} \quad x_0 = -\pi, \quad \mathbf{2)} \quad x_0 = 0;$$

$$\mathbf{11.16} \quad f(x) = \begin{cases} \frac{x}{1+e^{\frac{1}{x}}}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases} \quad \mathbf{1)} \quad x_0 = 0, \quad \mathbf{2)} \quad x_0 = \frac{1}{2}, \quad \mathbf{3)} \quad x_0 = 2.$$

Дослідіть функцію  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  на диференційовність, якщо:

$$\mathbf{11.17} \quad f(x) = |x|;$$

$$\mathbf{11.18} \quad f(x) = x \cdot |x|;$$

$$\mathbf{11.19} \quad f(x) = \begin{cases} x^2 \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0; \end{cases}$$

$$\mathbf{11.20} \quad f(x) = \begin{cases} x^3, & x < 0, \\ x^2, & x \geq 0; \end{cases}$$

$$\mathbf{11.21} \quad f(x) = [x] \sin \pi x;$$

$$\mathbf{11.22} \quad f(x) = [x] \sin^2 \pi x;$$

$$\mathbf{11.23} \quad f(x) = |x|^3;$$

$$\mathbf{11.24} \quad f(x) = \min \{x, \sin x\};$$

$$\mathbf{11.25} \quad f(x) = \begin{cases} x-1, & x < 1, \\ x^2-1, & x \geq 1. \end{cases}$$

Підберіть значення параметрів  $\alpha$  і  $\beta$  так, щоб функція  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  була диференційовною на  $\mathbb{R}$ :

$$\mathbf{11.26} \quad f(x) = \begin{cases} xe^{-\alpha x}, & x < 0, \\ x^2 - \beta x + 2\alpha, & x \geq 0; \end{cases} \quad \mathbf{11.27} \quad f(x) = \begin{cases} \operatorname{arctg} \alpha x, & x \leq 1, \\ \beta \operatorname{sgn}(x-3), & x > 1; \end{cases}$$

$$\mathbf{11.28} \quad f(x) = \begin{cases} \alpha \cos x + \beta \sin x, & x \leq 0, \\ \alpha x + \beta, & x > 0; \end{cases}$$

$$\mathbf{11.29} \quad f(x) = \begin{cases} |x|^\alpha \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

Підберіть значення параметрів  $\alpha$  і  $\beta$  так, щоб функція  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  була диференційовною у точці  $x_0$ , якщо:

$$\mathbf{11.30} \quad f(x) = \begin{cases} \sin \alpha x, & x < 0, \\ \sin \beta x, & x \geq 0, \end{cases} \quad \mathbf{1)} \quad x_0 = 0, \quad \mathbf{2)} \quad x_0 = \frac{\pi}{2};$$

$$\mathbf{11.31} \quad f(x) = \begin{cases} \alpha e^x + x - 1, & x \leq 0, \\ \beta, & x > 0, \end{cases} \quad \mathbf{1)} \quad x_0 = 0, \quad \mathbf{2)} \quad x_0 = 1.$$

За правилом диференціювання оберненої функції знайдіть похідну функції  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  на  $D_f$  та у точці  $x_0$ , якщо:

**11.32**  $f(x) = \arcsin x, x_0 = 0;$

**11.33**  $f(x) = \operatorname{arctg} x, x_0 = 1;$

**11.34**  $f(x) = e^{\arcsin x}, x_0 = 0;$

**11.35**  $f(x) = \arcsin \sqrt{x}, x_0 = \frac{1}{2};$

**11.36**  $f(x) = \sqrt[n]{x}, n \in \mathbb{N}, x_0 = 1;$

**11.37**  $f(x) = \log_2 x, x_0 = 2.$

Знайдіть диференціал функції  $y: x \mapsto f(x)$  (параметрично чи неявно заданої) на області визначення та у заданій точці  $P(x_0, y_0)$ :

**11.38**  $x = t^4 + 1, y = t^3 + t, P(2, 2);$

**11.39**  $x = \cos t, y = \sin t, P(1, 0);$

**11.40**  $x^4 + x = y^5 + y^2, P(1, 1);$

**11.41**  $e^y + y = \ln x + x, P(1, 0);$

**11.42**  $y^5 + y^3 + y + x = 0, P(-3, 1);$

**11.43**  $2y \ln y = x, P(2e, e);$

**11.44**  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, P(a, 0);$

**11.45**  $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = 1, P(1, 0).$

Знайдіть похідну функції, заданої параметрично, на області визначення, у заданій точці  $P(x_0, y_0)$  та при заданому значенні параметра, якщо:

**11.46**  $x = t^4 + 1, y = t^3 + t, P(2, 2);$

**11.47**  $x = \cos t, y = \sin t, P(1, 0);$

**11.48**  $x(t) = t \operatorname{sh} t, y(t) = t \operatorname{ch} t, t_0 = \ln 2, P(0, 0);$

**11.49**  $x(t) = 2^{\sin^2 t}, y(t) = 2^{\cos^2 t}, t_0 = \frac{\pi}{2}, P(1, 2);$

**11.50**  $x(t) = \frac{t^3 + 1}{t^2 - 1}, y(t) = \frac{t}{t^2 - 1}, t_0 = 0, P\left(3, \frac{2}{3}\right).$

Вважаючи відомими диференціали функцій  $u$  та  $v$ , знайдіть диференціал функції  $f$ , якщо:

**11.51**  $f = \ln(uv);$

**11.52**  $f = e^{uv};$

**11.53**  $f = u^v;$

**11.54**  $f = e^{u+v};$

**11.55**  $f = \operatorname{arctg} \frac{u}{v};$

**11.56**  $f = \ln \operatorname{tg} \frac{u}{v}.$

## Тема 8. Похідні та диференціали вищих порядків. Формула Лейбніца

Нехай область визначення функції  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  не має ізольованих точок та для всіх  $x \in D_f$  існує  $f'(x)$  — *похідна першого порядку* функції  $f$ , яка ще позначається як  $f^{(1)}$ , саму ж функцію тоді можна позначити як  $f = f^{(0)}$ . Також можна визначити функцію  $g : D_f \rightarrow \mathbb{R}$  за формулою:  $g(x) = f'(x)$ ,  $x \in D_f$ . Якщо в точці  $x_0 \in D_f$  існує похідна  $g'(x_0)$  функції  $g$ , то ця похідна називається **похідною другого порядку** функції  $f$  у точці  $x_0$  і позначається як  $f''(x_0)$  або  $\frac{d^2 f(x_0)}{dx^2}$ . Якщо функція  $g^{(n-1)}(x) = f^{(n)}(x)$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , — диференційовна в точці  $x_0 \in D_{f^{(n-1)}}$ , то її похідна  $(g^{(n-1)})'(x_0) = (f^{(n)})'(x_0)$  називається  **$(n+1)$ -ою похідною** функції  $f$  у точці  $x_0$  і позначається  $f^{(n+1)}(x_0)$ , а сама функція  $f$  —  **$(n+1)$ -диференційовною**.

Якщо функція має  $n$ -ту похідну в кожній точці  $X \subset D_f$ , то кажуть, що вона  **$n$ -диференційовна на множині  $X$** . Якщо при цьому  $f^{(n)} \in C(X)$ , то пишуть, що  $f \in C^{(n)}(X)$  ( $n$  разів неперервно-диференційовна на множині  $X$ ) і кажуть, що функція  $f$  з класу  $C^{(n)}$  (на множині  $X$ ). Якщо  $\forall n \in \mathbb{N}$  функція має похідну  $f^{(n)}$  в точці  $x_0$ , то вона називається **нескінченно диференційовною**, якщо  $\forall x \in X \subset D_f \forall n \in \mathbb{N} \exists f^{(n)}(x)$ , то функція називається **нескінченно диференційовною на множині  $X$**  і позначається  $f \in C^\infty(X)$ , і про неї кажуть, що вона належить класу  $C^\infty$ .

**Теорема (лінійність  $n$ -ої похідної).** Якщо функції  $f$  та  $g$  мають  $n$ -ту похідну в точці  $x_0 \in D_f = D_g$ , то і функція  $(\alpha f + \beta g)$  також  $n$ -диференційовна в точці  $x_0$  і має місце рівність:  $(\alpha f + \beta g)^{(n)}(x_0) = \alpha f^{(n)}(x_0) + \beta g^{(n)}(x_0)$ .

**Теорема (Лейбніца).** Якщо функції  $f$  та  $g$  мають  $n$ -ту похідну в точці  $x_0 \in D_f = D_g$ , то і функція  $(f \cdot g)$  теж  $n$ -диференційовна в цій точці та має місце **формула Лейбніца**:

$$(f \cdot g)^{(n)}(x_0) = \sum_{k=0}^n C_n^k f^{(k)}(x_0) g^{(n-k)}(x_0).$$

Припустимо, що функція  $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  має похідну  $f'(x)$ ,  $x \in (a, b) \subset D_f$ . Якщо існує диференціал цієї функції  $d(df(x_0)) = d(f'(x_0)dx) = f''(x_0)(dx)^2$  для всіх  $x_0 \in (a, b)$ , то він називається **другим диференціалом** функції  $f$  у точці  $x_0$  і позначається як

$$d^2 f(x_0) = f''(x_0) dx^2.$$

Нехай функція  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$   $n$ -диференційовна  $\forall x \in (a, b) \subset D_f$ . Тоді існують та неперервні похідні функції  $f$  до  $(n-1)$ -го порядку включно для всіх  $x \in (a, b)$ . Якщо існує диференціал  $d(d^{n-1}f(x_0)) = d(f^{(n-1)}(x_0)dx^{n-1}) = f^{(n)}(x_0)(dx)^n$  для всіх  $x_0 \in (a, b)$ , то він називається **диференціалом  $n$ -го порядку** функції  $f$  у точці  $x_0$  і позначається як

$$d^n f(x_0) = f^{(n)}(x_0) dx^n.$$

## Властивості диференціалів вищих порядків:

1.  $d^m(d^n f) = d^{m+n} f$ ;
2.  $d^n(f + g) = d^n f + d^n g$ ;
3.  $d^n(\alpha f) = \alpha d^n f$ , де  $\alpha \in \mathbb{R}$ .

*Властивість інваріантності* диференціалів вищих порядків функції  $f$  має місце тільки у випадку, якщо  $f = g(h(x))$ , де  $h$  — лінійна функція незалежної змінної  $x$ .

Знайдемо другу похідну для параметрично заданої функції. Нехай відображення  $x \mapsto y(x)$  задане рівняннями  $x = \varphi(t)$  та  $y = \psi(t)$ ,  $\{\varphi, \psi\} \subset C^1(X)$ .

Оскільки  $\frac{dy}{dx} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$  як похідна від складної функції  $y(t(x)) = y(\varphi^{-1}(x))$ , то

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left( \frac{dy}{dx} \right) = \frac{\frac{d}{dt} \left( \frac{dy}{dx} \right)}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\frac{d}{dt} \left( \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)} \right)}{\varphi'(t)} = \frac{\psi''(t)\varphi'(t) - \varphi''(t)\psi'(t)}{(\varphi'(t))^3}.$$

Також знайдемо похідну другого порядку від оберненої функції. Нехай  $y = f(x)$  — двічі диференційовна функція  $\forall x \in X$ , неперервна і строго монотонна на множині  $X$  та  $f'(x) \neq 0$ ,  $x \in X$ . Тоді функція  $f$  — оборотна  $\forall x \in X$  і,

враховуючи формулу похідної від оберненої функції:  $\frac{df^{(-1)}(y)}{dy} = \frac{1}{f'(x)}$ , маємо:

$$\frac{d^2 f^{(-1)}(y)}{dy^2} = \frac{d}{dy} \left( \frac{df^{(-1)}(y)}{dy} \right) = \frac{d}{dy} \left( \frac{1}{f'(x)} \right) = \frac{\frac{d}{dx} \left( \frac{1}{f'(x)} \right)}{\frac{dy}{dx}} = \frac{-\frac{f''(x)}{(f'(x))^2}}{f'(x)} = \frac{-f''(x)}{(f'(x))^3}.$$

Аналогічно знаходяться похідні порядків  $n \geq 3$ .

## Практичне заняття 12

**Приклад 1.** Знайдемо похідну  $n$ -го порядку для функції  $f(x) = \sin(ax + b)$ ,  $\{x, a, b\} \subset \mathbb{R}$ .

Знайдемо першу похідну функції та представимо її у такому вигляді:  $f'(x) = a \cos(ax + b) = a \sin\left(ax + b + \frac{\pi}{2}\right)$ . Другу похідну функції також можна представити у схожому вигляді:  $f''(x) = -a^2 \sin(ax + b) = a^2 \sin(ax + b + \pi)$ . Відповідно третя похідна  $f'''(x) = -a^3 \cos(ax + b) = a^3 \sin\left(ax + b + \frac{3\pi}{2}\right)$ . Узагальнюючи отримане, маємо:

$$(\sin(ax + b))^{(n)} = a^n \sin\left(ax + b + \frac{n\pi}{2}\right).$$

┘

**Приклад 2.** Знайдемо похідну  $n$ -го порядку для  $f(x) = \cos(ax + b)$ ,  $\{x, a, b\} \subset \mathbb{R}$ .

Знайдемо першу похідну функції та представимо її у такому вигляді:  $f'(x) = -a \sin(ax + b) = a \cos\left(ax + b + \frac{\pi}{2}\right)$ . Другу похідну функції також можна

представити у схожому вигляді:  $f''(x) = -a^2 \cos(ax + b) = a^2 \cos(ax + b + \pi)$ . Відповідно третя похідна  $f'''(x) = a^3 \sin(ax + b) = a^3 \cos\left(ax + b + \frac{3\pi}{2}\right)$ . Узагальнюючи отримане, маємо:

$$(\cos(ax + b))^{(n)} = a^n \cos\left(ax + b + \frac{n\pi}{2}\right).$$

**Приклад 3.** Знайдемо похідну  $n$ -го порядку для  $f(x) = e^{ax+b}$ ,  $\{x, a, b\} \subset \mathbb{R}$ .

Знайдемо першу похідну функції:  $f'(x) = a e^{ax+b}$ . Похідні другого та третього порядку:  $f''(x) = a^2 e^{ax+b}$ ,  $f'''(x) = a^3 e^{ax+b}$ . За індукцією маємо:

$$(e^{ax+b})^{(n)} = a^n e^{ax+b}.$$

**Приклад 4.** Знайдемо похідну  $n$ -го порядку для  $f(x) = \frac{1}{ax+b}$ ,  $\{x, a, b\} \subset \mathbb{R}$ .

Знайдемо першу похідну функції:  $f'(x) = \frac{-a}{(ax+b)^2}$ . Похідні другого та третього порядку:  $f''(x) = \frac{2! \cdot a^2}{(ax+b)^3}$ ,  $f'''(x) = \frac{3! \cdot (-a)^3}{(ax+b)^4}$ . За індукцією маємо:

$$\left(\frac{1}{ax+b}\right)^{(n)} = (-1)^n \frac{n! \cdot a^n}{(ax+b)^{n+1}}.$$

**Приклад 5.** Знайдемо похідну  $n$ -го порядку для  $f(x) = \ln(ax+b)$ ,  $\{x, a, b\} \subset \mathbb{R}$ .

Оскільки перша похідна функції  $f'(x) = \frac{a}{ax+b}$ , то згідно із попереднім прикладом,

$$(\ln(ax+b))^{(n)} = \frac{(n-1)! \cdot (-1)^{n-1} a^n}{(ax+b)^n}.$$

**Приклад 6.** Знайдемо похідну  $n$ -го порядку для функції  $f(x) = (ax+b)^\alpha$ ,  $\{x, a, b, \alpha\} \subset \mathbb{R}$ .

Знайдемо першу похідну функції:  $f'(x) = \alpha a \cdot (ax+b)^{\alpha-1}$ . Похідні другого та третього порядку:

$$f''(x) = \alpha(\alpha-1)a^2 \cdot (ax+b)^{\alpha-2}, \quad f'''(x) = \alpha(\alpha-1)(\alpha-2)a^3 \cdot (ax+b)^{\alpha-3}.$$

За індукцією маємо:

$$((ax+b)^\alpha)^{(n)} = \alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\dots(\alpha-n+1)a^n \cdot (ax+b)^{\alpha-n}, \quad \alpha \neq n, \quad n \in \mathbb{N},$$

та  $((ax+b)^\alpha)^{(n)} = n!$ , якщо  $\alpha = n \in \mathbb{N}$ .

**Приклад 7.** Знайдемо  $f^{(n)}(0)$  для функції  $f(x) = \arcsin x$ .

Знайдемо першу та другу похідні функції:  $f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ ,  $f''(x) = \frac{x}{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}}$ ,  $x \in (-1, 1)$ . Помножимо другу похідну на  $1-x^2$  та отримаємо рівняння:

$$(1 - x^2) \cdot f''(x) = \frac{x}{\sqrt{1 - x^2}} = x \cdot f'(x).$$

Застосуємо до нього правило Лейбніца, беручи похідну  $(n - 2)$ -го порядку від його лівої та правої частин:

$$\begin{aligned} (1 - x^2) \cdot f^{(n)}(x) + C_{n-2}^1 \cdot (-2x) \cdot f^{(n-1)}(x) - 2C_{n-2}^2 \cdot f^{(n-2)}(x) = \\ = x \cdot f^{(n-1)}(x) + C_{n-2}^1 \cdot f^{(n-2)}(x). \end{aligned}$$

Покладемо  $x = 0$ :  $f^{(n)}(0) = (n - 2)^2 \cdot f^{(n-2)}(0)$ . Оскільки  $f(0) = 0$  та  $f'(0) = 1$ , то  $f^{(2k)}(0) = 0$ ,  $k \in \mathbb{N}$  та  $f^{(2k+1)}(0) = ((2k - 1)!!)^2$ ,  $k \in \mathbb{N}$ .  $\perp$

**Приклад 8.** Знайдемо  $d^2 f$  для функції  $f = \sin u$ , де  $u = u(x)$  — довільна функція від незалежної змінної  $x$ , диференційовна достатню кількість разів.  $\perp$

Оскільки  $df = d(\sin u) = \cos u \, du$ , то

$$d^2 f = d(\cos u \, du) = -\sin u \, du^2 + \cos u \, d^2 u. \quad \perp$$

Для функції  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  знайдіть похідну  $n$ -го порядку на множині  $D_f$ :

**12.1**  $f(x) = x^2 e^{3x}$ ,  $n = 20$ ;

**12.2**  $f(x) = x \ln x$ ,  $n = 6$ ;

**12.3**  $f(x) = \frac{e^x}{x}$ ,  $n = 10$ ;

**12.4**  $f(x) = e^x \sin x$ ,  $n = 5$ ;

**12.5**  $f(x) = \ln(x^2 + x - 2)$ ;

**12.6**  $f(x) = \ln \frac{x^2 - 1}{x^2 - 4x + 4}$ ;

**12.7**  $f(x) = \frac{ax + b}{cx + d}$ ,  $\{a, b, c, d\} \subset \mathbb{R}$ ;

**12.8**  $f(x) = \frac{x^2}{1 - x}$ ;

**12.9**  $f(x) = \frac{1}{x^2 - 3x + 2}$ ;

**12.10**  $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1 - 2x}}$ ;

**12.11**  $f(x) = \sin^2 x$ ;

**12.12**  $f(x) = \cos^2 x$ .

Для функції  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  знайдіть  $f^{(n)}(0)$ , якщо:

**12.13**  $f(x) = \arctg x$ ;

**12.14**  $f(x) = (\arcsin x)^2$ .

Знайдіть перші два диференціала функції  $f$  через диференціали функцій  $u, v$  та  $w$ , вважаючи відомими перші два диференціали цих функцій, якщо:

**12.15**  $f = u^3$ ;

**12.16**  $f = e^{uv}$ ;

**12.17**  $f = u^v$ ;

**12.18**  $f = \frac{u}{v}$ ;

**12.19**  $f = uvw$ ;

**12.20**  $f = u \ln v$ .

## Тема 9. Формули Тейлора та Маклорена.

### Правила Лопіталя

**Теорема (локальна формула Тейлора).** Нехай  $f : S_\delta(x_0) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $(n-1)$  разів неперервно-диференційовна в цьому околі і має скінченну похідну  $n$ -го порядку в точці  $x_0$ . Тоді має місце формула:

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + o((x - x_0)^n). \quad (3)$$

Доданок  $R_{n+1}(x) = o((x - x_0)^n)$  називається **залишковим членом в формі Пеано**, а формула (3) називається **формулою Тейлора із залишковим членом в формі Пеано**.

З локальності цієї формули її називають асимптотичним представленням функції  $f$  в околі точки  $x_0$ . Вона дуже ефективна при знаходженні границь. Якщо  $x_0 = 0$ , то формулу (3) називають **формулою Маклорена**.

**Теорема (формула Тейлора).** Нехай  $f \in C^n(a, b)$  і має  $(n+1)$  похідну в кожній точці  $(a, b)$ , можливо за виключенням точки  $x_0 \in (a, b)$ . Тоді  $\forall x \in (a, b)$   $\exists \xi$  між точками  $x_0$  і  $x$  така, що

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + R_{n+1}(x), \quad (4)$$

де

$$R_{n+1}(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}, \quad \xi = x_0 + \theta(x - x_0), \quad \theta \in (0, 1). \quad (5)$$

Доданок  $R_{n+1}(x)$ , що визначається формулою (5), називається **залишковим членом у формі Лагранжа**, а сама формула (4) називається **формулою Тейлора із залишковим членом у формі Лагранжа**. За допомогою цих формул можна оцінити похибку наближення відповідних функцій многочленами.

Випишемо п'ять основних розкладів Маклорена, для кожного з яких візьмемо залишковий член у формі Пеано:

1.  $e^x = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + o(x^n);$
2.  $\ln(1+x) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \frac{x^k}{k} + o(x^n);$
3.  $\sin x = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \frac{x^{2k-1}}{(2k-1)!} + o(x^{2n-1});$
4.  $\cos x = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n});$
5.  $(1+x)^\alpha = 1 + \sum_{k=1}^n \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-k+1)}{k!} x^k + o(x^n).$

Ці формули використовуються при знаходженні границь функцій.



**Теорема (правила Лопіталя).** Нехай функції  $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  і  $g : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  диференційовні в кожній точці  $(a, b)$ ,  $b \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$  та  $g'(x) \neq 0 \forall x \in (a, b)$ . Якщо

$$\lim_{x \rightarrow b-0} f(x) = \lim_{x \rightarrow b-0} g(x) = 0 \quad \left( \lim_{x \rightarrow b-0} f(x) = \lim_{x \rightarrow b-0} g(x) = \infty \right)$$

та існує  $\lim_{x \rightarrow b-0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \alpha \in \overline{\mathbb{R}}$ , то існує  $\lim_{x \rightarrow b-0} \frac{f(x)}{g(x)} = \alpha$ .

Ці правила дають змогу ефективно розкривати невизначеності типу  $\frac{0}{0}$  та  $\frac{\infty}{\infty}$ .

## Практичне заняття 13

**Приклад 1.** Запишемо формулу Маклорена для функції  $f(x) = \operatorname{tg} x$  із залишковим членом у формі Пеано з точністю до  $x^5$ .  
┐

Враховуючи непарність функції  $\operatorname{tg} x$ , в її розкладі в околі нуля можуть бути лише непарні степені аргумента:  $\operatorname{tg} x = Ax + Bx^3 + Cx^5 + o(x^5)$ ,  $x \rightarrow 0$ . Знайдемо коефіцієнти  $A, B$  та  $C$ , використовуючи формули Маклорена для функцій  $\sin x$  та  $\cos x$ :

$$\operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x} = Ax + Bx^3 + Cx^5 + o(x^5);$$

$$x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + o(x^5) = (Ax + Bx^3 + Cx^5 + o(x^5)) \cdot \left( 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^5) \right);$$

$$x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + o(x^5) = Ax + \left( B - \frac{A}{2!} \right) x^3 + \left( C + \frac{A}{4!} - \frac{B}{2!} \right) x^5 + o(x^5);$$

Прирівнюючи коефіцієнти при однакових степенях  $x$ , отримуємо:  $A = 1$ ,  $B = \frac{1}{3}$ ,  $C = \frac{2}{15}$ . Таким чином,

$$\operatorname{tg} x = x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + o(x^5), \quad x \rightarrow 0.$$

**Приклад 2.** Запишемо формулу Маклорена для функції  $f(x) = e^{\sin x}$  із залишковим членом у формі Пеано з точністю до  $x^3$ .  
┐

Спочатку запишемо формулу Маклорена для функції  $g(x) = \sin x$  з точністю до  $x^3$ :  $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$ . Оскільки  $g(x) \rightarrow 0$  при  $x \rightarrow 0$ , то можемо записати формулу Маклорена для функції  $f(x) = e^{g(x)}$ :

$$\begin{aligned} e^{\sin x} &= 1 + \sin x + \frac{\sin^2 x}{2!} + \frac{\sin^3 x}{3!} + o(x^3) = \\ &= 1 + \left( x - \frac{x^3}{6} + o(x^3) \right) + \left( \frac{x^2}{2} + o(x^3) \right) + \left( \frac{x^3}{6} + o(x^3) \right) + o(x^3) = \\ &= 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2). \end{aligned}$$

**Приклад 3.** Запишемо формулу Маклорена для функції  $f(x) = \ln \cos x$  із залишковим членом у формі Пеано з точністю до  $x^6$ .  
┐

Представимо функцію  $f$  у такому вигляді:  $f(x) = \ln(1 + (\cos x - 1))$ . Можемо записати формулу Маклорена для функції  $g(x) = \cos x - 1$  із точністю до  $x^6$ :

$$\cos x - 1 = -\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \frac{x^6}{720} + o(x^6).$$

Оскільки  $g(x) \rightarrow 0$  при  $x \rightarrow 0$ , то можемо записати формулу Маклорена для функції  $f(x)$ :

$$\begin{aligned} \ln \cos x &= -\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \frac{x^6}{720} - \frac{1}{2} \left( \frac{x^4}{4} - \frac{x^6}{24} + o(x^6) \right) + \frac{1}{3} \left( -\frac{x^6}{8} + o(x^6) \right) + o(x^6) = \\ &= -\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{12} - \frac{x^6}{45} + o(x^6). \end{aligned}$$

┐

**Приклад 4.** Запишемо формулу Маклорена для функції  $f(x) = (\cos x)^{\sin x}$  із залишковим членом у формі Пеано з точністю до  $x^5$ .  
┐

Можемо використати формули Маклорена функцій  $\sin x$  та  $\cos x$ , представляючи функцію  $f$  у такому вигляді:

$$\begin{aligned} (\cos x)^{\sin x} &= e^{(\sin x) \cdot \ln \cos x} = \\ &= \exp \left\{ \left( x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^5) \right) \cdot \ln \left( 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^5) \right) \right\} = \\ &= \exp \left\{ \left( x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^5) \right) \cdot \left( -\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \frac{1}{2} \cdot \frac{x^4}{4} + o(x^4) \right) \right\} = \\ &= e^{-\frac{x^3}{2} + 0x^5 + o(x^5)} = 1 - \frac{x^3}{2} + o(x^5) = 1 - \frac{x^3}{2} + o(x^3), \quad x \rightarrow 0. \end{aligned}$$

┐

**Приклад 5.** Запишемо формулу Маклорена для неявно заданої функції  $x^4 + y^4 + \sin xy - 1 = 0$  з точністю до  $x^2$ .  
┐

Згідно із формулою Маклорена із залишковим членом у формі Пеано,  $f(x) = f(0) + f'(0) \cdot x + \frac{1}{2} f''(0) \cdot x^2 + o(x^2)$  при  $x \rightarrow 0$ .

Продиференціюємо задану функцію  $y = y(x)$  враховуючи, що  $y(0) = 1$ :

$$4x^3 + 4y^3 \cdot y' + \cos xy \cdot (y + xy') = 0.$$

Звідси маємо, що  $y'(0) = -\frac{1}{4}$ . Другу похідну знайдемо, диференціюючи отримане рівняння із першою похідною  $y'$ :

$$12x^2 + 12y^2 \cdot (y')^2 + 4y^3 \cdot y'' + \cos xy \cdot (y' + y' + xy'') - \sin xy \cdot (y + xy')^2 = 0.$$

Маємо, що  $y''(0) = -\frac{1}{16}$ . Отже,  $f(x) = 1 - \frac{1}{4}x - \frac{1}{32}x^2 + o(x^2)$ .  
┐

**Приклад 6.** Знайдемо границю  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left( \frac{4x}{\operatorname{ctg} x} - \frac{2\pi}{\cos x} \right)$ .

┐

Оскільки

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left( \frac{4x}{\operatorname{ctg} x} - \frac{2\pi}{\cos x} \right) = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left( \frac{4x \sin x}{\cos x} - \frac{2\pi}{\cos x} \right) = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{4x \sin x - 2\pi}{\cos x},$$

то маємо невизначеність типу  $\frac{0}{0}$ . Знайдемо границю відношення похідних чисельника і знаменника:

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{(4x \sin x - 2\pi)'}{(\cos x)'} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{4 \sin x + 4x \cos x}{-\sin x} = -4.$$

Отже, за правилом Лопіталя:  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left( \frac{4x}{\operatorname{ctg} x} - \frac{2\pi}{\cos x} \right) = -4$ .

┘

Для функції  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  запишіть формулу Маклорена із залишковим членом у формі Пеано з точністю до  $x^n$ , якщо:

**13.1**  $f(x) = \sqrt[3]{1+x}$ ,  $n = 5$ ;

**13.2**  $f(x) = \ln(1-x)$ ,  $n = 5$ ;

**13.3**  $f(x) = \frac{1}{1+x}$ ,  $n = 5$ ;

**13.4**  $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x}}$ ,  $n = 5$ ;

**13.5**  $f(x) = \operatorname{ch} x$ ,  $n = 5$ ;

**13.6**  $f(x) = \operatorname{sh} x$ ,  $n = 5$ ;

**13.7**  $f(x) = \arcsin x$ ,  $n = 5$ ;

**13.8**  $f(x) = \operatorname{arctg} x$ ,  $n = 5$ ;

**13.9**  $f(x) = e^{2x-x^2}$ ,  $n = 5$ ;

**13.10**  $f(x) = \sin \sin x$ ,  $n = 5$ ;

**13.11**  $f(x) = \sqrt{1-2x+x^3} - \sqrt[3]{1-3x+x^2}$ ,  $n = 4$ ;

**13.12**  $f(x) = \sin \cos x$ ,  $n = 5$ ;

**13.13**  $f(x) = \ln(1+\cos x)$ ,  $n = 5$ ;

**13.14**  $f(x) = \sin e^x$ ,  $n = 5$ ;

**13.15**  $f(x) = e^{\cos(1+x)}$ ,  $n = 3$ ;

**13.16**  $f(x) = \ln(\ln(4-x))$ ,  $n = 3$ ;

**13.17**  $f(x) = \ln(1+e^x)$ ,  $n = 5$ .

Знайдіть границі, застосовуючи відповідні формули Маклорена:

**13.18**  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt[7]{x^7+x^6} - \sqrt[7]{x^7-x^6})$ ; **13.18**  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin x - x(1+x)}{3x^3}$ ;

**13.20**  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x} \right)$ ;

**13.21**  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left( \frac{1}{x} - \operatorname{ctg} x \right)$ ;

**13.22**  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{\operatorname{th} x} - \frac{1}{\operatorname{tg} x}}{x}$ ;

**13.23**  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos \sin x - \cos x}{2x^4}$ .

Знайдіть границі з використанням правил Лопіталя:

**13.24**  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\pi - 2 \operatorname{arctg} x}{e^{\frac{1}{x}} - 1}$ ;

**13.25**  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(e^x + 1) - 2(e^x - 1)}{x^3}$ ;

**13.26**  $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\cos x \cdot \ln(x-3)}{\ln(e^x - e^3)}$ ;

**13.27**  $\lim_{x \rightarrow 1} \left( \frac{1}{\ln x} - \frac{1}{x-1} \right)$ ;

**13.28**  $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}+0} \frac{1}{\cos \pi x \cdot \ln(1-2x)}$ ;

**13.29**  $\lim_{x \rightarrow 0+0} x^x$ .

## Тема 10. Основні теореми диференціального числення. Локальні екстремуми. Опуклі функції. Дослідження функцій за допомогою похідної

Наведемо теореми про функції, що мають похідну.

**Теорема (Ролля).** Нехай  $f \in C([a, b])$ , диференційовна в кожній точці  $(a, b)$ . Якщо  $f(a) = f(b)$ , то  $\exists \xi \in (a, b): f'(\xi) = 0$ .

**Теорема (Лагранжа).** Нехай функція  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  неперервна на  $[a, b]$  та диференційовна в кожній точці  $(a, b)$ . Тоді  $\exists \xi \in (a, b): \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(\xi)$ .

**Наслідок (двобічна оцінка приросту функції).** Нехай  $f \in C([a, b])$  і має скінчену похідну  $f'_\Pi$  в кожній точці  $[a, b]$ , за винятком, можливо, деякої зліченої її підмножини  $X$ . Тоді виконуються нерівності:  $m \leq \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq M$ , де  $m = \inf_{x \in [a, b] \setminus X} f'_\Pi(x)$ ,  $M = \sup_{x \in [a, b] \setminus X} f'_\Pi(x)$ .

**Теорема (Коші).** Нехай функції  $f$  і  $g$  неперервні на  $[a, b]$  та диференційовні на  $(a, b)$ . Тоді  $\exists \xi \in (a, b): (f(b) - f(a))g'(\xi) = (g(b) - g(a))f'(\xi)$ .

Наступні твердження використовуються для дослідження монотонності функцій та доведення деяких нерівностей.

Функція  $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  **зростає (спадає) в точці**  $x_0 \in (a, b)$ , якщо  $\exists S_\delta(x_0) \subset (a, b): \forall x \in (x_0 - \delta, x_0) f(x) < f(x_0) (f(x) > f(x_0)) \wedge \forall x \in (x_0, x_0 + \delta) f(x) > f(x_0) (f(x) < f(x_0))$ .

**Теорема (достатня умова зростання функції в точці).** Для того, щоб функція  $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ , яка диференційовна в точці  $x_0 \in (a, b)$ , зростала (спадала) в цій точці, достатньо, щоб  $f'(x_0) > 0$  ( $f'(x_0) < 0$ ).

Ця умова використовується для доведення наступного твердження.

**Доведення нерівностей.** Нехай функції  $\varphi, \psi: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  задовольняють таким умовам:

1.  $\exists \varphi^{(n)}(x)$  та  $\exists \psi^{(n)}(x)$  для всіх  $x > x_0$ , де  $x_0 \in (a, b)$ ;
2.  $\exists \varphi^{(k)}(x_0) = \psi^{(k)}(x_0)$ ,  $k = \overline{0, n-1}$ ;
3.  $\varphi^{(n)}(x) > \psi^{(n)}(x)$  для всіх  $x > x_0$ .

Тоді  $\forall x > x_0: \varphi(x) > \psi(x)$ .

Якщо ж функції  $\varphi, \psi: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  задовольняють умовам:

1.  $\exists \varphi^{(n)}(x)$  та  $\exists \psi^{(n)}(x)$  для всіх  $x < x_0$ , де  $x_0 \in (a, b)$ ;
2.  $\exists \varphi^{(k)}(x_0) = \psi^{(k)}(x_0)$ ,  $k = \overline{0, n-1}$ ;
3.  $\varphi^{(n)}(x) > \psi^{(n)}(x)$  для всіх  $x < x_0$ ,

то  $\forall x < x_0: \varphi(x) > \psi(x)$  ( $\varphi(x) < \psi(x)$ ) при парному (непарному)  $n$ .

Розглянемо необхідні та достатні умови екстремумів функцій.

Функція  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  має в точці  $x_0 \in D_f$  **локальний максимум (мінімум)**, якщо  $\exists S_\varepsilon(x_0): \forall x \in D_f \cap S_\varepsilon(x_0) f(x) \leq f(x_0) (f(x) \geq f(x_0))$ . Якщо при цьому

$\forall x \neq x_0$  виконується нерівність  $f(x) < f(x_0)$  ( $f(x) > f(x_0)$ ), то *максимум* (*мінімум*) називається **строгим**, інакше — **нестрогим**. Локальні максимуми та мінімуми називаються **екстремумами** функції.

**Теорема (Ферма).** Нехай  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  і  $x_0$  — внутрішня точка множини  $D_f$ . Якщо функція  $f$  набуває в точці  $x_0$  найбільшого або найменшого значення і диференційовна в ній, то  $f'(x_0) = 0$ .

**Теорема (перша достатня умова екстремуму).** Нехай  $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  диференційовна на  $S_\delta(x_0) \subset (a, b)$ , можливо за виключенням самої точки  $x_0$ . Якщо  $f'$  при переході через  $x_0$  **змінює знак**, тобто на проміжках  $(x_0 - \delta, x_0)$  та  $(x_0, x_0 + \delta)$  функція має значення різних знаків, то в цій точці  $f$  має локальний екстремум. Якщо знак змінюється з “+” на “-”, то  $x_0$  — точка максимуму, інакше — точка мінімуму.

**Теорема (друга достатня умова екстремуму).** Нехай  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $x_0$  — внутрішня точка множини  $D_f$ . Якщо функція  $f$  має  $n$  похідних у точці  $x_0$  і  $f^{(k)}(x_0) = 0$ ,  $k = \overline{1, n-1}$ ,  $f^{(n)}(x_0) \neq 0$ , то при парному  $n$  функція  $f$  має локальний екстремум (максимум, якщо  $f^{(n)}(x_0) \leq 0$ ; мінімум, якщо  $f^{(n)}(x_0) \geq 0$ ), інакше екстремум відсутній (при непарному  $n$ ).

**Абсолютним**, або **глобальним максимумом** (**мінімумом**) функції  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  називається найбільше (найменше) значення  $f(x)$  при  $x \in D_f$ , якщо воно існує.

За теоремою Вейерштрасса для  $f \in C([a, b])$  існують абсолютний максимум та мінімум, що досягаються або в точках локальних екстремумів, або на краях відрізка  $[a, b]$ . Для цього потрібно знайти множину всіх **стаціонарних** точок ( $f'(x) = 0$ ) та множину **критичних** точок ( $f'(x)$  — не існує), додати до цих множин кінці відрізка  $[a, b]$  і серед цих значень шукати глобальні екстремуми.

Для дослідження опуклості функцій наведемо кілька допоміжних означень та тверджень.

Нехай  $P_1(x_1, y_1)$ ,  $P_2(x_2, y_2)$  — дві точки на декартовій площині. **Відрізком**  $P_1P_2$  називається множина точок

$$\{P(x, y) \mid x = tx_1 + (1-t)x_2 \wedge y = ty_1 + (1-t)y_2, t \in [0, 1]\}.$$

Множина  $M \subset \mathbb{R}^2$  називається **опуклою**, якщо  $\forall P_1, P_2 \in M \Rightarrow P_1P_2 \subset M$ .

Нехай  $\Gamma = \{(x, f(x)) \mid x \in D_f\}$  — графік функції  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ . **Надграфіком** (**підграфіком**) цієї функції називається множина  $\{(x, y) \mid x \in D_f \wedge y \geq f(x)\}$  ( $\{(x, y) \mid x \in D_f \wedge y \leq f(x)\}$ ). Будемо казати, що точка  $(x, y)$  **лежить вище** (**нижче**) графіка, якщо вона належить надграфіку (підграфіку) цієї функції.

Функція  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  називається **опуклою** (**угнутою**), якщо її надграфік (підграфік) є опуклою множиною.

**Теорема (критерій опуклості функції).** Для того, щоб функція  $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  була опуклою, необхідно і достатньо, щоб  $\forall x \in (a, b)$  існувала похідна  $f'(x)$  і щоб ця похідна була неспадною на  $(a, b)$  функцією.

**Наслідок (критерій опуклості двічі диференційовної функції).** Якщо

функція  $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  має другу похідну  $\forall x \in (a, b)$ , то для опуклості  $f$  необхідно і достатньо, щоб  $\forall x \in (a, b) : f''(x) \geq 0$ .

**Теорема (еквівалентний критерій опуклості функції).** Функція  $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  опукла тоді і тільки тоді, коли  $\forall \lambda \in [0, 1] \forall x_1, x_2 \in (a, b)$  виконується нерівність:

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2).$$

Відповідно функція  $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  є угнутою, якщо функція  $(-f)$  — опукла, тобто  $\forall \lambda \in [0, 1] \forall x_1, x_2 \in (a, b)$  виконується нерівність:

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \geq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2).$$

**Теорема (нерівність Ієнсена).** Нехай функція  $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  — опукла. Тоді  $\forall (n \geq 1, x_k \in (a, b), \lambda_k \geq 0, k = \overline{1, n}, \sum_{k=1}^n \lambda_k = 1)$  виконується **нерівність Ієнсена**:

$$f\left(\sum_{k=1}^n \lambda_k x_k\right) \leq \sum_{k=1}^n \lambda_k f(x_k).$$

Якщо функція  $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  диференційовна в точці  $x_0 \in (a, b)$  і при переході через точку  $M_0(x_0, f(x_0))$  змінює характер опуклості, то  $M_0$  називається **точкою перегину графіка** функції  $f$ .

**Теорема (необхідна умова перегину).** Нехай функція  $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  диференційовна на  $(a, b)$ , і в точці  $x_0 \in (a, b)$  існує  $f''(x_0)$ . Якщо  $M_0(x_0, f(x_0))$  — точка перегину графіка  $\Gamma(f)$ , то  $f''(x_0) = 0$ .

**Теорема (достатня умова перегину).** Нехай функція  $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  має  $n$  похідних у точці  $x_0 \in (a, b)$  і  $f^{(k)}(x_0) = 0, k = \overline{2, n-1}, f^{(n)}(x_0) \neq 0$ . Якщо  $n$  — непарне число, то  $M_0(x_0, f(x_0))$  — точка перегину  $\Gamma(f)$ , якщо  $n$  — парне, то  $M_0$  не є точкою перегину.

## Побудова графіків функцій

Нехай функція  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  задана параметрично за допомогою рівнянь  $x = \varphi(t), y = \psi(t), t \in D_\varphi = D_\psi = T$ , де  $T$  — скінченний чи нескінченний проміжок числової прямої. У цьому випадку графіком функції  $f$  є множина точок  $\Gamma(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = \varphi(t), y = \psi(t), t \in T\}$ .

На площині  $\mathbb{R}^2$  довільна пряма  $l$  задається рівнянням  $Ax + By + C = 0$ . Тоді, як відомо з аналітичної геометрії, відстань від точки  $(\varphi(t), \psi(t)) \in \Gamma(f) (t \in T)$  до прямої  $l$  обчислюється за формулою:

$$d(t) = \frac{|A\varphi(t) + B\psi(t) + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}.$$

Пряма  $l$ , задана рівнянням  $Ax + By + C = 0$ , називається **асимптотою графіка**  $\Gamma(f)$  при  $t \rightarrow t_0$  (або  $t \rightarrow t_0 + 0, t \rightarrow t_0 - 0, t_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ ), якщо виконуються дві умови: **1)**  $d(t) \rightarrow 0$  при  $t \rightarrow t_0$ ; **2)**  $\varphi^2(t) + \psi^2(t) \rightarrow +\infty$  при  $t \rightarrow t_0$ .

Розглянемо можливі випадки.

1)  $\lim_{t \rightarrow t_0} \varphi(t) = a \in \mathbb{R} \wedge \lim_{t \rightarrow t_0} \psi(t) = \infty \Rightarrow d(t) \rightarrow 0 \Leftrightarrow A\varphi(t) + B\psi(t) + C \rightarrow 0$   
 $\Leftrightarrow B = 0, a = -\frac{C}{A}$ . У такому разі пряма  $x = a$  називається **вертикальною асимптотою графіка**  $\Gamma(f)$ .

2)  $\lim_{t \rightarrow t_0} \psi(t) = b \in \mathbb{R} \wedge \lim_{t \rightarrow t_0} \varphi(t) = \infty \Rightarrow d(t) \rightarrow 0 \Leftrightarrow A\varphi(t) + B\psi(t) + C \rightarrow 0$   
 $\Leftrightarrow A = 0, b = -\frac{C}{B}$ . У такому разі пряма  $y = a$  називається **горизонтальною асимптотою графіка**  $\Gamma(f)$ .

3)  $\lim_{t \rightarrow t_0} \varphi(t) = \lim_{t \rightarrow t_0} \psi(t) = \infty \Rightarrow d(t) \rightarrow 0 \Leftrightarrow A\varphi(t) + B\psi(t) + C \rightarrow 0 \Leftrightarrow$   
 $\varphi(t) \left( \frac{A}{B} + \frac{\psi(t)}{\varphi(t)} \right) \rightarrow -\frac{C}{B} \Leftrightarrow \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{\psi(t)}{\varphi(t)} = -\frac{A}{B} = k \wedge \lim_{t \rightarrow t_0} (\psi(t) - k\varphi(t)) = -\frac{C}{B} = b$ .  
Рівняння асимптоти набуває вигляду  $y = kx + b$  — така пряма називається **похилою асимптотою графіка**  $\Gamma(f)$ .

Явно задана функція  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  є частинним випадком параметрично заданої функції при  $\varphi(t) = t$ , її графіком є множина  $\Gamma(f) = \{(x, y) \mid y = f(x), x \in D_f\}$ . Три типи *асимптот* визначаються умовами:

1) пряма  $x = x_0$  є **вертикальною асимптотою графіка**  $\Gamma(f)$  при  $x \rightarrow x_0 - 0$  ( $x \rightarrow x_0 + 0$ ), якщо  $f(x_0 - 0) = \infty$  ( $f(x_0 + 0) = \infty$ );

2) пряма  $y = b$  є **горизонтальною асимптотою графіка**  $\Gamma(f)$  при  $x \rightarrow +\infty$  ( $x \rightarrow -\infty$ ), якщо  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b$  ( $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b$ );

3) пряма  $y = kx + b$  ( $k \neq 0$ ) є **похилою асимптотою графіка**  $\Gamma(f)$  при  $x \rightarrow +\infty$  ( $x \rightarrow -\infty$ ), якщо  $\lim_{x \rightarrow +\infty(-\infty)} \frac{f(x)}{x} = k \wedge \lim_{x \rightarrow +\infty(-\infty)} (f(x) - kx) = b \in \mathbb{R}$ .

### План дослідження функції із побудовою її графіка:

1. визначити  $D_f$ ,  $E_f$  та можливі точки розриву;
2. перевірити на парність/непарність, періодичність;
3. визначити точки перетину графіка із координатними осями (якщо такі є);
4. визначити асимптоти графіка, якщо такі існують;
5. знайти проміжки монотонності функції та дослідити її на екстремуми;
6. визначити проміжки опуклості (угнутості) графіка  $\Gamma(f)$  та знайти точки перегину, якщо такі існують;
7. побудувати графік  $\Gamma(f)$ .

## Практичне заняття 14

**Приклад 1.** Доведемо нерівність:  $|\operatorname{ctg} x - \operatorname{ctg} y| > \frac{4}{3}(y - x)$ , де  $\frac{\pi}{6} < x < y < \frac{\pi}{3}$ .  
 $\Gamma$

Розглянемо функцію  $f(t) = \operatorname{ctg} t$ ,  $t \in [y, x]$ , яка задовольняє умови теореми Лагранжа. Згідно із цією теоремою, існує таке число  $\xi \in (y, x)$ , що:

$$\operatorname{ctg} x - \operatorname{ctg} y = -\frac{1}{\sin^2 \xi} \cdot (x - y) = \frac{1}{\sin^2 \xi} (y - x).$$

Оскільки  $\operatorname{ctg} x > \operatorname{ctg} y$  при  $\frac{\pi}{6} < x < y < \frac{\pi}{3}$ , то ліва частина останньої рівності є невід'ємною. Також за даних обмежень на числа  $x$  та  $y$  маємо, що

$$\frac{1}{4} < \sin^2 \xi < \frac{3}{4} \Rightarrow \frac{1}{\sin^2 \xi} > \frac{4}{3},$$

звідки і отримуємо шукану нерівність.  $\square$

**Приклад 2.** Доведемо нерівність:  $\operatorname{ch} x > 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}$ ,  $x > 0$ .

Розглянемо функції  $\varphi(t) = \operatorname{ch} t$ ,  $t > 0$ , та  $\psi(t) = 1 + \frac{t^2}{2} + \frac{t^4}{24}$ ,  $t > 0$ . Очевидно, що  $\varphi(0) = \psi(0) = 1$ . Знайдемо похідні цих функцій до того порядку, поки не отримаємо нерівність вигляду  $\varphi^{(n)}(t) > \psi^{(n)}(t)$ ,  $t > 0$ . Оскільки

$$\varphi'(t) = \operatorname{sh} t, \quad \psi'(t) = t + \frac{t^3}{6}, \quad \varphi'(0) = \psi'(0) = 0;$$

$$\varphi''(t) = \operatorname{ch} t, \quad \psi''(t) = 1 + \frac{t^2}{2}, \quad \varphi''(0) = \psi''(0) = 1;$$

$$\varphi'''(t) = \operatorname{sh} t, \quad \psi'''(t) = t, \quad \varphi'''(0) = \psi'''(0) = 0;$$

$$\varphi^{(4)}(t) = \operatorname{ch} t, \quad \psi^{(4)}(t) = 1, \quad \operatorname{ch} t > 1 \text{ при } t > 0,$$

то маємо, що  $\varphi(t) > \psi(t) \forall t > 0$ .  $\square$

**Приклад 3.** Проведемо дослідження функції  $f(x) = \frac{x^3}{2(x+1)^2}$  та побудуємо її графік.

1. Область визначення функції  $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ , а у точці  $x = -1$  функція  $f$  має розрив II роду:

$$\lim_{x \rightarrow -1-0} \frac{x^3}{2(x+1)^2} = \lim_{x \rightarrow -1+0} \frac{x^3}{2(x+1)^2} = \frac{-1}{2 \cdot 0} = -\infty.$$

2. Функція загального вигляду, бо  $f(-x) \neq \pm f(x)$ , та неперіодична.

3. Функція має один нуль у точці  $M(0; 0)$  — єдиній точці перетину графіка  $\Gamma(f)$  із координатними осями.

4. Оскільки у точці  $x = -1$  функція  $f$  має розрив II роду типу полюс, то пряма  $x = -1$  є вертикальною асимптотою графіка  $\Gamma(f)$ . Горизонтальних асимптот немає тому, що

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3}{2(x+1)^2} = -\infty; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{2(x+1)^2} = +\infty.$$

З'ясуємо, чи є похила асимптота:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3}{2x(x+1)^2} = \frac{1}{2} = k \in \mathbb{R};$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - kx) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{x^3}{2(x+1)^2} - \frac{x}{2} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-2x^2 - x}{2(x+1)^2} = -1.$$



Отже, на графіку  $\Gamma(f)$  є похила асимптота, що задається рівнянням  $y = \frac{x}{2} - 1$ .

5. Знайдемо похідну функції  $f: f'(x) = \frac{x^2(x+3)}{2(x+1)^3}$ ,  $x \in D_f$ . Маємо дві стаціонарні точки  $x = 0$  та  $x = -3$ , тобто  $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x \in \{-3, 0\}$ . Знайдемо проміжки монотонності функції  $f$ .

У точці  $x = -3$  виконується перша достатня умова екстремуму та визначений локальний максимум функції:  $f(-3) = f_{\max} = -\frac{27}{8}$ , а у точці  $x = 0$  екстремума немає.


$x$		-3		-1		0	
$f'(x)$	+	0	-		+	0	+
$f(x)$	$\nearrow$	$-27/8$	$\searrow$		$\nearrow$	0	$\nearrow$

6. Знайдемо другу похідну:  $f''(x) = \frac{3x}{(x+1)^4}$ ,  $x \in D_f$ , і отримаємо таблицю проміжків опуклості/угнутості графіка  $\Gamma(f)$ .

$x$		-1		0	
$f''(x)$	-		-	0	+
$f(x)$	$\cap$		$\cap$	0	$\cup$

Оскільки  $f''(x) = 0$  тоді і тільки тоді, коли  $x = 0$ , та друга похідна змінює знак при переході через точку  $x = 0$ , то графік  $\Gamma(f)$  має перегин у цій точці.

7. Тепер можемо побудувати графік  $\Gamma(f)$ , враховуючи результати проведеного дослідження функції  $f$ .



┘

Доведіть нерівності:

**14.1**  $|\sin x - \sin y| \leq |x - y|;$

**14.2**  $|\arctg x - \arctg y| \leq |x - y|;$

**14.3**  $\sin x \leq \sin y + (x - y) \cos y, \{x, y\} \subset [0, \pi];$

**14.4**  $\frac{x - y}{\cos^2 y} \leq \tg x - \tg y \leq \frac{x - y}{\cos^2 x},$  якщо  $0 < y \leq x < \frac{\pi}{2};$

**14.5**  $(x - y)e^y < e^x - e^y < (x - y)e^x,$  якщо  $y < x;$

**14.6**  $(x - y) \cdot 2^{y-1} < 2^x - 2^y < (x - y) \cdot 2^x,$  якщо  $y < x;$

**14.7**  $py^{p-1}(x - y) \leq x^p - y^p \leq px^{p-1}(x - y),$  якщо  $0 < y < x, p > 1;$

**14.8**  $e^x > ex,$  якщо  $x > 1;$

**14.9**  $e^{|x|} > 1 + x + \frac{x^2}{2}, x \neq 0;$

**14.10**  $x - \frac{x^2}{2} < \ln(1 + x) < x, x > 0;$  **14.11**  $\tg x > x + \frac{x^3}{3}, x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right);$

**14.12**  $\sh x > x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120}, x > 0;$  **14.13**  $e^x < 1 + x + \frac{x^2 e^x}{2}, x > 0;$

$$14.14 \quad x - \frac{x^3}{6} < \sin x < x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120}, \quad x > 0;$$

$$14.15 \quad x^3 + 3x + 6x \ln x + 2 > 6x^2, \quad x > 1;$$

$$14.16 \quad x^4 + 8x + 12x^2 \ln x > 8x^3 + 1, \quad x > 1;$$

$$14.17 \quad \frac{e^x + e^y}{2} \geq e^{\frac{x+y}{2}};$$

$$14.18 \quad x \ln x + y \ln y \geq (x+y) \ln \frac{x+y}{2}, \quad x > 0, y > 0;$$

$$14.19 \quad (x+y) \operatorname{arctg} \frac{2}{x+y} \leq x \operatorname{arctg} \frac{1}{x} + y \operatorname{arctg} \frac{1}{y}, \quad x > 0, y > 0;$$

$$14.20 \quad \sqrt{\sin \frac{x+y}{2}} \geq \frac{1}{2} \left( \sqrt{\sin x} + \sqrt{\sin y} \right), \quad \{x, y\} \subset [0, \pi];$$

$$14.21 \quad \cos \left( \frac{x+y}{2} \right)^2 \geq \frac{1}{2} (\cos x^2 + \cos y^2), \quad \{x, y\} \subset \left[ 0, \sqrt{\frac{\pi}{2}} \right];$$

$$14.22 \quad \frac{x^n + y^n + z^n}{3} > \left( \frac{x+y+z}{3} \right)^n, \quad x > 0, y > 0, z > 0, n > 1, \\ x \neq y, y \neq z, z \neq x;$$

$$14.23 \quad \left( \frac{x+2y+3z}{6} \right)^4 \leq \frac{x^4 + 2y^4 + 3z^4}{6}.$$

Дослідіть функцію  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  та побудуйте її графік, якщо:

$$14.24 \quad f(x) = x^2 + \frac{1}{x};$$

$$14.25 \quad f(x) = x^3 - 5x^2 + 6x;$$

$$14.26 \quad f(x) = \frac{x^2(x-1)}{(x+1)^2};$$

$$14.27 \quad f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + x}};$$

$$14.28 \quad f(x) = \ln(x^2 - 1);$$

$$14.29 \quad f(x) = \ln \frac{x+1}{x+2};$$

$$14.30 \quad f(x) = e^x + e^{-x};$$

$$14.31 \quad f(x) = x \ln |x|;$$

$$14.32 \quad f(x) = x + \operatorname{arctg} x;$$

$$14.33 \quad f(x) = x^x.$$

Дослідіть функцію  $x \mapsto y(x)$ , задану параметрично чи неявно, та побудуйте її графік, якщо:

$$14.34 \quad x = 2t - t^2, \quad y = 3t - t^3;$$

$$14.35 \quad x^3 + y^3 = 3axy;$$

$$14.36 \quad x = t + e^{-t}, \quad y = 2t + e^{-2t};$$

$$14.37 \quad x = te^t, \quad y = te^{-t};$$

$$14.38 \quad x = \frac{t^2}{t-1}, \quad y = \frac{t}{t^2-1};$$

$$14.39 \quad x = \frac{t^2}{t+1}, \quad y = \frac{1}{t(t+1)};$$

$$14.40 \quad x^2 y^2 = x^3 - y^3;$$

$$14.41 \quad (x^2 + y^2)^3 = 4a^2 x^2 y^2.$$

## Відповіді та вказівки

**3.1 – 3.2** не функціональне; **3.3** 1)  $D_f = \mathbb{R}$ ,  $E_f = [-1, 1]$ ; 2)  $D_f = \{0, \pi\}$ ,  $E_f = \{-1, 1\}$ ; 3)  $D_f = [0, \frac{\pi}{2}]$ ,  $E_f = [0, 1]$ ; **3.4** 1)  $D_f = \mathbb{R}$ ,  $E_f = \mathbb{Z}$ ; 2)  $D_f = E_f = \{1, 2, \dots, n\}$ ; 3)  $D_f = [1, +\infty)$ ,  $E_f = \mathbb{N}$ ; **3.5** 1)  $D_f = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$ ,  $E_f = (-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$ ; 2)  $D_f = [-1, 0) \cup (0, 1]$ ,  $E_f = (-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$ ; 3)  $E_f = \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ ,  $D_f = \left\{ \left( \frac{(-1)^m}{\pi} \arcsin \frac{1}{k} + m \mid k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}, m \in \mathbb{Z} \right) \right\}$ ; **3.6** 1)  $f(\mathbb{R}) = (-\infty, 4]$ ; 2)  $f([-1, 1]) = [3, 4]$ ; 3)  $f^{-1}(\mathbb{R}^-) = (-\infty, -2] \cup [2, +\infty)$ ; 4)  $f^{-1}([0, 2]) = [-2, -\sqrt{2}] \cup [\sqrt{2}, 2]$ ; **3.7**  $\Gamma_1 = \Gamma_2 = \{2k - 1 \mid k \in \mathbb{Z}\}$ ; **3.8**  $\Gamma_1 = [0, 3]$ ,  $\Gamma_2 = [0, 4]$ ; **3.9** 1)  $g_1(x) = 1$ ,  $x \in \mathbb{Q}$ ; 2)  $g_2(x) = 1$ ,  $x \in \mathbb{Q} \cap [0, 1]$  та  $g_2(x) = 0$ ,  $x \in [0, 1] \setminus \mathbb{Q}$ ; 3)  $g_3(x) = 0$ ,  $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ ; 4)  $g_4(x) = 1$ ,  $x \in \mathbb{N}$ ; **3.10** 1)  $x_{\min} = \inf X = -\frac{1}{2}$ ,  $x_{\max} = \sup X = \frac{1}{2}$ ,  $\underline{x} = [-1, -\frac{1}{2}]$ ,  $\bar{x} = [\frac{1}{2}, 1]$ ; 2)  $x_{\min}$  та  $x_{\max}$  не існують,  $\underline{x} = [-1, 0]$ ,  $\inf X = 0$ ,  $\bar{x} = \sup X = 1$ ; 3)  $x_{\min}$  не існує,  $\inf X = -\frac{1}{2}$ ,  $x_{\max} = \sup X = \frac{1}{2}$ ,  $\underline{x} = [-1, -\frac{1}{2}]$ ,  $\bar{x} = [\frac{1}{2}, 1]$ ; **3.11** 1)  $x_{\min}$  не існує,  $\inf X = 0$ ,  $x_{\max} = \sup X = \frac{3}{4}$ ,  $\underline{x} = \mathbb{R}^-$ ,  $\bar{x} = [\frac{3}{4}, +\infty)$ ; 2)  $x_{\min} = \inf X = -\frac{1}{2}$ ,  $x_{\max} = \sup X = \frac{1}{2}$ ,  $\underline{x} = (-\infty, -\frac{1}{2}]$ ,  $\bar{x} = [\frac{1}{2}, +\infty)$ .

**4.1** 0; **4.2**  $\frac{2}{5}$ ; **4.3** 0; **4.4** 0; **4.5** 0; **4.6**  $\infty$ ; **4.7** 0; **4.8** 0; **4.11**  $x_{\min} = x_{\max} = 0$ ; **4.12**  $x_{\min} = -1$ ,  $x_{\max} = 1$ ; **4.13** 1; **4.14**  $\frac{1}{12}$ ; **4.15**  $\frac{5}{3}$ ; **4.16** 1; **4.17**  $\frac{1}{2}$ ; **4.18**  $\frac{\sin 2}{2}$ ; **4.19** 0, якщо  $m < l$ ;  $\frac{a_m}{b_m}$ , якщо  $m = l$ ;  $\infty$ , якщо  $m > l$ ; **4.20**  $\frac{1}{2}$ ; **4.21**  $\frac{1}{3}$ ; **4.22**  $\frac{1}{3}$ ; **4.23**  $\infty$ ; **4.24**  $-\frac{1}{2}$ ; **4.25**  $\frac{1}{4}$ ; **4.26** 1; **4.27** 0; **4.34**  $\frac{1}{3}$ ; **4.35**  $\infty$ .

**5.1 – 5.2** послідовність збіжна; **5.3 – 5.4** розбіжна; **5.5** збіжна; **5.13**  $\ln \sqrt{2}$ ; **5.14** 1; **5.15**  $\ln 2$ ; **5.16**  $\frac{1}{3}$ ; **5.17**  $\frac{2}{3}$ ; **5.18** 0; **5.19** 2; **5.20**  $\frac{2}{3}$ .

**6.1**  $\inf_{n \in \mathbb{N}} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ ,  $\sup_{n \in \mathbb{N}} x_n = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = 2$ ; **6.2**  $\inf_{n \in \mathbb{N}} x_n = -1$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$  та  $\sup_{n \in \mathbb{N}} x_n = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$ ; **6.3**  $\inf_{n \in \mathbb{N}} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty$ ,  $\sup_{n \in \mathbb{N}} x_n = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$ ; **6.4**  $\inf_{n \in \mathbb{N}} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -1$ ,  $\sup_{n \in \mathbb{N}} x_n = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$ ; **6.5**  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{1+\sqrt{21}}{2}$ ; **6.6** послідовність розбіжна; **6.7**  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$ ; **6.8**  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 2$ .

**7.39**  $2x + 2x^2 + 3x^3 + o(x^3)$ ; **7.40**  $-1 - 2x^2 + 3x^3 - x^4 + o(x^4)$ ; **7.41**  $5x + 4x^2 + 2x^3 + o(x^3)$ ; **7.42**  $-4x + 3x^2 + o(x^2)$ ; **7.43**  $-x + x^2 + 3x^3 - 7x^4 + o(x^4)$ ; **7.44**  $\frac{1}{2}$ ; **7.45**  $-\frac{5}{2}$ ; **7.46** 0; **7.47 – 7.49** знайти границю неможливо; **7.50**  $-5$ ; **7.51** 0.

**8.1**  $\frac{1}{4}$ ; **8.2** 6; **8.3**  $\frac{m}{k}$ ; **8.4**  $\frac{km(k-m)}{2}$ ,  $m, k \in \mathbb{N}$ ; **8.5** 1; **8.6**  $\frac{1}{4}$ ; **8.7**  $\frac{1}{\sqrt{2a}}$ ; **8.8**  $-\frac{1}{16}$ ; **8.9**  $\frac{2}{3}$ ; **8.10**  $\sqrt{\frac{3}{2}}$ ; **8.11**  $e^4$ ; **8.12** 0; **8.13**  $\frac{1}{e}$ ; **8.14**  $\frac{1}{\sqrt{e}}$ ; **8.15** 0; **8.16** 1; **8.17** 1; **8.18**  $-1$ ; **8.19**  $\frac{a}{b}$ ; **8.20**  $\frac{1}{6}$ ; **8.21**  $\operatorname{sh} a$ ; **8.22**  $\operatorname{ch} a$ ; **8.23**  $\frac{1}{\operatorname{ch}^2 a}$ ; **8.24**  $e^a$ ; **8.25**  $\frac{1}{a}$ ; **8.26** 1; **8.27**  $\frac{1}{4}$ ; **8.28** 0; **8.29** 2; **8.30**  $-\frac{1}{2}$ ; **8.31**  $4(\ln 2 - 1)$ ; **8.32**  $-\frac{805}{864}$ ; **8.33**  $-3e$ ; **8.34**  $-\frac{\pi^2}{2}$ ; **8.35**  $(\frac{a}{b})^2$ ; **8.36**  $-2$ ; **8.37**  $\frac{5}{3}$ ; **8.38** 1)  $f(1-0) = 0$ ,  $f(1+0) = 1$ ; 2)  $f(\sqrt{3}-0) = f(\sqrt{3}+0) = 1$ ; 3)  $f(0,999-0) = f(0,999+0) = 0$ ; **8.39** 1)  $f(0-0) = 1$ ,  $f(0+0) = 0$ ; 2)  $f(\sqrt{2}-0) = f(\sqrt{2}+0) = \sqrt{2}-1$ ; 3)  $f(\frac{1}{3}-0) = f(\frac{1}{3}+0) = 0$ ; **8.40** 1)  $f(0-0) = -1$ ,  $f(0+0) = 1$ ; 2)  $f(e-0) = f(e+0) = 1$ ; **8.41** 1)  $f(0-0) = \frac{1}{e-1}$ ,  $f(0+0) = +\infty$ ; 2)  $f(\frac{1}{3}-0) = f(\frac{1}{3}+0) = \frac{1}{\sqrt[3]{e-1}}$ ; 3)

$f(-\frac{17}{8}-0) = f(\frac{17}{8}+0) = \frac{1}{e^{\frac{17}{8}-1}}$ ; **8.42** 1)  $f(0-0) = -1, f(0+0) = 1$ ; 2)  $f(2-0) = f(2+0) = \frac{\sin 2}{2}$ ; 3)  $f(\pi-0) = f(\pi+0) = 0$ ; **8.43** 1)  $f(-1-0) = f(-1+0) = 2 + \sqrt{2}$ ; 2)  $f(0-0) = +\infty, f(0+0) = -\infty$ ; 3)  $f(1-0) = 0, f(1+0) = 1$ ; **8.44** 1)  $f(0-0) = f(0+0) = 1$ ; 2)  $f(\frac{1}{2}-0) = 1, f(\frac{1}{2}+0) = -1$ ; 3)  $f(1-0) = f(1+0) = -1$ ; **8.45**  $f = O(g)$  та  $g = O(f)$ , тобто  $f, g$  — функції одного порядку; **8.46** непорівнянні; **8.47**  $g = O(f)$ ; **8.48**  $f \sim g$ ; **8.49**  $f = o(g)$ ; **8.50**  $f = o(g)$ ; **8.51**  $f \sim g$ ; **8.52** — **8.53** непорівнянні; **8.54**  $f \sim g$ ; **8.55**  $x$ ; **8.56**  $x^{\frac{1}{8}}$ ; **8.57**  $\frac{\pi}{2}$ ; **8.58**  $\frac{1}{2}x$ ; **8.59**  $\cos 1 - 1$ ; **8.60**  $x^2$ ; **8.61**  $\alpha > 0, \beta < \alpha$  або  $\alpha \leq 0, \beta < 0$ ; **8.62**  $\alpha > 0, \beta \in \mathbb{R}$  або  $\alpha \leq 0, \beta < \alpha$ ; **8.63**  $\alpha = 1, \beta = 0$ ; **8.64** 1)  $\alpha \in \mathbb{R}, \beta = \ln 2$ ; 2)  $\alpha = 3, \beta = 0$ ; **8.65** 1)  $\alpha = \beta = 0$ ; 2) не існують; **8.66**  $\alpha \in \mathbb{R}, \beta = 0$ .

**9.11**  $f \in C(\mathbb{R} \setminus \{2\})$ ,  $x = 2$  є точкою розриву II роду типу полюс; **9.12** — **9.13**  $f \in C(\mathbb{R})$ ; **9.14**  $f \in C(\mathbb{R} \setminus \{-\frac{\pi}{4}\})$ ,  $x = -\frac{\pi}{4}$  є точкою розриву I роду; **9.15**  $f \in C(\mathbb{R} \setminus \{0\})$ ,  $x = 0$  є точкою розриву I роду; **9.16** — **9.17**  $f \in C(\mathbb{R})$ ; **9.18**  $f \in C(\mathbb{R} \setminus \{1\})$ ,  $x = 1$  є точкою розриву I роду; **9.19**  $f \in C(\mathbb{R} \setminus \{0, 1\})$ ,  $x = 0$  та  $x = 1$  є точками розриву I роду; **9.20**  $f \in C(\mathbb{R} \setminus \{-1, 0, 1\})$ ,  $x = 0$  є точкою усувного розриву,  $x = -1$  та  $x = 1$  є точками розриву II роду типу полюс; **9.21**  $f \in C(\mathbb{R})$ ; **9.22**  $f \in C(\mathbb{R} \setminus \{0\})$ ,  $x = 0$  є точкою усувного розриву; **9.23** — **9.24**  $f \in C(\mathbb{R})$ ; **9.25**  $\alpha = 1, \beta = \frac{4+3\sin 2}{12}$ ; **9.26**  $\alpha = \frac{2}{27}$ ; **9.27** неперервна зліва на  $\mathbb{R} \setminus \{\sqrt{n} | n \in \mathbb{N}\}$  та неперервна справа на  $\mathbb{R} \setminus \{-\sqrt{n} | n \in \mathbb{N}\}$ ; **9.28** неперервна справа на  $\mathbb{R}$  та неперервна зліва на  $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$ ; **9.29** 1) неперервна справа на  $\mathbb{R}$  та неперервна зліва на  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ ; 2) неперервна зліва на  $\mathbb{R}$  та неперервна справа на  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ ; **9.30** 1) неперервна справа на  $\mathbb{R}$  та неперервна зліва на  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ ; 2)–3) неперервна зліва та справа на  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ .

**10.1** 1) рівномірно неперервна (р. н.); 2) не є рівномірно неперервною (не є р. н.); **10.2** 1) не є р. н.; 2)–3) р. н.; **10.3** 1) не є р. н.; 2)–3) р. н.; **10.4** 1) не є р. н.; 2) р. н.; **10.5** 1) р. н.; 2) не є р. н.; **10.6** 1)–2) р. н.; **10.7** 1)–2) не є р. н.; **10.8** 1)–2) р. н.; **10.9** не є р. н.; **10.10** — **10.12** р. н.

**11.1**  $-\frac{1}{x^2} \cdot 3 \operatorname{tg} \frac{1}{x} \cdot \frac{\ln 3}{\cos^2 \frac{1}{x}}$ ; **11.2**  $-\frac{\cos(\operatorname{tg}(\cos^2 x)) \cdot \sin 2x}{\cos^2(\cos^2 x)}$ ; **11.3**  $\frac{1+2\sqrt{x}+4\sqrt{x} \cdot \sqrt{x+\sqrt{x}}}{8\sqrt{x} \cdot \sqrt{x+\sqrt{x}} \cdot \sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}}$ ; **11.4**  $\frac{n \sin x}{\cos^{n+1} x}$ ,  $x \neq \frac{2k-1}{2}\pi, k \in \mathbb{Z}$ ; **11.5**  $-(\cos x)^{1+\sin x} (\operatorname{tg}^2 x - \ln \cos x)$ ,  $0 < x - 2k\pi < \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$ ; **11.6**  $\frac{1}{x^{\frac{1}{x}}} \cdot \frac{1-\ln x}{x^2}$ ,  $x > 0$ ; **11.7**  $0, x > 0$ ; **11.8**  $10^{\frac{x}{\log x^3}} \cdot \frac{1+\ln x}{\log_{10} 3}$ ,  $x > 0$ ; **11.9**  $\frac{2x-5}{x(x-5)(x^2-5x+1)}$ ,  $x \in \mathbb{R} \setminus \{0, 5\}$ ; **11.10**  $\frac{1}{1+x^2}$ ,  $x \neq 1$ ; **11.11**  $a^x \cdot a^{a^x} \cdot \ln^2 a + a x a^{a-1} \cdot a^{a^x} \cdot \ln a + a^a \cdot x a^{a-1} + x^x \cdot a^{a^x} \cdot \ln a \cdot (1+\ln x) + x^x \cdot (\frac{1}{x} + \ln x + \ln^2 x)$ ,  $a > 0, x > 0$ ; **11.12** 1)  $-324$ ; 2)  $-8$ ; 3)  $0$ ; **11.13**  $-\pi^2 \ln 2$ ; **11.14** не диференційовна в точці  $x_0 = 0$ ; **11.15** 1)  $f'_\Lambda(-\pi) = f'_\Pi(-\pi) = 1$ , тому  $f$  диференційовна в точці  $x_0 = -\pi$ ; 2) аналогічно,  $f'_\Lambda(0) = f'_\Pi(0) = 1$ ; **11.16** 1)  $f'_\Lambda(0) = 1, f'_\Pi(0) = 0$ ; 2)  $f'_\Lambda(\frac{1}{2}) = f'_\Pi(\frac{1}{2}) = \frac{1+3e^2}{(1+e^2)^2}$ ; 3)  $f'_\Lambda(2) = f'_\Pi(2) = \frac{1+\frac{3}{2}\sqrt{e}}{(1+\sqrt{e})^2}$ ; **11.17**  $f'(x) = \operatorname{sgn} x, x \neq 0$ ; **11.18**  $f'(x) = 2|x|$ ; **11.19**  $f'(x) = 2x \cos \frac{1}{x} - \sin \frac{1}{x}$ ,  $x \neq 0$  та  $f'(0) = 0$ ; **11.20**  $f'(x) = 3x^2, x < 0; f'(x) = 2x, x \geq 0$ ; **11.21**  $f'(x) = \pi[x] \cos \pi x, x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$  та  $f'_\Lambda(k) = (k-1)\pi \cdot (-1)^k, f'_\Pi(k) = k\pi \cdot (-1)^k$  при  $k \in \mathbb{Z}$ ; **11.22**  $f'(x) = \pi[x] \sin 2\pi x$ ; **11.23**  $f'(x) = 3x^2 \cdot \operatorname{sgn} x$ ; **11.24**  $f'(x) = 1, x \leq 0$  та  $f'(x) = \cos x, x > 0$ ;

**11.25**  $f'(x) = 1, x < 1; f'(x) = 2x, x > 1$  та  $f'_\Lambda(1) = 1, f'_\Pi(1) = 2$ ; **11.26**  $\alpha = 0, \beta = -1$ ; **11.27**  $\alpha = \beta = 0$ ; **11.28**  $\alpha = \beta \in \mathbb{R}$ ; **11.29**  $\alpha > 1$ ; **11.30** 1)  $\alpha = \beta \in \mathbb{R}$ ; 2)  $\alpha \in \mathbb{R}, \beta \neq 0$ ; **11.31** 1)  $\alpha = -1, \beta = -2$ ; 2)  $\alpha \in \mathbb{R}, \beta \in \mathbb{R}$ ; **11.38**  $dy = \frac{3t^2+1}{4t^3} dt$ ; **11.39**  $dy = -\operatorname{ctg} t dt$ ; **11.40**  $dy = \frac{4x^3+1}{y(5y^3+2)} dx$ ; **11.41**  $dy = \frac{x+1}{x(e^y+1)} dx$ ; **11.42**  $dy = -\frac{dx}{5y^4+3y^2+1}$ ; **11.43**  $dy = \frac{dx}{2(\ln y+1)}$ ; **11.44**  $dy = -\frac{b^2 x}{a^2 y} dx$ ; **11.45**  $dy = -\sqrt[3]{\frac{y}{x}} dx$ ; **11.46**  $\frac{3t^2+1}{4t^3}$ ; **11.47**  $-\operatorname{ctg} t$ ; **11.48**  $\frac{\operatorname{ch} t + t \operatorname{sh} t}{\operatorname{sh} t + t \operatorname{ch} t}$ ; **11.49**  $-2\cos 2t$ ; **11.50**  $-\frac{t^2+1}{t(t^3-3t-2)}$ ; **11.51**  $df = \frac{du}{u} + \frac{dv}{v}$ ; **11.52**  $df = e^{uv} \cdot (v du + u dv)$ ; **11.53**  $df = u^v \cdot (\ln u dv + \frac{v}{u} du)$ ; **11.54**  $df = e^{u+v} \cdot (du + dv)$ ; **11.55**  $df = \frac{v du - u dv}{u^2 + v^2}, u^2 + v^2 > 0$ ; **11.56**  $df = \frac{1}{\operatorname{tg} \frac{u}{v}} \cdot \frac{1}{\cos^2 \frac{u}{v}} \cdot \frac{v du - u dv}{v^2}, v \neq 0 \vee \frac{u}{v} \in (\pi k; \frac{\pi}{2} + \pi k), k \in \mathbb{Z}$ .

**12.1**  $e^{3x} \cdot 3^{18} \cdot (9x^2 + 120x + 380)$ ; **12.2**  $\frac{24}{x^5}$ ; **12.3**  $e^x \cdot \sum_{k=0}^{10} C_{10}^k \frac{(-1)^k k!}{x^{k+1}}$ ; **12.4**  $-4e^x \cdot (\sin x + \cos x)$ ; **12.5**  $f^{(n)}(x) = (-1)^{n-1} (n-1)! \left( \frac{1}{(x+2)^n} + \frac{1}{(x-1)^n} \right)$ ; **12.6**  $f^{(n)}(x) = (-1)^{n-1} (n-1)! \left( \frac{1}{(x+1)^n} + \frac{1}{(x-1)^n} - \frac{2}{(x-2)^n} \right)$ ; **12.7**  $f^{(n)}(x) = \frac{1}{c} \cdot (b - \frac{ad}{c}) \cdot (-1)^n n! \left( x + \frac{d}{c} \right)^{-n-1}, c \neq 0$ ; **12.8**  $f^{(n)}(x) = n! (1-x)^{-(n+1)}, x \neq 1$ ; **12.9**  $f^{(n)}(x) = (-1)^n n! \left( \frac{1}{(x-2)^{n+1}} - \frac{1}{(x-1)^{n+1}} \right)$ ; **12.10**  $f^{(n)}(x) = \frac{(2n-1)!!}{2^n} \cdot \frac{1}{(1-2x)^{n+\frac{1}{2}}}$ ; **12.11**  $f^{(n)}(x) = -2^{n-1} \cdot \cos \left( 2x + \frac{\pi n}{2} \right)$ ; **12.12**  $f^{(n)}(x) = 2^{n-1} \cdot \cos \left( 2x + \frac{\pi n}{2} \right)$ ; **12.13**  $f^{(2k)}(0) = 0$  та  $f^{(2k+1)}(0) = (-1)^k \cdot (2k)!, k \in \mathbb{Z}^+$ ; **12.14**  $f^{(2k-1)}(0) = 0$  та  $f^{(2k)}(0) = 2^{2k-1} \cdot ((k-1)!)^2, k \in \mathbb{N}$ ; **12.15**  $df = 3u^2 du, d^2 f = 6u du^2 + 3u^2 d^2 u$ ; **12.16**  $df = e^{uv} \cdot (u dv + v du), d^2 f = e^{uv} \cdot (v du + u dv)^2 + e^{uv} \cdot (u d^2 v + 2 du dv + v d^2 u)$ ; **12.17**  $df = u^v \cdot (\ln u dv + \frac{v}{u} du), d^2 f = u^v \cdot (\ln u dv + \frac{v}{u} du)^2 + u^v \cdot (\ln u d^2 v + \frac{2 du dv}{u} + \frac{v}{u} d^2 u - \frac{v du^2}{u^2})$ ; **12.18**  $d^2 f = \frac{v(v d^2 u - u d^2 v) - 2v dv(v du - u dv)}{v^3}$ ; **12.19**  $df = \frac{v du - u dv}{v^2}, v \neq 0$ ; **12.19**  $df = vw du + uw dv + uv dw, d^2 f = vw d^2 u + uw d^2 v + uv d^2 w + 2u dv dw + 2v du dw + 2w du dv$ ; **12.20**  $df = \ln v du + \frac{u}{v} dv, d^2 f = \ln v d^2 u + \frac{2}{v} du dv + u \cdot \frac{v d^2 v - dv^2}{v^2}$ .

**13.1**  $1 + \frac{x}{3} - \frac{x^2}{9} + \frac{5x^3}{81} - \frac{10x^4}{243} + \frac{22x^5}{729} + o(x^5)$ ; **13.2**  $-x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} - \frac{x^5}{5} + o(x^5)$ ; **13.3**  $1 - x + x^2 - x^3 + x^4 - x^5 + o(x^5)$ ; **13.4**  $1 + \frac{x}{2} + \frac{3x^2}{8} - \frac{5x^3}{16} + \frac{35x^4}{128} - \frac{63x^5}{256} + o(x^5)$ ; **13.5**  $1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^5)$ ; **13.6**  $x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^5)$ ; **13.7**  $x + \frac{x^3}{6} + \frac{3x^5}{40} + o(x^5)$ ; **13.8**  $x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + o(x^5)$ ; **13.9**  $1 + 2x + x^2 - \frac{2x^3}{3} - \frac{5x^4}{6} - \frac{x^5}{15} + o(x^5)$ ; **13.10**  $x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{10} + o(x^5)$ ; **13.11**  $\frac{x^2}{6} + x^3 + \frac{119x^4}{72} + o(x^4)$ ; **13.12**  $\sin 1 - \frac{\cos 1}{2} x^2 + \frac{\cos 1 - 3 \sin 1}{24} x^4 + o(x^5)$ ; **13.13**  $\ln 2 - \frac{x^2}{4} - \frac{x^4}{96} + o(x^5)$ ; **13.14**  $\sin 1 + \cos 1 \cdot x + \frac{\cos 1 - \sin 1}{2} x^2 - \frac{\sin 1}{2} x^3 - \frac{6 \sin 1 + 5 \cos 1}{24} x^4 - \frac{5 \sin 1 + 23 \cos 1}{120} x^5 + o(x^5)$ ; **13.15**  $e^{\cos 1} - \sin 1 \cdot e^{\cos 1} \cdot x - \frac{e^{\cos 1} (-1 + 2 \cos 1 + \cos 2)}{4} x^2 + \frac{\sin 1 e^{\cos 1} (1 + 6 \cos 1 + \cos 2)}{12} x^3 + o(x^3)$ ; **13.16**  $\ln 2 + \ln \ln 2 - \frac{1}{8 \ln 2} x - \frac{1 + 2 \ln 2}{128 \ln^2 2} x^2 - \frac{1 + 3 \ln 2 + 4 \ln^2 2}{1536 \ln^3 2} x^3 + o(x^3)$ ; **13.17**  $\ln 2 + \frac{x}{2} + \frac{x^2}{8} - \frac{x^4}{192} + o(x^5)$ ; **13.18**  $-\frac{1}{6}$ ; **13.19**  $\frac{1}{9}$ ; **13.20**  $0$ ; **13.21**  $\frac{1}{3}$ ; **13.22**  $\frac{2}{3}$ ; **13.23**  $\frac{1}{6}$ ; **13.24**  $2$ ; **13.25**  $\frac{1}{6}$ ; **13.26**  $\cos 3$ ; **13.27**  $\frac{1}{2}$ ; **13.28**  $\infty$ ; **13.29**  $1$ .

**14.1 – 14.7** застосувати теорему Лагранжа; **14.8 – 14.16** застосувати твердження доведення нерівностей; **14.17 – 14.23** застосувати нерівність Ієнсена.

## Рекомендовані джерела

- [1] Ляшко І. І., Ємельянов В. Ф., Боярчук О. К. *Математичний аналіз. Частина 1.* — К.: Вища школа, 1992. — 495 с.
- [2] Ляшко І. І., Боярчук А. К., Гай Я. Г. и др. *Справочное пособие по математическому анализу. Часть 1. Введение в анализ, производная, интеграл.* — К.: Вища школа, 1978. — 696 с.
- [3] Ляшко С. І., Боярчук А. К. и др. *Сборник задач и упражнений по математическому анализу.* — Москва–Санкт-Петербург–Киев: Диалектика, 2001. — 432 с.
- [4] Дороговцев А. Я. *Математический анализ. Краткий курс в современном изложении.* — К.: Факт, 2004. — 560 с.
- [5] Фихтенгольц Г. М. *Основы математического анализа. Том 1.* — М.: Наука, 1968. — 440 с.
- [6] Демидович Б. П. *Сборник задач и упражнений по математическому анализу.* — М.: Наука, 1977. — 528 с.
- [7] Рубльов Б. В. *Математичний аналіз. Теорія послідовностей.* — К.: КНУ, 2010. — 95 с.
- [8] Денисьєвський М. О., Курченко О. О., Нагорний В. Н., Нестеренко О. Н., Петрова Т. О., Чайковський А. В. *Збірник задач з математичного аналізу. Частина I. Функції однієї змінної.* — К.: ВПЦ “Київський університет”, 2005. — 257 с.