If $E_1 = K \times F$

$$\mathcal{O}(E_1) \xrightarrow{G} \mathcal{O}(E_2)^{V}$$


$$\mathcal{F} \hookrightarrow \mathcal{F}_{1,k_1} \longrightarrow \mathcal{F}_{2,k_2} \hookrightarrow F$$

$$F_{k_1} \xrightarrow{G_{k_1,k_2}} F_{k_2}$$

$$G_{k_1,k_2} \in \mathrm{Hom}(F_1, F_2)$$




U_1 k





$$K \xleftarrow{\chi} S$$



$$\begin{array}{ccc} \mathcal{E} & \xrightarrow{A} & \mathrm{Im}_A \subset \mathcal{M} \\ m \downarrow & & \downarrow A_m \\ \mathcal{E} & \xrightarrow[A]{} & \mathrm{Im}_A \subset \mathcal{M} \end{array}$$


2 → 3 → 4 → 5
D
e2
e3
5


t_0
t_1
B
C
A
$f(A_{t_0}, B_{t_0}) = C_{t_1}$



$$\Gamma(K,E) = \{ f \mid f : K \to E,\ \text{Fonctions} \}$$
$$\pi \circ f = id_K \}$$


$$\mathcal{O}(E) : \left(U \to \Gamma(U, E) \right)$$


$$\mathcal{O}(V) = \{ U \to \Gamma(U, V) \}$$

$$\nu : \mathcal{O}(E) \to \mathcal{O}(V)$$

$$\underline{\mathrm{Obj}}\ \mathcal{E} = \mathrm{Obj}\ \mathcal{O}(E) \qquad A = \Gamma(U, E)$$

$$a : G \times A \to A$$
$$(g, a) \mapsto g \cdot a = a'$$


None
Head
Tail
head
tail
Value
Next
Head
Tail
First students who don't have white list.



$$F_1 \xrightarrow{f} \Gamma(S, D)$$

$$F_2 \xrightarrow{g} \Gamma(S, D)$$

time, temp

