

# *LES MATHS DE NOËL*



---

*TERMINAL D*

---

*2023*

*2<sup>e</sup> édition*

*Saïd*

## Avant-propos

Cet ouvrage propose aux élèves de terminale D/C des rappels et des compléments de cours assez complets du programme national, ainsi que des exercices non corrigés, contrairement aux exemples de cours soigneusement corrigés. Je vous rappelle qu'il existe également une version Premier S pour ceux qui seront intéressés à effectuer quelques révisions.

L'ouvrage est orienté vers une relation étroite entre le cours et les exercices.

Les parties du cours ne sont pas un substitut au cours du professeur, mais plutôt un résumé exhaustif qui l'éclaire d'une manière différente. Ainsi, votre présence en cours est fortement conseillée. Elle vous permettra de bien comprendre les cours et surtout d'avoir tous les atouts à votre disposition pour résoudre les exercices.

À la fin de chaque chapitre étudié dans la partie cours, on trouve une liste d'exercices avec des difficultés progressives, classiques ou parfois originaux, qui constituent une illustration du cours. J'ai veillé à chaque fois à passer en revue tous les problèmes qui tournent autour du chapitre en question. On trouve également des exercices plus ou moins avancés pour mieux préparer les examens à venir.

Je serais reconnaissant envers ceux de mes lecteurs qui voudront bien m'envoyer leurs remarques sur cet ouvrage à l'adresse suivante : *lesmathsdenoel@gmail.com*.

# Table des matières

<b>1</b>	<b>Fonction logarithme népérienne</b>	<b>1</b>
1.1	Propriété de fonction logarithme népérienne . . . . .	1
1.1.1	Relation fondamentale . . . . .	1
1.2	Étude de la fonction logarithme népérienne . . . . .	1
1.2.1	Ensemble de définition . . . . .	1
1.2.2	Continuité, dérivation et sens de variation . . . . .	2
1.2.3	Limites . . . . .	3
1.3	Fonction logarithme de base $a$ avec $a > 0$ et $a \neq 1$ . . . . .	3
1.4	Exercice . . . . .	6
<b>2</b>	<b>FONCTION EXPONENTIELLE</b>	<b>13</b>
2.1	Propriété de la fonction exponentielle . . . . .	13
2.1.1	Relation fonctionnelle . . . . .	13
2.2	Étude de la fonction exponentielle . . . . .	13
2.2.1	Signe . . . . .	13
2.2.2	sens de variation . . . . .	13
2.2.3	Propriété algébrique . . . . .	13
2.2.4	Limites . . . . .	14
2.2.5	Dérivé de la fonction $e^s$ . . . . .	14
2.3	Exercice . . . . .	17
<b>3</b>	<b>Nombre complexe</b>	<b>24</b>
3.1	Définition et règles de calcul . . . . .	24
3.1.1	Représentation graphique . . . . .	24
3.1.2	règles de calcul . . . . .	24
3.1.3	Forme trigonométrique . . . . .	25
3.2	Résolution d'une équation de seconde degré . . . . .	26
3.3	Similitude plan directe . . . . .	28
3.3.1	Translation . . . . .	28
3.3.2	Homothétie . . . . .	28
3.3.3	Rotation . . . . .	29
3.3.4	Similitude directe . . . . .	29
3.4	Exercice . . . . .	33
<b>4</b>	<b>Primitive et Calcul d'intégrale</b>	<b>40</b>
4.1	Primitive . . . . .	40
4.1.1	Primitive vérifiant les condition initial . . . . .	40
4.1.2	Primitive des fonction usuelles . . . . .	41
4.1.3	Règles d'intégrations . . . . .	41
4.2	Intégrale d'une fonction continue . . . . .	41
4.2.1	Calculs d'intégrale . . . . .	43

4.3	Exercice . . . . .	43
<b>5</b>	<b>Équation différentielle</b>	<b>47</b>
5.1	Équation différentielle de premier ordre . . . . .	47
5.1.1	Résolution de l'équation homogène $y' = a(t)y$ . . . . .	47
5.1.2	Résolution de l'équation avec second membre . . . . .	47
5.2	Équation différentielle d'ordre 2 à coefficient constants . . . . .	48
5.2.1	Résolution de l'équation homogène $ay'' + by' + cy = 0$ . . . . .	48
5.2.2	Équation avec second membres $ay'' + by' + cy = f(t)$ . . . . .	48
5.3	Exercice . . . . .	50
<b>6</b>	<b>Dénombrement et Probabilité</b>	<b>52</b>
6.1	Dénombrement . . . . .	52
6.1.1	Les ensembles finis . . . . .	52
6.1.2	p-liste d'un ensemble fini . . . . .	52
6.1.3	Arrangements . . . . .	52
6.1.4	Combinaisons . . . . .	53
6.1.5	Tableau récapitulatif . . . . .	53
6.2	Probabilité . . . . .	53
6.2.1	Expérience aléatoire . . . . .	53
6.2.2	Événement . . . . .	53
6.2.3	Vocabulaire . . . . .	54
6.2.4	Lois de probabilité . . . . .	54
6.2.5	Probabilité d'une événement . . . . .	54
6.2.6	Équiprobable . . . . .	55
6.2.7	Variable aléatoire . . . . .	55
6.2.8	Loi Binomial . . . . .	56
6.2.9	Probabilité conditionnelles . . . . .	57
6.3	Exercice . . . . .	57
<b>7</b>	<b>Statistique</b>	<b>68</b>
7.1	Caractéristique de position . . . . .	68
7.1.1	Mode . . . . .	68
7.1.2	Moyenne . . . . .	68
7.1.3	Médiane et Quartiles . . . . .	68
7.1.4	Écart inter-quartile . . . . .	68
7.2	Caractéristique de dispersion . . . . .	69
7.2.1	Écart moyen . . . . .	69
7.2.2	Variance et Écart-type . . . . .	69
7.3	Série statistique à deux caractères . . . . .	70
7.3.1	Nuage de points . . . . .	70
7.3.2	Point moyen d'un nuage . . . . .	70
7.4	Ajustement affine . . . . .	70

7.4.1	Interpolation et extrapolation . . . . .	70
7.4.2	Droite d'ajustement . . . . .	70
7.5	Exercice d'application . . . . .	72
7.6	Exercice . . . . .	73

# 1 Fonction logarithme népérienne

**Définition 1.1.** La fonction logarithme népérien notée  $\ln(x)$  est une fonction définie sur  $]0, +\infty[$  qui s'annule en 1.

## 1.1 Propriété de fonction logarithme népérienne

### 1.1.1 Relation fondamentale

**Théorème 1.1.** Pour tous réels  $a$  et  $b$  strictement positifs, on a :

$$\ln(a \times b) = \ln(a) + \ln(b)$$

**Préposition 1.1.** Pour tous réels  $a$  et  $b$  strictement positifs, on a :

- a)  $\ln(\frac{1}{a}) = -\ln(a)$
- b)  $\ln(\frac{a}{b}) = \ln(a) - \ln(b)$
- c)  $\ln(a)^n = n \ln(a)$  avec  $n$  entier naturel.
- d)  $\ln(\sqrt{a}) = \frac{1}{2} \ln(a)$

*Démonstration.* .

- a. D'après la définition  $\ln(1) = 0$  comme  $\frac{1}{a} \times a = 1$  donc  $\ln(\frac{1}{a} \times a) = 0$   
 $\Rightarrow \ln(\frac{1}{a}) + \ln(a) = 0 \Rightarrow \ln(\frac{1}{a}) = -\ln(a)$
- b. Comme  $\frac{a}{b} = a \times \frac{1}{b}$  alors  $\ln(\frac{a}{b}) = \ln(a \times \frac{1}{b}) = \ln(a) + \ln(\frac{1}{b}) = \ln(a) - \ln(b)$   
car  $\ln(\frac{1}{b}) = -\ln(b)$ .
- c.  $\ln(a^n) = \ln(a \times a \dots \times a) (n \text{ fois}) = \ln(a) + \ln(a) + \dots + \ln(a) (n \text{ fois}) = n \times \ln(a)$
- d. Évidant car  $\ln(\sqrt{a}) = \ln(a^{\frac{1}{2}}) = \frac{1}{2} \ln(a)$ .

□

## 1.2 Étude de la fonction logarithme népérienne

### 1.2.1 Ensemble de définition

- a.  $s(x) = \ln(x) \Rightarrow D_s = ]0, +\infty[$
- b. soit  $h$  une fonction définie sur  $D_h$  et  $s(x) = \ln(h(x))$ ,  
 $s(x) = \ln(h(x)) \Rightarrow D_s = \{x \in D_h / h(x) > 0\}$

**Exemple :**

**Exemples 1.1.** Déterminer le domaine définition de :  $f(x) = \ln(x^2 - 10x + 16)$

**Solution 1.1.**  $f(x)$  est définie pour tout  $x$  tel que  $x^2 - 10x + 16 > 0$

$x$	$-\infty$	$2$	$8$	$+\infty$	
$x^2 - 10x + 16$	$+$	$0$	$-$	$0$	$+$

Donc  $f$  est définie pour tout  $x \in ]-\infty; 2[ \cup ]8; +\infty[$

### 1.2.2 Continuité, dérivation et sens de variation

**Propriété 1.1.** *i. La fonction logarithme népérien est continue sur  $]0, +\infty[$*

*ii. La fonction logarithme népérien est dérivable sur  $]0, +\infty[$  et  $(\ln(x))' = \frac{1}{x}$*

*iii. La fonction logarithme népérien est strictement croissante sur  $]0, +\infty[$*

**Propriété 1.2.** Pour tous  $a$  et  $b$  nombres strictement positifs on a :

*i)  $\ln(a) = \ln(b) \Leftrightarrow a = b$*

*ii)  $\ln(a) < \ln(b) \Leftrightarrow a < b$*

**Exemples 1.2.** Résolvez l'équation et inéquation suivant.

1.  $\ln(x) - 2\ln(x-4) = -\ln(2)$

2.  $\ln(x-1) + \ln(x-3) < \ln(3)$

**Solution 1.2.** 1.  $E : \ln(x) - 2\ln(x-4) = -\ln(2)$

**Domaine de définition :**  $\ln(x)$  est définie pour tout  $x \in ]0, +\infty[$  et

$\ln(x-4)$  est définie pour tout  $x \in ]4, +\infty[$  donc  $E$  est définie pour tout  $x \in ]4, +\infty[$

$$\ln(x) - 2\ln(x-4) = -\ln(2) \Leftrightarrow \ln(x) - \ln(x-4)^2 = -\ln(2)$$

$$\Leftrightarrow \ln\left(\frac{x}{(x-4)^2}\right) = \ln\left(\frac{1}{2}\right) \Leftrightarrow \frac{x}{(x-4)^2} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow 2x = x^2 - 8x + 16 \Leftrightarrow x^2 - 10x + 16 = 0$$

$$\Delta = 10^2 - 4 = 36 \quad x_1 = \frac{4}{2} = 2 \text{ impossible et } x_2 = \frac{16}{2} = 8 \text{ donc } S = \{8\}$$

2.  $E' : \ln(x-1) + \ln(x-3) < \ln(3)$

**Domaine de définition :**  $\ln(x-1)$  est définie pour tout  $x \in ]1, +\infty[$  et  $\ln(x-3)$  est définie pour tout  $x \in ]3, +\infty[$  donc  $E'$  est définie pour tout  $x \in ]3, +\infty[$ .

$$\ln(x-1) + \ln(x-3) < \ln(3) \Leftrightarrow \ln((x-1)(x-3)) < \ln(3)$$

$$\Leftrightarrow (x-1)(x-3) < 3 \Leftrightarrow x^2 - 4x < 0 \Leftrightarrow x(x-4) < 0 \text{ donc } S = ]3; 4[.$$

**Propriété 1.3.** Soit  $h$  une fonction dérivable est strictement positive sur un intervalle  $I$ . La fonction  $x \mapsto \ln(h(x))$  est dérivable sur  $I$ . Sa dérivée est la fonction  $x \mapsto \frac{h'(x)}{h(x)}$

**Exemples 1.3.** Déterminer la fonction  $g'(x)$  dérivée d'une fonction  $g(x)$

définie sur  $x \in ]-\infty; -1[ \cup ]1; +\infty[$  par  $g(x) = \ln(x^2 + 2x + 1)$ .

**Solution 1.3.** D'après la propriété précédente  $g'(x) = \frac{2x+2}{x^2+2x+1}$ .

*Remarque 1.1.* On a :  $(\ln(h(x)))' = \frac{h'(x)}{h(x)}$ , comme  $h > 0$  donc  $h'$  et  $(\ln(h))'$  sont de même signe donc les fonction  $h(x)$  et  $\ln(h(x))$  ont le même sens de variation.

### 1.2.3 Limites

a) **Limite au borne**

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty \qquad \lim_{x \rightarrow 0} \ln(x) = -\infty$$

b) **Conséquence de la dérivée**

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(x)}{x-1} = 1 \qquad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$$

c) **Limites et croissance comparées**

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x} = 0 \text{ et pour tout entier non nul } n; \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x^n} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \ln(x) = 0 \text{ et pour tout entier } n; \lim_{x \rightarrow 0} x^n \ln(x) = 0$$

### 1.3 Fonction logarithme de base a avec $a > 0$ et $a \neq 1$

**Définition 1.2.** La fonction  $\log_a$ , appelée **logarithme de base a**, où  $a \in \mathbb{R}_+^* - \{1\}$ , est défini par  $\frac{\ln(x)}{\ln(a)}$ .

**Cas particuliers :**

- i. Si  $a = 10$  alors  $\log_{10}$  est appelé **logarithme décimal** et noté  $\log$ .
- ii. Si  $a = e$  (nombre d'Euler) , alors  $\log_e$  est appelé **logarithme népérien** et noté  $\ln$ .

**Dérivée :**  $h(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(a)}$  sa fonction dérivée est  $h'(x) = \frac{1}{x \ln(a)}$

**Propriété 1.4.**  $\forall x \text{ et } y \in \mathbb{R}_+^*$

- a)  $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$
- b)  $\log_a(\frac{1}{x}) = -\log_a x$
- c)  $\log_a(\frac{x}{y}) = \log_a x - \log_a y$
- d)  $\log_a x^r = r \log_a x$ , avec  $r \in \mathbb{R}$

**Application 1. Partie A :**

Le plans est munie d'un repère orthonormé  $(o, \vec{i}, \vec{j})$  tel que  $||\vec{i}|| = ||\vec{j}|| = 2\text{cm}$ .

On considère la fonction  $h$  définie par :

$$h(x) = x^2 + 2x - 1 + 2 \ln(x + 1)$$

.



1. Déterminer le domaine de définition  $D_h$  de  $h(x)$ .
2. Calculer les limites au borne de  $D_h$ .
3. Dresser le tableau de variation de  $h(x)$  sur  $D_h$
4. Montrer que l'équation  $h(x) = 0$  admet une unique solution  $\alpha$  sur  $D_h$ .  
En déduire que  $0.2 < \alpha < 0.3$ .
5. En déduire le signe de  $h(x)$ .

**Partie B :**

On considère la fonction  $s$  définie sur  $D_s = ]-1, +\infty[$  par :

$$s(x) = x - 2 - 2 \frac{\ln(x+1)}{x+1}$$

1. Calculer les limites de  $s(x)$  aux borne de  $D_s$ .
2. Montrer que  $s'(x) = \frac{h(x)}{(x+1)^2}$ .
3. Dresser le tableau de variation de  $s(x)$ .
4. Montrer que la courbe  $(\varepsilon_s)$  admet la droite  $\Delta : y = x - 2$  comme asymptote.
5. Étudie la position de  $(\varepsilon_s)$  par rapport à  $\Delta$ .
6. Déterminer les points d'intersections entre  $(\varepsilon_s)$  et les l'axe  $ox$  et l'axe  $oy$ .
7. Tracer la droite  $\Delta$  et la courbe  $(\varepsilon_s)$  .(On pendra  $\alpha = \frac{1}{4}$ )

**Solution Application 1. .**

**Partie A :**

1.  $x^2 + 2x - 1$  est défini sur  $\mathbb{R}$  et  $\ln(x+1)$  est défini pour tout  $x$  tel que  $x+1 > 0 \Leftrightarrow x > -1 \Rightarrow x \in ]-1, +\infty[$ , donc  $D_h = \mathbb{R} \cap ]-1, +\infty[ = ]-1, +\infty[$ .
2. Comme  $\lim_{x \rightarrow -1} x^2 + 2x - 1 = -2$  et  $\lim_{x \rightarrow -1} 2 \ln(x+1) = -\infty$  donc  
 $\lim_{x \rightarrow -1} h(x) = -\infty$   
 $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = +\infty$  car  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 + 2x - 1 + 2 \ln(x+1) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2(1 + \frac{2}{x} - \frac{1}{x^2} + 2 \frac{\ln(x+1)}{x^2})$   
et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x+1)}{x^2} = 0$  et  $\lim_{x \rightarrow -1} x^2 = +\infty$ .
3.  $h'(x) = 2x + 2 + 2 \frac{1}{x+1} = \frac{2x^2 + 4x + 2}{x+1} \geq 0 \Leftrightarrow 2x^2 + 2x + 2 \geq 0$   
 $\Delta = 4 - 4 \times 2 \times 2 = -12$  pas de solution dans  $\mathbb{R}$ ,  $h'(x) > 0$  et  $h(x)$  est croissant sur  $D_h$ .
4.  $h(x)$  est strictement croissant sur  $] -1, +\infty[$  à valeur  $] -\infty, +\infty[$  donc d'après le théorème des valeurs intermédiaire  $h(x)$  admet une unique solution sur  $] -1, +\infty[$ .  
 $h(0.2) = -0.15$  et  $h(0.3) = 0.30$  et  $h(0.2) \times h(0.3) = -0.05 < 0$   
donc  $0.2 < \alpha < 0.3$ .
5. D'après les résultats des deux questions précédents  $\forall x \in ]-1, \alpha]$   $h(x) \leq 0$  et  $\forall x \in [\alpha, +\infty[$   $h(x) \geq 0$ .

**Partie B :**

1. Comme  $\lim_{x \rightarrow -1} x - 2 = -3$  et  $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{\ln(x+1)}{x+1} = -\infty$  donc  $\lim_{x \rightarrow -1} s(x) = +\infty$ .

$\lim_{x \rightarrow +\infty} s(x) = +\infty$  car  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x - 2 = +\infty$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x+1)}{x+1} = 0$ .

2.  $s'(x) = 1 - 2 \frac{1 - \ln(x+1)}{(x+1)^2} = \frac{x^2 + 2x + 1 - 2 + 2\ln(x+1)}{(x+1)^2} = \frac{x^2 + 2x - 1 + 2\ln(x+1)}{(x+1)^2} = \frac{h(x)}{(x+1)^2}$

donc  $s'(x) = \frac{h(x)}{(x+1)^2}$

3.

$x$	$-1$	$\alpha$	$+\infty$
$s'(x)$	$-$	$0$	$+$
$s(x)$	$+\infty$	$s(\alpha)$	$+\infty$


4.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x - 2 - 2 \frac{\ln(x+1)}{x+1} - x + 2 = \lim_{x \rightarrow +\infty} -2 \frac{\ln(x+1)}{x+1} = 0$  donc  $\Delta : y = x - 2$  est une asymptote oblique de la courbe  $(\varepsilon_s)$ .

5.  $s(x) - y = -2 \frac{\ln(x+1)}{x+1} \geq 0 \Leftrightarrow -2 \ln(x+1) \geq 0 \Leftrightarrow e^{\ln(x+1)} \leq e^0 \Leftrightarrow x+1 \leq 1 \Leftrightarrow x \leq 0$   
donc,  $\forall x \in ]-1, 0] s(x) - y \geq 0$ , donc  $(\varepsilon_s)$  est au dessus de  $\Delta$  et  $\forall x \in [0, +\infty[ s(x) - y \leq 0$ ,  
donc  $(\varepsilon_s)$  est au dessous de  $\Delta$ .

6. Pour l'axe  $ox$  on a :  $s(x) = 0 \Leftrightarrow x - 2 - 2 \frac{\ln(x+1)}{x+1} = 0 \Rightarrow (x-2)(x+1) - 2 \ln(x+1) = 0 \Rightarrow x^2 - x - 2 - 2 \ln(x+1) = 0$  après une étude de fonction on trouve  $x_1 = -0.48$  et  $x_2 = 2.71$

Pour l'axe  $oy$  on a :  $s(0) = 0 - 2 - 2 \frac{\ln(0+1)}{0+1} = -2$  donc  $y_0 = -2$ .

7. Représentation graphique :



## 1.4 Exercice

**Exercice 1.4.1.** Simplifier l'écriture des expressions suivantes :

$$\ln\left(\frac{1}{3}\right) + \ln\left(\frac{3}{5}\right) + \ln\left(\frac{5}{7}\right) + \ln\left(\frac{7}{9}\right) \quad 3\ln(2) + \ln(5) - 2\ln(3)$$

$$\ln(3 - \sqrt{5}) + \ln(3 + \sqrt{5}) \quad \ln(2 + \sqrt{3})^{20} + \ln(2 - \sqrt{3})^{20}.$$

**Exercice 1.4.2.** Résoudre les équations et inéquations suivantes, après avoir déterminer l'ensemble de définition :

$$\ln\left(\frac{x-1}{2x-3}\right) = 0 \quad \ln(2x-3) + 2\ln(x+1) = \ln(x-3) \quad \frac{1}{2}\ln(x+3) = \ln(x+1)$$

$$\ln(x^2 - 3x + 2) = \ln(9) \quad \ln(2x+1) + \ln(-x+1) = 0 \quad \ln(x-1)^2 - \ln(x+1) = 0.$$

$$\ln(x^2 - 4) \leq \ln(2) + \ln(x) \quad 2\ln^2(x) - \ln(x) - 3 < 0 \quad \ln(5-x) - \ln(3) + \ln(x-1) \geq 0$$

$$\ln(3x^2 - x - 2) \geq \ln(6x + 4) \quad 3\ln(2x) \leq -\ln(2) \quad \ln^2(x) - 7\ln(x) + \ln(12) \leq 0$$

**Exercice 1.4.3.** Déterminer les limites aux bornes de l'ensemble de définition et calculer les dérivées puis tracer les tableaux de variation des fonctions suivants :

$$f_1(x) = \ln\left(\frac{3x+5}{x-1}\right) \quad f_2(x) = x \ln\left(x + \frac{2}{x}\right) \quad f_3(x) = x + \frac{\ln(x)}{2x+1} \quad f_4(x) = x^2 \ln\left(\frac{x}{x+1}\right)$$

$$f_5(x) = \frac{\ln(x^2-3x+1)}{x} \quad f_6(x) = \frac{\ln(1+\sin x)}{x} \quad f_7(x) = \ln(\sin x) - \ln x \quad f_8(x) = \frac{\ln(1+x)}{\tan x}$$

$$f_9(x) = \frac{2\ln x + 7}{x + \ln x} \quad f_{10}(x) = \frac{\ln(1-4x)}{x} \quad f_{11}(x) = 2x \frac{\ln(x-1)}{\sqrt{x^2-5x+6}} \quad f_{12}(x) = \ln\left(\frac{x+2}{-x^2+6x-5}\right).$$

**Exercice 1.4.4.** .

### Partie A :

On considère la fonction  $g$  définie par  $]0, +\infty[$  par  $g(x) = 2x^3 + 4\ln(x) - 2$

1. Calculer  $g(1)$
2. En déduire les variation de  $g$ , en déduire le signe de  $g$  sur  $]0, +\infty[$

### Partie B :

Soit la fonction  $f$  définie par  $f(x) = 2x - 2 - 2\frac{\ln(x)}{x^2}$

Soit  $(C_f)$  la courbe représentative de  $f$  dans un repère orthonormé d'unité 1cm.

1. Donner le tableau de variation de la fonction  $f$ . En précisant ces limites aux bornes de  $D_f$ .
2. Montrer que la droite  $(D) : y = 2x - 1$  est une asymptote oblique à  $C_f$ . Étudier la position de  $C_f$  par rapport à  $(D)$ .
3. Déterminer les coordonnées du points  $A$  de  $C_f$  ou la tangente  $t_A$  à  $C_f$  est parallèle à  $(D)$ .

4. Montre que la restriction de  $f$  sur  $I = ]1, +\infty[$  permet de définir une bijection de  $I$  vers un intervalle  $J$  à préciser.
5. Déterminer une équation de la tangente  $T$  à  $(C_f)$  au point d'abscisse 2.
6. Tracer la droite courbe  $C_f$  et ces asymptote.
7. calculer l'aire du domaine limité  $(C_f)$ , l'asymptote oblique  $(D)$  et les droites d'équation  $x = 1$  et  $x = 2$ .

#### Exercice 1.4.5. .

##### Partie A :

Soit  $g$  la fonction définie par :  $g(x) = \frac{x}{x-1} - \ln(x-1)$

1. Déterminer l'ensemble de définition  $I$  de  $g$ .
2. Dresser le tableau de variation de  $g$ , En précisant les limites de  $g$  aux borne de  $I$  (Au voisinage de 1 on pourra poser  $h = x - 1$ )
3. Montrer que l'équation  $g(x) = 0$  admet une unique solution  $\alpha$  telle que  $4 < \alpha < 5$ .  
Dédit la valeur de  $\alpha$  à  $10^{-1}$  près.
4. Dédire le signe de  $g$  sur  $I$ .

##### Partie B :

On considère la fonction  $f$  définie dans  $I$  Par :  $f(x) = \frac{\ln(x-1)}{x}$  et  $(\varepsilon_f)$  la courbe représentatif de  $f$  dans un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  unité = 2cm.

1. Calculer les limites aux bornes de son ensemble de définition. Préciser s'il existe les droites asymptotique à  $(\varepsilon_f)$ .
2. a) Montre que  $f(\alpha) = \frac{1}{\alpha-1}$ .  
b) Montrer que  $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$ .  
c) Dresser le tableau de variation de  $f$ .  
d) Calculer l'image de  $f$  par rapport à 2 et 5.  
e) Construire  $(\varepsilon_f)$  dans un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ .

#### Exercice 1.4.6. .

##### Partie A :

Le plan est muni d'un repère orthonormé  $(o, \vec{i}, \vec{j})$  tel que  $||\vec{i}|| = ||\vec{j}|| = 2\text{cm}$ .

On considère la fonction dérivable sur  $]0, +\infty]$  est définie par :

$$f(x) = x - 4 + \frac{1}{4} \ln(x)$$

1. Dresser le tableau de variation de  $f$ . Préciser les limites aux bornes des  $D_f$ .
2. Démontrer que l'équation  $f(x) = 0$  admet une unique solution  $\alpha$  telle que  $3 < \alpha < 4$

3. Étudier le signe de  $f(x)$  sur  $]0, +\infty[$ .

**Partie B :**

On considère la fonction dérivable sur  $]0, +\infty[$  est définie par :

$$h(x) = x + 1 - \frac{31}{16}x^2 - \frac{1}{8}x^2 \ln(x)$$

1.
  - a) Montrer que  $h'(x) = xh(\frac{1}{x})$
  - b) Dresser le tableau de variation de  $h(x)$
2.  $\lambda$  est un nombre réel appartenant à l'intervalle  $]0, 1[$ 
  - a) montrer que  $\int_{\lambda}^1 x^2 \ln(x) = -\frac{1}{9} + \frac{1}{9}\lambda^3 - \frac{1}{3}\lambda^3 \ln(\lambda)$
  - b) On note  $A(\lambda)$  l'aire en centimètre carré de partie limitée par la courbe  $(\Gamma)$ , la droite repère  $(o, \vec{i})$  et les droites d'équations  $x = \lambda$  et  $x = 1$ . Calculer  $A(\lambda)$
  - c) Dédire que  $\lim_{\lambda \rightarrow 0^+} A(x) = \frac{125}{36}$

**Partie C :**

1. Soit  $g$  la fonction dérivable sur l'intervalle  $]0, +\infty[$  et  $g(x) = 4 - \frac{1}{4} \ln(x)$ .
  - a) Étudier les variations de  $g$ .
  - b) Démontrer que l'image de l'intervalle  $[3, 4]$  est contenue dans l'intervalle  $[3, 4]$
  - c) Démontrer que  $\alpha$  est l'unique solution de l'équation  $g(x) = x$
2. On considère la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  définie par :  $\begin{cases} u_0 = 3 \\ u_{n+1} = g(u_n) \end{cases}$ 
  - a) Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel  $n$ ,  $3 \leq u_n \leq 4$ .
  - b) Démontrer que pour tout entier naturel  $n$ ,  $(u_n - \alpha)$  et  $(u_{n+1} - \alpha)$  sont des signes contraires.
  - c) Démontrer que pour tout  $x$  élément de  $[3, 4]$ , on a :  $|g'(x)| \leq \frac{1}{12}$ .  
En déduire que pour tout entier naturel  $n$ ,  $|u_{n+2} - u_{n+1}| \leq \frac{1}{12} |u_{n+1} - u_n|$ , puis que  $|u_{n+1} - u_n| \leq \frac{1}{12^n}$
  - d) Démontrer que pour tout entier naturel  $n$ ,  $|u_n - \alpha| \leq \frac{1}{12^n}$ . En déduire une valeur approchée de  $\alpha$  à 0.01 près.

**Exercice 1.4.7. .**

**Partie A :**

Soit, pour tout entier naturel  $k$  non nul  $f_k$  définie sur  $]0, +\infty[$  par :

$$f_k = x - k - \frac{k \ln(x)}{x}$$

la représentation graphique de  $f_k$  dans un repère  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  orthonormal est notée  $(\varepsilon_f)$  (unité graphique 2cm)

1. soit, pour tout entier naturel  $k$ , la fonction  $g_k$  définie sur  $]0, +\infty[$  par :

$$g(x) = x^2 - k + k \ln(x)$$

- a) Étudier le sens de variation de  $g_k$ ; préciser ses limites en 0 et en  $+\infty$ .
- b) Montrer que l'équation  $g(x) = 0$  admet une unique solution notée  $\alpha_k$  et que cette solution appartient à l'intervalle  $[1, 3]$ .
2. Établir que, pour  $x$  élément de l'intervalle  $]0, +\infty[$ ,  $f'_k(x) = \frac{g'_k(x)}{x^2}$ .  
Étudier le signe de  $g_k(x)$  et en déduire le sens de variation de  $f_k$ .
3. a) Étudier les de  $f_k$  en 0 et en  $+\infty$ .  
b) Montrer que la droite  $D_k$  d'équation  $y = x - k$  est une asymptote à la courbe  $(\varepsilon_k)$ .  
c) Étudier la position relative de  $(\varepsilon_k)$  et  $D_k$

### **Partie B :**

Étudier des cas particuliers  $k = 1$  et  $k = 2$

1.  $\alpha_k$  étant le nombre défini en (A : 1.b),  
montrer que  $\alpha_1 = 1$  et  $1.2 \leq \alpha_2 \leq 1.3$ .
2. a) Montrer que  $f_2(\alpha_2) = 2\alpha_2 - 2 - \frac{2}{\alpha_2}$   
b) Donner un encadrement de  $f(\alpha_2)$ .
3. Donner les tables de variation de  $f_1$  et  $f_2$ .
4. Représentation dans le repère  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  les droites  $(D_1)$  et  $D_2$ ,  
puis les courbes  $(C_1)$  et  $C_2$ .
5. Calculer en  $\text{cm}^2$ , la valeur exacte de l'aire, de la partie comprise entre  $(C_1)$  et les droites d'équations respectives  $x = 1$ ,  $x = 2$  et  $y = x - 1$ .

### **Partie C :**

1. Pour tout entier  $k$  non nul, et pour  $x \in ]0, +\infty[$ , calculer,  $f_{k+1}(x) - f_k(x)$ .  
Calculer la limite de cette différence lorsque  $x$  tend vers  $+\infty$ .
2. Soit  $h$  la fonction définie sur  $]0, +\infty[$  par  $h(x) = 1 - \frac{\ln(x)}{x}$ .  
a) Étudier le sens de variation de  $h$ ; préciser ses limites en 0 et en  $+\infty$ .  
b) Déduire que l'équation  $h(x) = 0$  admet une unique solution  $\beta$   
et que  $\beta \in ]0, 1[$ .

- c) Montrer que, pour tout entier  $k$  non nul,  $f_k(\beta) = \beta$ .
3. a) Montre que toutes les courbes  $(C_f)$  se coupent en un point  $A$  que l'on placera sur la figure.
- b) Pour  $k \in \mathbb{N}^*$ , préciser la position relatives de  $(C_{k+1})$  et  $(C_k)$ .

#### Exercice 1.4.8. .

**Partie A :** A tout entier naturel  $n$  non nul, on associe la fonction  $f_n$  définie sur  $] -\frac{1}{2}; +\infty$  par  $f_n(x) = (x - \frac{1}{2})^n \ln(x + \frac{1}{2})$ .

On désigne par  $(C_n)$  la courbe représentative de  $f_n$  dans la repère orthonormal  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  unité graphique 2cm ; on notera  $f'_n$  la dérivée de  $f_n$ .

1. Soit  $g_n$  la fonction définie sur  $] -\frac{1}{2}, +\infty[$  par  $g_n(x) = n \ln(x + \frac{1}{2}) + \frac{2x-1}{2x+1}$ .
  - a) Étudier les variations de la fonction  $g_n$ .
  - b) Calculer  $g_n(\frac{1}{2})$  et déterminer le signe de  $g_n$  sur  $] \frac{1}{2}; +\infty[$ .
2. a) Pour tout  $x \in ] \frac{1}{2}; +\infty[$ , montrer que :
  - $f'_1(x) = g_1(x)$ .
  - $f'_n = (x - \frac{1}{2})^{n-1} g_n(x)$ .
  - b) On suppose que  $n$  est impair. Étudier les variation de  $f_n$  et dresser son tableau de variation.
  - c) On suppose que  $n$  est pair. Étudier les variation de  $f_n$  et dresser son tableau de variation.
3. On suppose que la translation du plan de vecteur  $-\frac{1}{2}\vec{i}$ . On note  $(E_n)$  l'image de  $(C_n)$  par la translation  $T$ . Déterminer une équation cartésienne de  $(E_n)$ .
4. a) Étudier les positions relatives de  $(C_1)$  et  $(C_2)$ .
- b) Tracer les courbes  $(C_1)$  et  $(C_2)$ .

**Partie B :** On considère la suite  $(v_n)$  définie par :  $v_n = \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} (x - \frac{1}{2})^n \ln(x + \frac{1}{2}) dx$ .

1. Montrer que pour tout  $n \geq 1$ ,  $0 \leq v_n \leq \frac{\ln 2}{n+1}$   
En déduire la limite de la suite  $v_n$ .
2. À l'aide de l'intégration par partie, montrer que  $v_n = \frac{\ln 2}{n+1} - \frac{2^{-n}}{n+1} \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} \frac{(2x-1)^{n+1}}{2x+1} dx$ , pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ .
3. On pose pour  $n \geq 1$  et  $\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{3}{2}$ ,
 
$$s_n(x) = 1 - (x - \frac{1}{2}) + (x - \frac{1}{2})^2 + \dots + (-1)^n (x - \frac{1}{2})^n.$$
  - a) Montrer que :  $s_n(x) = \frac{2}{2x+1} + (-\frac{1}{2})^n \frac{(2x-1)^{n+1}}{2x+1}$ .
  - b) Déduit que :  $v_n = \frac{\ln 2}{n+1} - \frac{(-1)^{n-1}}{n+1} [\ln 2 - 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \dots + \frac{(-1)^{n+1}}{n+1}]$

On donne  $\ln 2 \simeq 0.69$ ,  $\ln 3 \simeq 1$ ,  $\ln 5 \simeq 1.61$ .

### Exercice 1.4.9. .

#### Partie A :

Soit  $f$  la fonction définie sur l'intervalle  $] - 1, +\infty[$  par :  $f(x) = \frac{x}{x+1} - 2 \ln(x+1)$

1. Calculer  $f'(x)$ , étudier son signe et en déduire le tableau de variation de la fonction  $f$ .
2. Calculer  $f(0)$ . Montre que l'équation  $f(x) = 0$  admet exactement deux solution dont l'une, que l'on désigne par  $\alpha$ , appartient à  $[-0.72; -0.71]$ .
3. Donner le signe de  $f(x)$ , pour  $x$  appartenant à  $] - 1, +\infty[$ .

#### Partie B :

Soit  $g$  la fonction définie sur l'ensemble  $] - 1; 0[ \cup ]0; +\infty[$  par  $g(x) = \frac{\ln(x+1)}{x^2}$ .

1. Calculer les limites de  $g(x)$  quand  $x$  tend vers  $0^-$ ,  $0^+$ ,  $-1$  et  $+\infty$ .
2. a) Calculer  $g'(x)$  et déduire, à l'aide de la partie A, son signe.  
b) Montrer que  $g(\alpha) = \frac{1}{2\alpha(\alpha+1)}$   
En déduire une valeur approchée de  $g(\alpha)$  en prenant  $\alpha = -0.715$ .
3. a) Dresser le tableau de variation de la fonction  $g$ .  
b) Représenter graphiquement la fonction  $g$  dans le plan rapporté à un repère orthonormal (unité graphique : 2cm).
4. Soit  $\alpha$  une réel strictement supérieur à 0. On pose :  $I(\alpha) = \int_1^\alpha g(x)dx$ .  
a) Donner, suivant les valeurs de  $\alpha$ , une interprétation géométrique du réel  $I(\alpha)$ .  
b) En remarquant que, pour  $x \in ]0, +\infty[ : \frac{1}{x(1+x)} = \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}$ .  
Calculer  $I(\alpha)$ . à l'aide d'une intégration par parties.  
c) Calculer  $\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} I(\alpha)$  et  $\lim_{\alpha \rightarrow 0} I(\alpha)$ .

### Exercice 1.4.10. .

#### Partie A :

Soit  $g$  la fonction définie sur l'intervalle  $[0; +\infty[$  par :  $g(x) = 2x^2 - (x^2 + 1) \ln(x^2 + 1)$ .

1. Montrer que  $g$  est dérivable sur l'intervalle  $[0; +\infty[$  et, en détaillant les calculs effectués, montrer que  $g'(x) = 2x - 2x \ln(x^2 + 1)$ .
2. Étudier le sens de variation de  $g$  sur l'intervalle  $[0; +\infty[$ .
3. Montrer qu'il existe un unique réel, que l'on notera  $\alpha$ , dans l'intervalle  $[\sqrt{e-1}, \sqrt{e^2-1}]$ , tel que  $g(\alpha) = 0$  ; donner l'approximation décimale à  $10^{-1}$  près par défaut de  $\alpha$ .
4. En déduire le signe de  $g(x)$ , pour  $x$  appartenant à l'intervalle  $]0; +\infty[$ .

#### Partie B :

La fonction  $f$  est définie sur  $[0; +\infty[$  par :  $f(0)$  et  $f(x) = \frac{\ln(1+x^2)}{x}$  si  $x \neq 0$ .

Montrer que  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$ .

En déduire que  $f$  est dérivable en 0 et donner la valeur de  $f'(0)$ .

1. a) Vérifier que, pour  $x$  strictement positif,  $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2(1+x^2)}$ .



- b) Dresser le tableau de variation de  $f$  sur l'intervalle  $[0; +\infty[$ .
- 2. a) Montrer que, pour  $x \geq 1$ ,  $0 \leq f(x) \leq \frac{|2x^2|}{x}$ .
- b) En déduire la limite de  $f$  en  $+\infty$ .

### **Partie C**

On note  $F$  la primitive de  $f$  sur l'intervalle  $[0; +\infty[$ , qui s'annule pour  $x = 1$ .

On rappelle que  $F(x) = \int_1^x f(t)dt$  : (On cherchera pas à calculer  $F(x)$ ).

1. a) Montrer que, pour  $x > 0$ ,  $f(x) \geq \frac{2\ln|x|}{x}$ .
- b) Calculer  $\int_1^x \frac{2\ln|x|}{x} dt$  pour  $x \geq 1$  et en déduire la limite de  $F$  en  $+\infty$ .
2. Dresser le tableau de variation de  $F$ .
3. Montrer que  $f(1) < F(2) < f(\alpha)$  et en déduire un encadrement de  $F(2)$ .  
(On prendra  $f(\alpha) \approx 0.8$ ).
4. On note  $I$  le point de coordonner  $(1; 0)$ ,  $A$  le point de  $(C)$  de coordonnées  $(1; \ln 2)$  et  $B$  le point de coordonnées  $(\ln 2; \ln 2)$ .
  - a) Vérifier que  $B$  appartient à la tangente à  $(C)$  en  $O$ .
  - b) Placer les points  $I$ ,  $A$  et  $B$  sur une figure et tracer les segments  $[OA]$ ,  $[OB]$ ,  $[BA]$  et  $[AI]$ .
  - c) On admet que, pour les abscisses appartenant à l'intervalle  $[0; 1]$ , la courbe  $(C)$  est située au-dessus de  $[OA]$  et au dessous de  $[OB]$  et de  $[BA]$ .  
Déterminer un encadrement de  $F(0)$ , d'amplitude inférieure à  $2 \times 10^{-1}$
5. Tracer la représentation graphique  $\Gamma$  de  $F$  en exploitant au maximum les résultats précédents ; on précisera notamment la tangente à  $\Gamma$  au point d'abscisse 1 en la traçant et en donnant son coefficient directeur.  
(Unité graphique : 2cm).

## 2 FONCTION EXPONENTIELLE

**Définition 2.1.** On appelle fonction exponentielle l'unique fonction définie sur  $\mathbb{R}$  telle que  $h' = h$  et  $h(0) = 1$ . On note cette fonction  $\exp$ .

**Conséquence :**  $\exp(0) = 1$ .

**Notation :** On note pour tout  $x$  réel  $\exp(x) = e^x$ . Donc  $\exp(1) = e = 2.718281828$ .

### 2.1 Propriété de la fonction exponentielle

#### 2.1.1 Relation fonctionnelle

**Théorème 2.1.** Pour tous réels  $x$  et  $y$ ,  $\exp(x + y) = \exp(x) \times \exp(y)$ .

### 2.2 Étude de la fonction exponentielle

#### 2.2.1 Signe

**Théorème 2.2.** La fonction exponentielle est positif dans  $\mathbb{R}$ .

#### 2.2.2 sens de variation

**Théorème 2.3.** La fonction exponentielle est une fonction croissante dans  $\mathbb{R}$ .

*Démonstration.* D'après la définition du fonction exponentielle  $(e^x)' = e^x$  comme  $e^x > 0$  (d'après le théorème précédent) donc  $e^x$  est croissante dans  $\mathbb{R}$ .  $\square$

#### 2.2.3 Propriété algébrique

**Théorème 2.4.** Pour tous réels  $x, y$  et  $n$  nombre entier naturel.

##### 1) Comparaison

- a.  $e^x = e^y$  est équivalent à  $x = y$
- b.  $e^x < e^y$  est équivalent à  $x < y$

**Exemples 2.1.** Résoudrez l'équation et l'inéquation suivant :

- i.  $e^{x^2-3x+2} = 1$
- ii.  $(e^x)^3 \leq e^{x+6}$

**Solution 2.1.** .

- i. Comme  $e^0 = 1$ , on a :  $e^{x^2-3x+2} = 1 \Leftrightarrow e^{x^2-3x+2} = e^0 \Rightarrow x^2 - 3x + 2 = 0$  Or  $1 - 3 + 2 = 0$  on a :  $x_1 = 1$  et  $x_2 = 2$  donc  $S = \{1, 2\}$
- ii.  $(e^x)^3 \leq e^{x+6} \Rightarrow e^{3x} \leq e^{x+6} \Rightarrow 3x \leq x + 6 \Rightarrow 2x \leq 6 \Rightarrow x \leq 3$  donc  $S = ] - \infty, 3]$ .

## 2) Règle opératoires

- a.  $e^{x+y} = e^x \times e^y$
- b.  $e^x \neq 0 \quad \frac{1}{e^x} = e^{-x}$
- c.  $e^y \neq 0 \quad \frac{e^x}{e^y} = e^{x-y}$
- d.  $e^{nx} = (e^x)^n$

### 2.2.4 Limites

#### Limite au borne

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0 \qquad \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$$

#### Limite de référence et Croissance comparée

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1 \qquad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty \qquad \lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$$

### 2.2.5 Dérivé de la fonction $e^s$

**Théorème 2.5.** Soit  $h$  une fonction dérivable sur  $I$ . Soit  $s$  une fonction définie par  $s(x) = e^{h(x)}$ . La fonction  $s$  est dérivable sur  $I$  et  $\forall x \in \mathbb{R}, s'(x) = h'(x)e^{h(x)}$ .

**Exemples 2.2.** Calculer la dérivée  $s'(x)$  de la fonction  $s(x) = e^{x^3-2x+1}$  définie sur  $\mathbb{R}$

**Solution 2.2.** D'après le théorème précédent  $s'(x) = (3x^2 - 2)e^{x^3-2x+1}$ .

**Propriété 2.1.** Soit  $h$  une fonction dérivable sur un intervalle  $I$ .

La fonction  $x \mapsto h(x)$  et  $x \mapsto e^{h(x)}$  ont le même sens de variation.

*Démonstration.* Soit  $s(x) = e^{h(x)} \Rightarrow s'(x) = h'(x)e^{h(x)}$  comme  $e^{h(x)} \geq 0$  donc  $s'(x)$  et  $h'(x)$  ont la même signe. Donc  $s(x)$  et  $h(x)$  ont la même sens de variation.  $\square$

#### Application 2. .

##### Partie A :

Le plans est munie d'un repère orthonormé  $(o, \vec{i}, \vec{j})$  tel que  $||\vec{i}|| = ||\vec{j}|| = 2cm$  .

On considère la fonction  $h$  définie dans  $\mathbb{R}$  par :

$$h(x) = (x + 2)e^{x-3} - 1$$

.

1. Calculer les limites au borne de  $D_h$ .

2. Dresser le tableau de variation de  $h(x)$  sur  $D_h$
3. Montrer que l'équation  $h(x) = 0$  admet une unique solutions dans  $\mathbb{R}$ .  
On note  $\alpha$  cette solution. Montrer que  $1.68 < \alpha < 1.71$ .
4. En déduire le signe de  $h(x)$  suivant la valeur de  $x$ .

**Partie B :**

On considère la fonction  $s$  définie sur  $D_s = \mathbb{R}$  par :

$$s(x) = x^2 e^{x-3} - \frac{x^2}{2}$$

1. Calculer les limites de  $s(x)$  aux borne de  $D_s$ .
2. Montrer que  $s'(x) = xh(x)$ .
3. Exprimer  $s(\alpha)$  en fonction de  $\alpha$ .
4. Dresser le tableau de variation de  $s(x)$ .
5. Déterminer les points d'intersections entre  $(\varepsilon_s)$  est les l'axe  $ox$  et l'axe  $oy$ .
6. Tracer la courbe  $(\varepsilon_s)$  .(On pendra  $\alpha = 1.69$ )

**Solution Application 2. .**

**Partie A :**

1.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = +\infty$  car  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x + 2 = +\infty$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{x-3} = +\infty$

comme  $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x + 2)e^{x-3} = 0$  donc  $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = -1$

2.  $h'(x) = e^{x-3} + (x + 2)e^{x-3} = (x + 3)e^{x-3} \geq 0$

$$h'(x) \geq 0 \Leftrightarrow (x + 3)e^{x-3} \geq 0 \Rightarrow x + 3 \geq 0 \Rightarrow x \geq -3$$

$x$	$-\infty$	$-3$	$+\infty$
$h'(x)$	$-$	$0$	$+$
$h(x)$	$-1$	$-e^{-6} - 1$	$+\infty$


3. la fonction  $h$  est continu décroissante sur  $]-\infty, -3[$  à valeur  $]-e^{-6} - 1, -1[$  et continu croissant sur  $]-3, +\infty[$  à valeur  $]-e^{-6} - 1, +\infty[$  donc d'après le théorème des valeur intermédiaire l'équation  $h(x) = 0$  admet une unique solution dans  $\mathbb{R}$ .  
Comme  $h(1.68) = -0.02$  et  $h(1.70) = 0.01$  donc  $1.68 \leq \alpha \leq 1.70$ .
4. D'après les deux questions précédent, on en déduit que  
 $h(x) \leq 0 \forall x \in ]-\infty, \alpha]$  et  $h(x) \geq 0 \forall x \in ]\alpha, +\infty[$

**Partie B :**

1.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} s(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2(e^{x-3} - \frac{1}{2}) = -\infty$  car  $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty$   
 et  $\lim_{x \rightarrow -\infty} (e^{x-3} - \frac{1}{2}) = -\frac{1}{2}$   
 $\lim_{x \rightarrow +\infty} s(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2(e^{x-3} - \frac{1}{2}) = +\infty$  car  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$   
 et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^{x-3} - \frac{1}{2}) = +\infty$ .
2.  $s'(x) = 2xe^{x-3} + x^2e^{x-3} - \frac{2x}{2} = (2x + x^2)e^{x-3} - x = x((x+2)e^{x-3} - 1) = xh(x)$ .
3.  $s(\alpha) = \alpha^2e^{\alpha-3} - \frac{\alpha^2}{2}$  comme  $h(\alpha) = 0$  on a :  $h(\alpha) = (\alpha+2)e^{\alpha-3} - 1 = 0 \Rightarrow e^{\alpha-3} = \frac{1}{\alpha+2}$   
 donc  $s(\alpha) = \frac{\alpha^2}{\alpha+2} - \frac{\alpha^2}{2}$
4.  $s'(x) \geq 0 \Leftrightarrow xh(x) \geq 0 \Rightarrow x \leq 0$  ou  $h(x) \geq 0$

$x$	$-\infty$	$0$	$\alpha$	$+\infty$
$h'(x)$		-	-	+
$x$		-	+	+
$s'(x)$		+	-	+
$s(x)$		$0$ $\nearrow$ $\searrow$ $\nearrow$ $-\infty$ $s(\alpha)$ $+\infty$		

5.  $s(0) = 0$  donc le point d'intersection entre la courbe et l'axe des ordonnées est le point  $A(0, 0)$   
 $s(x) = 0 \Leftrightarrow x^2e^{x-3} - \frac{x^2}{2} = 0 \Rightarrow x^2(e^{x-3} - \frac{1}{2}) = 0 \Rightarrow x = 0$  ou  $e^{x-3} = \frac{1}{2} \Rightarrow x = \ln(\frac{1}{2}) + 3$ .  
 Donc les points d'intersections entre la courbe et l'axe des abscisses sont le point  $A(0, 0)$   
 et le point  $B(\ln(\frac{1}{2}) + 3, 0)$
6. Représentation graphique :



## 2.3 Exercice

**Exercice 2.3.1.** 1. Simplifier les expressions suivantes :

$$(e^x)^3 e^{-2x} \quad \frac{e^{1+x}}{e^{x+2}} \quad \frac{e^{2x+1}}{e^{-2x}} \quad \frac{e^{3x-1}}{e^{2-x}}$$

$$\frac{e^{3x+e^x}}{e^{2x+e^x}} \quad \left(\frac{e}{e^{-x}}\right) \quad \sqrt{\frac{20e^{5x}}{5e^{-4x}}} \quad \sqrt{\frac{3e^{x-1}}{e^{2x+1}}}$$

2. Prouver, que pour tout  $x \in \mathbb{R}$  :

$$\frac{1-e^{-2x}}{1+e^{-2x}} = \frac{e^{2x}-1}{e^{2x}+1} \quad \frac{e^{2x}-1}{e^x+1} = e^x \frac{1-e^{-2x}}{1+e^{-x}} \quad (e^x + e^{-x})^2 - (e^x - e^{-x})^2 = 4$$

$$e^{-x} - e^{-2x} = \frac{e^x-1}{e^{2x}} \quad (e^x + e^{-x})^2 - 2 = \frac{e^{4x}+1}{e^{2x}}$$

**Exercice 2.3.2.** Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les équations et inéquations suivantes :

$$e^{2-x} = e^x \quad (e^x)^3 = e^{x-1} \quad e^x + e^{1-x} - (e+1) = 0 \quad 2e^{2x} - e^x = 1$$

$$e^{5-x^2} = e \quad \frac{e^{-x}-3}{e^{-x}-5} = \frac{1}{2} \quad 2e^{-x} = \frac{1}{e^x+1} \quad e^{6x} + 2e^{3x} - 3 = 0$$

$$1 - e^{x-2} \geq 0 \quad e^{2x-1} > \sqrt{e} \quad e^x < e^{-x} + 1 \quad e^x - \frac{1}{e^x} \leq 0$$

$$\frac{1}{e^x} - e > 0 \quad \frac{2e^x-3}{e^x-3} < \frac{1}{3} \quad 4e^{2x} < 3e^x + 1 \quad e^{2x} + 2e^x - 3 \leq 0$$

**Exercice 2.3.3.** Déterminer les limites aux bornes de l'ensemble de définition, puis calculer les dérivées et tracer les tableaux de variation des fonctions suivants.

$$f_1(x) = \frac{e^x+1}{e^x+2} \quad f_2(x) = \frac{1}{x} e^{\frac{1}{x}} \quad f_3(x) = \frac{\sqrt{e^x+2}}{x} \quad f_4(x) = (x+1)e^{x+3}$$

$$f_5(x) = \frac{-2e^x}{1+e^x} \quad f_6(x) = e^{2x} - (x+1)e^x \quad f_7(x) = \frac{e^{2x}-1}{5x} \quad f_8(x) = x^2 e^{-2x}$$

$$f_9(x) = x + e^x \quad f_{10}(x) = (0, 4x-2)e^{-0.1x} \quad f_{11}(x) = e^{x^2} - e^{3x+4} \quad f_{12}(x) = \frac{e^x}{(x+1)^2}$$

**Exercice 2.3.4.** .

### Partie A :

On considère la fonction  $g$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $g(x) = (1-x)e^x - 1$

1. Dresser le tableau de variation de  $g$ .
2. Étudier le signe de  $g$

### Partie B :

Soit la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par :  $\begin{cases} f(x) = \frac{x}{e^x-1} + 2 \text{ si } x \neq 0 \\ f(0) = 3 \end{cases}$

On désigne par  $(\varepsilon)$  la courbe représentatif de  $f$  dans le plan muni d'un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$

On admettra que  $f$  est dérivable en 0 et  $f'(0) = \frac{1}{2}$

1. a) Déterminer la limite de  $f$  en  $-\infty$

b) Établir que  $\frac{x}{e^x-1} \times \frac{1}{1-e^{-x}}$  puis déterminer la limite de  $f$  en  $+\infty$ .

En déduire que  $(\varepsilon)$  admet une asymptote horizontale en  $+\infty$  dont on donnera une équation.

c) Montrer que la droite  $(D)$  d'équation  $y = -x + 2$  est une asymptote oblique à la courbe  $(\varepsilon)$  en  $-\infty$ .

2. Pour  $x$  non nul, montrer que  $f'(x) = \frac{g(x)}{(e^x-1)^2}$

3. Dresser le tableau de variation de  $f(x)$ .

4. Soit  $(T)$  la tangente à  $(\varepsilon)$  au point d'abscisse nulle. Écrire une équation de  $(T)$

6. Tracer  $(D)$ ,  $(T)$  et  $(\varepsilon)$

### **Partie C :**

Soit la fonction  $h$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $h(x) = f(x) - x$

1. Montrer que l'équation  $h(x) = 0$  admet une solution unique  $\alpha \in [2, 2.5[$ .

2. On pose  $I = [2, 2.5]$

a) Démontrer que pour tout  $x$  de  $I$ , on a :  $g(x) \geq -20$  et  $e^x - 1 \geq 40$ .

b) En déduire que si  $x \in I$   $-\frac{1}{2} \leq f'(x) \leq 0$ .

3. Soit  $(u_n)$  la suite définie sur  $\mathbb{N}$  par :  $\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$

a) Montrer par récurrence que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_n \in I$ .

b) Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $|u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{2}|u_n - \alpha|$  et  $|u_n - \alpha| \leq (\frac{1}{2})^{n+1}$

c) En déduire que  $u_n$  converge vers  $\alpha$

d) Déterminer le plus petit entier  $n_0$  tel que pour tout  $n \geq n_0$  on a :  $|u_n - \alpha| \leq 10^{-3}$ .

### **Exercice 2.3.5. .**

#### **Partie A :**

Soit  $g$  la fonction numérique  $f$  définie par :  $g(x) = (x-1)e^x + 1$

1. Dresser le tableau de variation de  $g(x)$ .

2. En déduire le signe de  $g(x)$  sur  $\mathbb{R}$ .

#### **Partie B :**

On considère la fonction numérique définie par :  $f(x) = (x-2)e^x + x$ .

$(\varepsilon)$  désigne la courbe représentative de  $f$  dans un repère orthonormé du plan.

1. a) Calculer les limites de  $f$  en  $-\infty$  et en  $+\infty$

b) Montrer que la droite  $(\Delta)$  d'équation  $y = x$  est une asymptote à  $(\varepsilon)$  en  $-\infty$ .  
Étudier la branche infinie à  $(\varepsilon)$  en  $+\infty$ .

- c) Étudie en fonction de  $x$  la position de  $(\varepsilon_f)$  et de  $(\Delta)$
2. a) Montrer que  $f'(x) = g(x)$ , en déduire le sens de variation de  $f$  sur  $\mathbb{R}$ .  
 b) Justifier que la fonction  $f$  définit une bijection de  $\mathbb{R}$  vers un intervalle à préciser.  
 c) Dresser les tableaux de variation de  $f$  et de  $f^{-1}$  bijection réciproque de  $f$ .
3. a) Donner une équation cartésienne de la tangente de  $(t)$  à  $(\varepsilon_f)$  au point d'abscisse 0.  
 b) Construire  $(\varepsilon_f)$  et  $(\varepsilon_{f^{-1}})$  dans une même repère orthonormé.
4.  $D$  est le domaine du plan limité par la courbe  $(\varepsilon_f)$ , la droite d'équation  $y = x$  et les droites respectives  $x = 0$ ,  $x = 2$ . En utilisant une intégration par partie, calcule l'aire  $A$  du domaine.

### Exercice 2.3.6. .

#### Partie A :

Soit  $g$  la fonction définie par :  $g(x) = 2 - xe^x$  sur  $\mathbb{R}$ .

1. Dresser le tableau de variation de  $g$ . En précisant les limites de  $g$  en  $-\infty$  et en  $+\infty$ .
2. Montrer que l'équation  $g(x) = 0$  admet une unique solution  $\alpha$  telle que  $0.8 \leq \alpha \leq 0.9$ .
3. Déduire le signe de  $g$  sur  $\mathbb{R}$ .

#### Partie B :

On considère la fonction  $f$  définie dans  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = \frac{2x-2}{e^x-2}$  et  $(\varepsilon_f)$  la courbe représentative de  $f$  dans un repère orthonormé unité 2cm.

1. a) Calculer la limite de  $f$  en  $-\infty$ .  
 b) Calculer la limite de  $f$  en  $+\infty$ , déduit que la droite  $(\Delta')$  d'équation  $y = x + 1$  est asymptote de  $(\varepsilon_f)$ .
2. Étudie la position relative de  $(\varepsilon_f)$ ,  $(\Delta)$  et  $(\Delta')$  avec  $(\Delta) : y = x$ .
3. a) Montre que  $f'(x) = \frac{2g(x)}{(e^x+2)^2}$ .  
 b) Montre que  $f(\alpha) = \alpha$ .
4. Tracer dans un repère orthonormé la droite  $(\Delta)$ ,  $(\Delta')$  et la courbe  $(\varepsilon)$ .

#### Partie C :

1. Soit la fonction  $h(x) = 0$  admet une solution unique  $\alpha$  tel que  $\alpha \in [0.8, .09]$ .
2. On pose  $I = [0.8, 0.9]$ . Montre que  $|f'(x)| \leq \frac{1}{50}$ .
3. On considère la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  définie par :  $\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$   
 a) Montrer par récurrence que  $\forall n \ u_n \in I$ .



- b) Montrer que  $\forall n \in \mathbb{N} \quad |u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{50} |u_n - \alpha|$  et  $|u_n - \alpha| \leq (\frac{1}{50})^n$ .  
 c) En déduire que  $u_n$  converge vers  $\alpha$ .  
 d) Déterminer le plus petit entier  $n_0$  telle que  $\forall n \geq n_0 \quad |u_n - \alpha| \leq 10^{-3}$ .

**Exercice 2.3.7.** On considère la fonction numérique  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par :

$$f(x) = 2x + 1 - xe^{x-1}.$$

On note  $(C)$  sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthonormal  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

**Partie A :**

1. Étudier la limite de la fonction  $f$  en  $-\infty$  puis en  $+\infty$   
 (on pourra écrire  $xe^{x-1} = \frac{1}{e}xe^x$ ).
2. Démontrer que la droite  $\Delta$  d'équation  $y = 2x + 1$  est asymptote à la courbe  $(C)$  en  $-\infty$  et préciser la position de la courbe  $(C)$  par rapport à la droite  $\Delta$ .
3. a) Calculer la dérivée  $f'$  et la dérivée seconde  $f''$  de la fonction  $f$ .  
 b) Dresser le tableau de variation de la fonction  $f'$  en précisant les limites de la fonction  $f'$  en  $-\infty$  et en  $+\infty$   
 c) Calculer  $f'(1)$  et en déduire le signe de  $f'$  pour tout réel  $x$ .  
 d) Dresser le tableau de variation de la fonction  $f$ .
4. Soit  $I$  l'intervalle  $[1.9; 2]$ . Démontrer que, sur  $I$ , l'équation  $f(x) = 0$  a une solution unique  $\alpha$ .
5. Tracer la droite  $\Delta$  et la courbe  $(C)$  (unité graphique : 2 cm).

**Partie B :**

On considère la fonction  $g$  définie sur l'intervalle  $I$  par :  $g(x) = 1 + \ln(2 + \frac{1}{x})$ .

1. Démontrer que, sur  $I$ , l'équation  $f(x) = 0$  équivaut à l'équation  $g(x) = x$ .
2. Étudier le sens de variation de la fonction  $g$  sur  $I$  et démontrer que, pour tout  $x$  appartenant à  $I$ ,  $g(x)$  appartient à  $I$ .
3. Démontrer que, pour tout  $x$  de l'intervalle  $I$ ,  $|g'(x)| \leq \frac{1}{9}$ .
4. Soit  $(U_n)$  la suite de nombres réels définie par :  $U_0 = 0$  et, pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$ ,  $U_{n+1} = g(U_n)$ .

On déduit de la question B 2. que tous les termes de cette suite appartiennent à l'intervalle  $I$ . On ne demande pas de le démontrer.

- a) Démontrer que, pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$ ,  $|U_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{9} |U_n - \alpha|$ .
- b) En déduire, en raisonnant par récurrence, que : pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$ ,  $|U_n - \alpha| \leq (\frac{1}{9})^n \times \frac{1}{10}$ .
- c) En déduire que la suite  $(u_n)$  converge et préciser sa limite.

### Exercice 2.3.8. .

#### Partie A :

Soit  $g$  la fonction dérivable et définie sur  $\mathbb{R}$  par :  $g(x) = -1 + (2 - 2x)e^{-2x+3}$ .

1. Calculer les limites de  $g$  en  $-\infty$  et  $+\infty$ .
2. a) Soit  $g'$  la fonction dérivée de  $g$ . Justifier que :  $\forall x \in \mathbb{R}, g(x)(4x - 6)e^{-2x+3}$ .  
b) Étudier le signe de  $g'(x)$  suivant les valeurs de  $x$ .  
c) Justifier que :  $g(\frac{3}{2}) = -2$ .  
d) Dresser le tableau de variations de  $g$ .
3. a) Démontrer que l'équation  $g(x) = 0$  admet dans  $\mathbb{R}$  une solution unique notée  $\alpha$ .  
b) Vérifier que :  $0.86 < \alpha < 0.87$ .  
c) Justifier que :  $\forall x \in ]-\infty; \alpha, g(x) > 0$  et  $\forall x \in ]\alpha; +\infty[, g(x) < 0$ .

#### Partie B :

Le plan est muni d'un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ , (unité graphique : 2 cm).

On considère la fonction  $f$  dérivable et définie sur par :  $f(x) = -x + (x - \frac{1}{2})e^{-2x+3}$ .

On note  $(C)$  la courbe représentative de  $f$ .

1. a) Calculer  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$  et  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$ .  
b) En déduire que  $(C)$  admet une branche parabolique de direction celle de  $(OJ)$  en  $-\infty$ .
2. a) Calculer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ .  
b) Démontrer que la droite  $(D)$  d'équation  $y = -x$  est asymptote à  $(C)$  en  $+\infty$ .  
c) Étudier la position de  $(C)$  par rapport à  $(D)$ .
3. a) Soit  $f'$  la fonction dérivée de  $f$ . Démontrer que :  $\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = g(x)$ .  
b) En déduire les variations de  $f$ .  
c) Dresser le tableau de variations de  $f$ . On ne calculera pas  $f(\alpha)$ .
4. Construire  $(D)$  et  $(C)$  sur le même graphique. On précisera les points de  $(C)$  d'abscisses  $0; \frac{1}{2}; \frac{3}{2}; 4$ .

on prendra :  $\alpha = 0.865$  et  $f(\alpha) = 0.4$ .

5. Soit  $t$  un nombre réel strictement supérieur à  $\frac{3}{2}$ . On désigne par  $\mathbb{A}$  l'aire en  $\text{cm}^2$  de la partie du plan limitée par la courbe  $(C)$ , la droite  $(D)$  et les droites d'équations  $x = \frac{3}{2}$  et  $x = t$ .

On pose :  $I_t = \int_{\frac{3}{2}}^t (x - \frac{1}{2})e^{-2x+3} dx$ .

- a) À l'aide d'une intégration par parties, justifier que :  $I_t = \frac{3}{4} - \frac{t}{2}e^{-2t+3}$ .
- b) En déduire  $\mathbb{A}(t)$ .
- c) Calculer  $\lim_{t \rightarrow +\infty} \mathbb{A}(t)$ .

**Exercice 2.3.9.** Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = x - 1 + (x^2 + 2)e^{-x}$ .

On note  $C$  la courbe représentative de  $f$  dans un repère orthonormal  $(O, \vec{i}, \vec{j})$

(unité graphique 2cm).

**Partie 1 :**

Soit  $g$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par :  $g(x) = 1 - (x^2 - 2x + 2)e^{-x}$ .

1. Étudie les limites de  $g$  en  $-\infty$  et en  $+\infty$ .
2. Calculer la dérivée de  $g$  et déterminer son signe.
3. En déduire le tableau de variation de  $g$ .
4. Démontrer que l'équation  $g(x) = 0$  admet une unique solution  $\alpha$  dans  $\mathbb{R}$  puis justifier que  $0,35 \leq \alpha \leq 0,36$ .
5. En déduire le signe de  $g$ .

**Partie B :**

1. Étudie les limites de  $f$  en  $-\infty$  et en  $+\infty$ .
2. Déterminer  $f'(x)$  pour tout  $x$  réel.
3. En déduire, à l'aide de la partie A, les variations de  $f$  et donner son tableau de variation.
4. a) Démontre que :  $f(\alpha) = \alpha(1 + 2e^{-\alpha})$ .  
b) A l'aide de l'encadrement de  $\alpha$  déterminer un encadrement de  $f(\alpha)$  d'amplitude  $4 \times 10^{-2}$ .
5. Démontrer que la droite  $\Delta$  d'équation  $y = x - 1$  est asymptote à  $C$  en  $+\infty$ .

Préciser la position de  $\mathbb{C}$  par rapport à  $\Delta$ .

6. Donner une équation de la tangente  $T$  à  $C$  au point point d'abscisse 0.
7. Tracer  $\Delta$ ,  $T$  puis  $C$ .
8. a) Déterminer des réels  $a$ ,  $b$  et  $c$  tels que la fonction  $P$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $P(x) = (ax^2 + bx + c)e^{-x}$ .

Soit une primitive de  $\mathbb{R}$  de la fonction  $x \rightarrow (x^2 + 2)e^{-x}$ .

- b) Calculer en fonction de  $\alpha$  l'aire  $\mathbb{A}$  en  $\text{cm}^2$  de la partie du plan limitée par  $(C)$ ,  $\Delta$  et les droites d'équation  $x = -\alpha$  et  $x = 0$ .
- c) Justifie que  $\mathbb{A} = 4e^{2\alpha} + 8e^{\alpha} - 16$ .

**Partie C :**

1. Démontrer que pour tout  $x$  de  $[1; 2]$  :  $1 \leq f(x) \leq 2$ .
2. Démontrer que pour tout  $x$  de  $[1; 2]$  :  $0 \leq f'(x) \leq \frac{3}{4}$ .
3. En utilisant le sens de variation de la fonction  $h$  définie sur  $[1; 2]$  par :  $h(x) = f(x) - x$ .  
Démontrer que l'équation  $f(x) = x$  admet une solution unique  $\beta$  dans  $[1; 2]$ .
4. Soit  $(u_n)$  la suite numérique définie par  $u_0 = 1$  et pour tout entier naturel  $n$   $u_{n+1} = f(u_n)$ .

- a) Démontrer que pour tout entier naturel  $n$ ,  $1 \leq u_n \leq 2$ .
- b) Démontrer que pour tout entier naturel  $n$ ,  $|u_{n+1} - \beta| \leq \frac{3}{4}|u_n - \beta|$ .
- c) Démontrer que pour tout entier naturel  $n$ ,  $|u_n - \beta| \leq (\frac{3}{4})^n$ .
- d) En déduire que la suite  $(u_n)$  est convergente et donner sa limite.
- e) Trouver un entier  $n_0$  tel que pour tout entier naturel  $n$  supérieur ou égal à  $n_0$ , on ait :  $|u_n - \beta| \leq 10^{-2}$ .

### Exercice 2.3.10. .

#### Partie A :

Soit la fonction  $g$ , définie sur  $\mathbb{R}$ , qui à tout  $x$ , associe :  $g(x) = e^x(x - 1) + x^2$ .

1.
  - a) Montrer que la dérivée de la fonction  $g$  sur  $\mathbb{R}$  est :  $g'(x) = x(e^x + 2)$ .
  - b) Déterminer les limites de  $g$  en  $+\infty$  et en  $-\infty$ .
  - c) Étudier le signe de  $g'(x)$  sur  $\mathbb{R}$ , et dresser le tableau de variation de  $g$  sur  $\mathbb{R}$ .
2. Montrer que l'équation  $g(x) = 0$  admet une solution  $\alpha$  et une seule sur l'intervalle  $[0; +\infty[$ . Montrer que  $\alpha$  est dans l'intervalle  $I = [\frac{1}{2}; 1]$ .

#### Partie B :

Soit la fonction  $f$  définie sur  $[0; +\infty[$  par  $f(x) = \frac{e^x}{e^x + x}$ .

1. Montrer que les équation  $f(x) = x$  et  $g(x) = 0$  sont équivalentes sur  $[0; +\infty[$ , et que par la suite, l'équation  $f(x) = x$  admet  $\alpha$  pour solution unique sur  $I$ .
2.
  - a) Calculer la dérivée de  $f$  et en déduire le sens de variation de  $f$  sur  $[0; +\infty[$ .
  - b) Déterminer la limite de  $f$  en  $+\infty$ .
  - c) Dresser le tableau de variation de  $f$ .
  - d) Construire la courbe représentative  $C$  de  $f$  sur  $[0; +\infty[$  dans un repère orthonormal (unité 2cm). On indiquera en particulier les tangentes à  $C$  aux point d'abscisses 0 et 1.

#### Partie C :

1. Montrer que, pour tout  $x$  appartenant à  $I$ ,  $f(x)$  appartient à  $I$ .
2. Soit la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  définie par  $u_1 = \frac{1}{2}$  et  $u_n = f(u_{n+1})$  pour tout  $n > 1$ .
  - a) Montrer que, pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $u_n \in I$ .
  - b) Montrer que, pour tout  $x \in I$ ,  $|f'(x)| \leq \frac{1}{2}$ .
  - c) En appliquant le théorème de l'inégalité des accroissement finis, démontrer que :  $\forall n > 1, |u_n - \alpha| \leq \frac{1}{2}|u_{n-1} - \alpha|$ .
  - d) En déduire, par un raisonnement par récurrence, que :  $\forall n \in \mathbb{N}^*, |u_n - \alpha| \leq (\frac{1}{2})^n$ .
  - e) En déduire que  $(u_n)$  converge vers  $\alpha$ .
  - f) À priori, combien suffit-il de calculer de termes de la suite pour obtenir une valeur approchée de  $\alpha$  à  $10^{-7}$  près ?
3. En utilisant la décroissance de  $f$ , montrer que  $\alpha$  est compris entre deux termes consécutifs quelconques de la suite. En déduire un encadrement de  $\alpha$  d'amplitude  $10^{-7}$ .

## 3 Nombre complexe

### 3.1 Définition et règles de calcul

**Définition 3.1.** On appelle nombre complexe qu'on note  $z$ , tout nombre de la forme  $ai + b$  Où  $a, b \in \mathbb{R}$  et  $i^2 = -1$ .

Le nombre réel  $a$  est dit partie *réelle* de  $z$  et se note  $R_e(z)$ .

Le nombre réel  $b$  est dit partie *imaginaire* de  $z$  et se note  $I_m(z)$ .


L'ensemble des nombres complexe se note  $\mathbb{C}$ , il contient  $\mathbb{R}$ .

Deux nombres complexe  $z$  et  $z'$  sont égaux si et seulement si  $R_e(z) = R_e(z')$  et  $I_m(z) = I_m(z')$ .

Si  $a = 0$ ,  $z = ib$ , on dit que  $z$  est un nombre imaginaire pur.

Si  $b = 0$ ,  $z = a$ , on dit que  $z$  est un nombre réel.

#### 3.1.1 Représentation graphique



Tout nombre  $z \in \mathbb{C}$ ,  $z = ai + b$  on peut associer, le point  $M$  du plan de coordonnées  $(a, b)$ . cette correspondance est bijective.

On dit que  $z$  est l'affixe du point  $M$ . Soit  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  le plan est muni d'un repère orthonormé. L'axe des abscisses des points  $M$  dans cette correspondance est l'axe des réels et des ordonnées, l'axe des imaginaires.

#### 3.1.2 règles de calcul

##### **Addition**

soit  $z = a + ib$  et  $z' = a' + ib'$ , alors :

$$\bullet z + z' = (a + a') + i(b + b') \quad \bullet z + z' = z' + z \quad \bullet z + (z' + z'') = (z + z') + z''$$

### **Multiplication**

Si  $z = a + ib$  et  $z' = a' + ib'$  alors :

$$\bullet z \times z' = z' \times z \quad \bullet z \times (z' \times z'') = (z \times z') \times z'' \quad \bullet z \times 1 = 1 \times z$$

Tout nombre complexe  $z$  admet un opposé  $z'$  au sens que  $z + z' = 0$ , avec  $z' = -a - ib$

De même, tout nombre complexe non nul  $z$  admet un inverse  $z'$  au sens  $z \times z' = 1$ .

On a aussi,  $z \times z' = 0$  si et seulement si  $z = 0$  ou  $z' = 0$ .

**Définition 3.2.** L'ensemble des nombres complexes ( $\mathbb{C}$ ) est un corps commutatif. Soit  $z = a + ib$ , on a  $(a + ib)(a - ib) = a^2 + b^2$ , on note  $\bar{z}$  le nombre  $a - ib$  qu'on appelle nombre complexe conjugué de  $z$ .

Si  $z = a + ib$  alors on a les propriétés suivantes :  $\bullet \bar{\bar{z}} = z \quad \bullet z + \bar{z} = 2a = 2\mathbb{R}$

$$\bullet \overline{z + z'} = \bar{z} + \bar{z'} \quad \bullet \overline{z \times z'} = \bar{z} \times \bar{z'}$$

**Définition :** Le nombre  $\sqrt{a^2 + b^2}$  est le *module* du nombre complexe  $z = a + ib$ , on note  $|z|$ .

$$\bullet |z|^2 = z\bar{z} \quad \bullet \frac{\bar{z}}{z'} = \frac{\bar{\bar{z}}}{\bar{z'}} \quad \bullet \overline{(z^n)} = \bar{z}^n$$

### **3.1.3 Forme trigonométrique**

On dit que  $z = a + ib$  est donnée sous forme algébrique. Soit  $M$  un point du plan.

Dans un repère orthonormé  $M$  est repéré par ces coordonnées  $(a, b)$ . On peut aussi repérer  $M$  par ses coordonnées polaires.  $r = OM$  et  $\theta = (\vec{OI}; \vec{OM})$

**Théorème 3.1.** Soit  $z \in \mathbb{C}$ ,  $z \neq 0$  de forme algébrique  $z = a + ib$ .

Soit  $M$  le point du plan d'affixe  $z$  dans le repère  $(O; \vec{OI}; \vec{OJ})$  orienté.  $\theta$  est la mesure en radian de  $(\vec{OI}; \vec{OM})$  alors : 
$$\begin{cases} a = |z| \cos \theta \\ b = |z| \sin \theta \end{cases}$$

Donc on appelle forme trigonométrique l'expression

$$z = |z|(\cos \theta + i \sin \theta)$$

**Exemples 3.1.** Donner la forme trigonométrique de  $Z = 2 + 2i$ .

**Solution 3.1.**  $|z| = \sqrt{2^2 + 2^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$   $\cos(\theta) = \frac{2}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ,  $\sin(\theta) = \frac{2}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$  donc  $\theta = \frac{\pi}{4}$

$$\text{Donc } Z = 2\sqrt{2}(\cos(\frac{\pi}{4}) + i \sin(\frac{\pi}{4}))$$

**Définition 3.3.** Soit  $\theta$  l'argument de  $z$  on le note  $\arg(z)$  de la forme trigonométrique (ou polaire) de  $z$ .

On pose :  $e^{i\theta} = (\cos\theta + i\sin\theta)$ , alors :  $e^{i\theta}$  est un nombre complexe de module 1 et d'argument  $\theta$ . De même,  $\forall z \in \mathbb{C}, z \neq 0, z$  s'écrit  $z = |z|e^{i\theta}$ .

### Propriété 3.1. .

- a)  $e^{i(\theta+\theta')} = e^{i\theta} \times e^{i\theta'}$
- b)  $e^{i\theta}$  et  $e^{i\theta'}$  sont inverses si et seulement si  $\theta = -\theta' + 2k\pi$ .
- c)  $\forall \theta, \theta' \in \mathbb{R}, e^{i\theta} = e^{i\theta'}$  si et seulement si  $\theta = \theta' + 2k\pi$

### Formule d'Euler :

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}, \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

**Formule de Moivre :**  $\forall n \in \mathbb{N}$  et  $\forall \theta \in \mathbb{R}$ , on a :

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$$

## 3.2 Résolution d'une équation de seconde degré

- a) On veut résoudre dans  $\mathbb{C}$ , l'équation :  $z^2 = -3$  ( $= 3i^2$ ).  
C'est à dire  $z^2 + 3 = 0 \Rightarrow z^2 - 3i^2 = (z + i\sqrt{3})(z - i\sqrt{3}) \Rightarrow z = \pm i\sqrt{3}$
- b) **résolution de l'équation**  $ax^2 + bx + c = 0$  avec  $a, b, c \in \mathbb{R}$  et  $a \neq 0$

On a :  $\Delta = b^2 - 4ac$

Si  $\Delta > 0$ , il y a deux solutions réels distinctes  $z_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$

Si  $\Delta = 0$ , il y a une solution réels double  $z_0 = \frac{-b}{2a}$

Si  $\Delta < 0$ , il y a deux solutions complexe distinctes  $z_{1,2} = \frac{-b \pm i\sqrt{\Delta}}{2a}$

**Exemples 3.2.**  $x^2 - 2x + 3 = 0$ .

**Solution 3.2.**  $\Delta = 4 - 12 = -8$ , donc  $x_1 = \frac{2 - i\sqrt{8}}{2} = \frac{2 - 2i\sqrt{2}}{2} = 1 - i\sqrt{2}$  et  $x_2 = 1 + i\sqrt{2}$

- c) **Cas où**  $a, b, c \in \mathbb{C}$

Si  $a, b, c \in \mathbb{C}, \Delta = b^2 - 4ac \in \mathbb{C}$ , on cherche  $\delta = \alpha + i\beta$  tel que  $\delta^2 = \Delta$ .

On trouve un tel  $\delta$  alors la formule est valable avec  $a, b, c \in \mathbb{C}$ , et on a :  $z_{1,2} = \frac{-b \pm \delta}{2a}$

- d) **Équation de type**  $z^2 = a + ib$

Pour résoudre une équation de type  $z^2 = a + ib$ ,

on pose  $z = \alpha + i\beta$  et on calcule  $z^2 = (\alpha + i\beta)^2 = \alpha^2 - \beta^2 + 2i\alpha\beta$  et

$|z^2| = (\sqrt{\alpha^2 + \beta^2})^2 = \alpha^2 + \beta^2$  et par identification on trouve :

$$\begin{cases} \alpha^2 - \beta^2 &= a \\ 2\alpha\beta &= b \\ \alpha^2 + \beta^2 &= \sqrt{a^2 + b^2} \end{cases}$$

Pour finir, on résout le système pour trouver  $\alpha$  et  $\beta$ .

**Exemples 3.3.** Résoudre l'équation  $z^2 = 8 - 6i$ .

**Solution 3.3.** Soit  $z = \alpha + i\beta$ , on a :

$$\begin{cases} \alpha^2 - \beta^2 &= 8(1) \\ 2\alpha\beta &= -6(2) \\ \alpha^2 + \beta^2 &= 10(3) \end{cases}$$

(1) + (3)  $\Rightarrow 2\alpha^2 = 18 \Rightarrow \alpha = \pm 3$  d'après (2)  $\beta = \pm 1$  donc  $S = \{-3 + i; 3 - i\}$ .

e) **Équation de type**  $az^3 + bz^2 + cz + d = 0$  avec  $a \neq 0$

Pour résoudre une équation de type (E) :  $az^3 + bz^2 + cz + d = 0$ , il y a trois possibilités :

- (E) admet une solution **réel** ( $\beta$ )
- (E) admet une solution **imaginaire pure** ( $i\alpha$ )
- (E) admet une solution complexe que l'on vous demande à vérifier ( $\beta + i\alpha$ ).

**Exemples 3.4. Exemple :** On pose :  $\forall z \in \mathbb{C}, (E) : z^3 + (1 - i)z^2 + (2 + 2i)z - 8i = 0$ .

1. Montre que (E) admet une et unique solution imaginaire pure que l'on déterminera.
2. Déterminer les nombres complexes  $a$  et  $b$  tels que :  $\forall z \in \mathbb{C}, (E) : (z + 2i)(z^2 + az + b) = 0$
3. Résoudre l'équation (E).

**Solution 3.4.** 1. (E) admet une solution imaginaire pure si et seulement si il existe un  $\alpha$  tels que  $(\alpha i)^3 + (1 - i)(\alpha i)^2 + (2 + 2i)\alpha i - 8i = 0 \Rightarrow -i\alpha^3 - \alpha^2 + i\alpha^2 + 2i\alpha - 2\alpha - 8i = 0$

$$0 \Rightarrow (-\alpha^2 - 2\alpha) + i(-\alpha^3 + \alpha^2 + 2\alpha - 8) = 0 \Rightarrow \begin{cases} -\alpha^2 - 2\alpha &= 0(1) \\ (-\alpha^3 + \alpha^2 + 2\alpha - 8) &= 0(2) \end{cases}$$

D'après (1)  $\alpha = 0$  ou  $\alpha = -2$

Pour  $\alpha = 0$  dans (2) on trouve  $-0^3 + 0^2 + 2 \times 0 - 8 = -8 \neq 0$

Pour  $\alpha = -2$  dans (2) on trouve  $-(-2)^3 + (-2)^2 + 2(-2) - 8 = 8 + 4 - 4 - 8 = 0$  Donc  $\alpha = -2$

2. .

	1	$1 - i$	$2 + 2i$	$-8i$
$-2i$	$\downarrow$	$-2i$	$-6 - 2i$	$8i$
	1	$1 - 3i$	$-4$	0

Donc  $a = 1 - 3i$  et  $b = -4$  et (E) :  $(z + 2i)(z^2 + (1 - 3i)z - 4) = 0$

3.  $(z + 2i)(z^2 + (1 - 3i)z - 4) = 0$ , Pour  $z^2 + (1 - 3i)z - 4 = 0$

On a  $\Delta = (1 - 3i)^2 - 4(-4) = 1 - 6i - 9 + 16 = 8 - 6i$

$z_1 = -2 + 2i$  et  $z_2 = 1 + i$  ( $z_1$  et  $z_2$  à calculer, utiliser l'exemple précédent).

$S = \{-2i; 1 + i; -2 + 2i\}$

### Racine n-ième d'un nombre complexe

On veut résoudre l'équation  $z^n = a$ ,  $n \in \mathbb{N}^*, z \in \mathbb{C}, a \in \mathbb{C}$

Soit  $z \in \mathbb{C}$ ,  $z = a + ib$  (forme algébrique) et  $z = re^{i\theta}$  (forme trigonométrique).



Si on cherche  $z$  tel que  $z^n = a$ ,  $n > 0$ , alors on pose  $a = r'e^{i\theta'}$  avec  $(re^{i\theta})^n = r'e^{i\theta'} \Rightarrow r^n e^{in\theta} = r'e^{i\theta'} \Rightarrow \begin{cases} r^n = r' (r, r' > 0) \\ n\theta = \theta' + 2k\pi (k \in \mathbb{Z}) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} r = (r')^{\frac{1}{n}} (r, r' > 0) \\ \theta = \frac{\theta' + 2k\pi}{n} (k \in \mathbb{Z}) \end{cases}$

**Théorème 3.2.** *Tout nombre complexe  $z \in \mathbb{C}$ ,  $z \neq 0$ , admet  $n$  racine  $n$ -èmes tel que  $z = r(\cos(\theta) + i\sin(\theta)) = re^{i\theta}$  alors ces racines :*

$$z_k = (r)^{\frac{1}{n}} \left( \cos\left(\frac{\theta' + 2k\pi}{n}\right) + i \sin\left(\frac{\theta' + 2k\pi}{n}\right) \right) = r^{\frac{1}{n}} e^{i\frac{\theta' + 2k\pi}{n}} (0 \leq k \leq n-1)$$

### 3.3 Similitude plan directe

#### 3.3.1 Translation

**Définition 3.4.** Soient  $M$  et  $M'$  deux points du plan d'affixe respectives  $z$  et  $z'$  et  $\vec{w}(b)$  un vecteur quelconque du plan. La translation de vecteur  $\vec{w}$  qu'on note  $t_{\vec{w}}$  est une application définie par :

$$t_{\vec{w}}(M) = M' \Leftrightarrow \overrightarrow{MM'} = \vec{w}$$

**Écriture complexe :**  $t_{\vec{w}}(M) = M' \Leftrightarrow \overrightarrow{MM'} = \vec{w} \Leftrightarrow z'_m - z_m = b \Rightarrow \mathbf{z}' = \mathbf{z} + \mathbf{b}$

**Expression analytique :**

Soit  $z = x + iy$  et  $z' = x' + iy'$  et  $b = x_0 + iy_0$ , d'après l'écriture complexe précédent, on a :  $x' + iy' = x + iy + x_0 + iy_0 \Rightarrow x' + iy' = x + x_0 + i(y + y_0)$  donc :

$$\begin{cases} x' = x + x_0 \\ y' = y + y_0 \end{cases}$$

#### 3.3.2 Homothétie

**Définition 3.5.** Soient  $M, M'$  et  $\Omega$  trois points du plan d'affixe respectives  $z$ ,  $z'$  et  $\omega$ .

L'homothétie de centre  $\Omega$  et de rapport  $k$  qu'on note  $h(\Omega; k)$  est une application définie par :

$$h(\Omega, k)(M) = M' \Leftrightarrow \overrightarrow{\Omega M'} = k \overrightarrow{\Omega M}$$

**Écriture complexe :**

$$\overrightarrow{\Omega M'} = k \overrightarrow{\Omega M} \Rightarrow z' - \omega = k(z - \omega) \Rightarrow z' = \omega + kz - k\omega = kz + \omega(1 - k) \text{ donc :}$$

$$z' = kz + \omega(1 - k)$$

**Expression analytique :**

Soit  $z = x + iy$  et  $z' = x' + iy'$  et  $\omega = x_0 + iy_0$ , d'après l'écriture complexe précédent, on a :  $x' + iy' = k(x + iy) + (x_0 + iy_0)(1 - k) \Rightarrow x' + iy' = kx +iky + x_0 - kx_0 + iy_0 -iky_0 = k(x - x_0) + x_0 + i(k(y - y_0) + y_0)$  donc :

$$\begin{cases} x' = k(x - x_0) + x_0 \\ y' = k(y - y_0) + y_0 \end{cases}$$

*Remarque 3.1.* 1. Si  $k = 1$  on a :  $\overrightarrow{\Omega M'} = \overrightarrow{\Omega M}$  donc  $M = M'$   
2. Si  $k = -1$  on a :  $\overrightarrow{\Omega M'} = -\overrightarrow{\Omega M}$  on obtient la symétrie centrale de centre  $\Omega$

### 3.3.3 Rotation

**Définition 3.6.** Soient  $M, M'$  et  $\Omega$  trois points du plan d'affixe respectives  $z, z'$  et  $\omega$ .

La rotation de centre  $\Omega$  et d'angle  $\theta$  qu'on note  $r(\Omega; \theta)$  est une application définie par :

$$\begin{cases} \Omega M &= \Omega M' \\ (\overrightarrow{\Omega M}, \overrightarrow{\Omega M'}) &= \theta \end{cases}$$

**Écriture complexe :**

$$\Omega M = \Omega M' \Leftrightarrow |z_m - z_\Omega| = |z_{m'} - z_\Omega| \Leftrightarrow |z - \omega| = |z' - \omega| \Rightarrow \frac{|z' - \omega|}{|z - \omega|} = \frac{|z - \omega|}{|z - \omega|} = 1$$

$(\overrightarrow{\Omega M}, \overrightarrow{\Omega M'}) = \arg\left(\frac{z' - \omega}{z - \omega}\right) = \theta$  donc  $\frac{z' - \omega}{z - \omega} = 1 \times e^{i\theta} \Rightarrow z' - \omega = (z - \omega)e^{i\theta} = ze^{i\theta} - \omega e^{i\theta}$   
donc :

$$z' = ze^{i\theta} + (1 - e^{i\theta})\omega$$

### 3.3.4 Similitude directe

**Isométrie :** Une isométrie du plan est une transformation ponctuelle laissant invariantes les distances.

**Déplacement :** Un déplacement est une isométrie qui conserve les angles orientés (Homothétie ou Rotation).

**Écriture complexe :**

$z' = z + z_0$  (translation) et  $z' = e^{i\alpha}z + b$  (Rotation).

L'écriture complexe d'un déplacement est de :  $z' = ze^{i\alpha} + z_0$ . Si  $\alpha \equiv 0[2\pi]$ , celui-ci devient une translation  $z' = ze^{i0} + z_0 = z' = z + z_0$ .

**Définition 3.7.** Une similitude directe de rapport  $k$  (réel positive) est une transformation du plan qui multiplie les distances par  $k$ , et qui conserve les angles orientés.

**Propriété 3.2.** Pour une transformation  $f$  du plan les deux propriétés suivantes sont équivalentes.

- i.  $f$  est une similitude directe de rapport  $k > 0$ .
- ii.  $f = d \circ h$  (ou  $f = h \circ d$ ) où  $d$  est un déplacement et  $h$  une homothétie de rapport  $k$ .

**Écriture complexe :**

Soit  $f$  est une similitude directe de rapport  $k > 0$   $f = d \circ h$ .  $M(z) \xrightarrow{h} M_1(z_1) \xrightarrow{d} M'(z')$   
 $h(M) = M_1 \Leftrightarrow \overrightarrow{\Omega M_1} = h\overrightarrow{\Omega M} \Leftrightarrow z_1 - \omega = k(z - \omega) \Leftrightarrow z_1 = k(z - \omega) + \omega$   $d(M_1) = M' \Rightarrow$   
 $z' = e^{i\alpha}z + z_0 = e^{i\alpha}(kz - k\omega + \omega) + z = kze^{i\alpha} + (1 - k)e^{i\alpha}\omega + z_0$

Posons  $m = ke^{i\alpha} \in \mathbb{C}^*$  et  $n = e^{i\alpha}(1 - k)w + z_0 \in \mathbb{R}$  d'où :

$$z' = mz + n$$

## Réciproquement

Soit  $f$  une transformation plane de l'équation complexe

$$z' = az + b \quad (a \in \mathbb{C}^*, b \in \mathbb{C})$$

1. Si  $a = 1$ , on a :  $z' = z + b$  donc  $f$  est une **translation**.
2. Si  $a \neq 1$  on dit que  $f$  admet un point **unique invariant**  $\Omega$  d'affixe  $\omega$  qui vérifie :  
 $\omega = a\omega + b \Rightarrow \omega(1 - a) = b \Rightarrow \omega = \frac{b}{1-a}$ .  
 $z' = az + b$  et  $\omega = a\omega + b$  On a :  $z' - \omega = az - a\omega \Rightarrow z' = az + (1 - a)\omega$   $a \in \mathbb{C}$   
 $\alpha = \arg(a)$  donc  $a = |a|e^{i\alpha}$  et  $z' = |a|e^{i\alpha}z + (1 - |a|e^{i\alpha})\omega$ .  
 Soit  $k = |a|$  On a :

$$z' = ke^{i\alpha}z + (1 - ke^{i\alpha})\omega$$

*Remarque 3.2.* Si  $f$  est une similitude de rapport  $k$ , d'angle  $\alpha$  et de centre  $\Omega$  alors sa réciproque  $f^{-1}$  est une similitude de rapport  $\frac{1}{k}$  d'angle  $-\alpha$  et centre  $\Omega$ .

La compose de deux similitude de rapport  $k_1$  et  $k_2$  est une similitude de rapport  $k_1 \times k_2$ .

**Résumé :** L'écriture complexe  $z' = az + b$  ( $a \in \mathbb{C}^*, b \in \mathbb{C}$ ) est :

1. Une **translation** de vecteur  $\vec{u}$  si  $a = 1$
2. Une **homothétie** de rapport  $a$  et de centre  $\Omega(\frac{b}{1-a})$  si  $a \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$ .
3. Une **rotation** d'angle  $\alpha$  et de centre  $\Omega(\frac{b}{1-a})$  si  $a \in \mathbb{C}^*$  et  $|a| = 1$
4. Une **similitude** de rapport  $k$  avec  $k = |a|$  et d'angle  $\alpha = \arg(a)$  et de centre  $\Omega(\frac{b}{1-a})$  si  $a \in \mathbb{C}^*$  et  $|a| \neq 1$

**Exemples 3.5.** Déterminer la nature de  $s$  une transformation d'écriture complexe  $z' = (1 + i)z + 4$ .

**Solution 3.5.**  $|a| = \sqrt{1+1} = \sqrt{2} \neq 1$  donc  $s$  est une similitude de rapport  $k = \sqrt{2}$  et d'angle  $\alpha$  tels que :  $\begin{cases} \cos \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \sin \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$  donc  $\alpha = \frac{\pi}{4}$  et de centre  $\Omega(\frac{4}{1-1-i})$  donc  $\Omega(4i)$

**Application 3.** Le plan complexe est muni d'un repère orthonormal direct  $(O, \vec{u}, \vec{v})$  (unité graphique : 4cm). Soit  $A$  le point d'affixe  $z_a = i$  et  $B$  le point d'affixe  $z_B = e^{-i\frac{5\pi}{6}}$ .

1. Soit  $r$  la rotation de centre  $O$  et d'angle  $\frac{2\pi}{3}$ . On appelle  $C$  l'image de  $B$  par  $r$ .
  - a) Déterminer une écriture complexe de  $r$ .
  - b) Montrer que l'affixe  $C$  est  $Z_c = e^{-i\frac{\pi}{6}}$ .
  - c) Écrire  $z_b$  et  $z_c$  sous forme algébrique.
  - d) Placer des points  $A, B$  et  $C$ .
2. Soit  $D$  le barycentre des points  $A, B$  et  $C$  affectés respectivement des coefficients 2, -1 et 2.

- a) Montrer que l'affixe de  $D$  est  $z_D = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$ . Placer le point  $D$ .
- b) Montrer que  $A, B, C$  et  $D$  sont sur un même cercle.
3. Soit  $h$  l'homothétie de centre  $A$  et de rapport 2. On appelle  $E$  l'image de  $D$  par  $h$ .
  - a) Déterminer une écriture complexe de  $h$ .
  - b) Montrer que l'affixe de  $E$  est  $z_E = \sqrt{3}$ . Placer le point  $E$ .
4. a) Calculer le rapport  $\frac{z_D - z_C}{z_E - z_C}$ . On écrira le résultat sous forme exponentielle.  
 b) En déduire la nature du triangle  $CDE$ .

### Solution Application 3. .

1. a) L'écriture complexe de  $r$  est de la forme  $z' - z_o = e^{-i\frac{2\pi}{3}}(z - z_o)$ , c'est-à-dire  $z' = e^{i\frac{2\pi}{3}}z$ .  
 b) Comme  $C$  est l'image de  $B$  par  $r$ , alors  $z_c = z_B e^{i\frac{2\pi}{3}} = e^{-i\frac{5\pi}{6}} \times e^{i\frac{2\pi}{3}} = e^{i(\frac{2\pi}{3} - \frac{5\pi}{6})} = e^{-i\frac{\pi}{6}}$ . Donc l'affixe de  $C$  est  $e^{-i\frac{\pi}{6}}$ .  
 c)  $z_B = e^{-i\frac{5\pi}{6}} = \cos(-\frac{5\pi}{6}) + i \sin(-\frac{5\pi}{6}) = -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$ .  
 $z_c = e^{-i\frac{\pi}{6}} = \cos(-\frac{\pi}{6}) + i \sin(-\frac{\pi}{6}) = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$ .  
 d) Voir figure.
2. a) Comme  $D$  est le barycentre des points  $A, B$  et  $C$  affectés respectivement des coefficients 2, -1 et 2, alors on peut écrire :  $\frac{2z_A - z_B + 2z_C}{2 - 1 + 2} = \frac{\frac{3\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2}i}{3}$ , donc  $z_D = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$ .  
 b)  $OA = |z_A - z_O| = |i| = 1$ ;  $OB = |z_B - O| = |e^{-i\frac{5\pi}{6}}| = 1$ ;  $OC = |z_C - O| = |e^{-i\frac{\pi}{6}}| = 1$  et  $OD = |z_D - z_O| = |\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i| = 1$ .  
 On en déduit que les points  $A, B, C$  et  $D$  sont sur le cercle de centre  $O$  et de rayon 1.
3. a) L'écriture complexe de  $h$  est de la forme  $z' - z_A = 2(z - z_A)$ , c'est-à-dire  $z' = 2z - i$   
 b) Comme  $E$  est l'image de  $D$  par  $h$ , alors  $z_E = 5z_D - i = \sqrt{3} + i - i = \sqrt{3}$ , donc l'affixe de  $E$  est  $z_E = \sqrt{3}$ .
4. a)  $\frac{z_D - z_C}{z_E - z_C} = \frac{(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i) - (\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i)}{\sqrt{3} - (\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i)} = \frac{i}{\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i} = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$ . Donc,  $\frac{z_D - z_C}{z_E - z_C} = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} = e^{i\frac{\pi}{3}}$   
 b)  $\frac{CD}{CE} = \frac{|z_D - z_C|}{|z_E - z_C|} = |\frac{z_D - z_C}{z_E - z_C}|$ . Or,  $\frac{z_D - z_C}{z_E - z_C} = e^{i\frac{\pi}{3}}$  d'après la question précédente. Alors  $\frac{DC}{CE} = |e^{i\frac{\pi}{3}}| = 1$ , et par suite  $CD = CE$ . On en déduit que  $CDE$  est isocèle en  $C$ . De plus,  $(\overrightarrow{CE}, \overrightarrow{CD}) = \arg(\frac{z_D - z_C}{z_E - z_C}) = \arg(e^{i\frac{\pi}{3}}) = \frac{\pi}{3}$ . On en déduit donc que le triangle  $CDE$  est équilatéral.

**Application 4.** Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormal direct  $(O, \vec{u}, \vec{v})$  (unité graphique 4cm).

Soit  $\Omega$  le point d'affixe 2. On appelle  $r$  la rotation de centre  $\Omega$  et d'angle  $\frac{\pi}{4}$  et  $h$  l'homothétie de centre  $\Omega$  et de rapport  $\frac{\sqrt{2}}{2}$ .

1. On pose  $\sigma = h \circ r$ .

- a) Quelle est la nature de la transformation  $\sigma$  ? Préciser ses éléments caractéristiques.
- b) Montrer que l'écriture complexe de  $\sigma$  est :  $z \longrightarrow \frac{1+i}{2}z + 1 - i$ .
- c) Soit  $M$  un point quelconque du plan d'affixe  $z$ . On désigne par  $M'$  son image par  $\sigma$  et on note  $z'$  l'affixe de  $M'$ . Montrer que  $z - z' = i(2 - z')$ .
2. a) **Question de cours** • Pré requis : définitions géométriques du module d'un nombre complexe et d'un argument d'un nombre complexe non nul. Propriétés algébriques des modules et des arguments.
- Démontrer que : si  $A$  est un point donné d'affixe  $a$ , alors l'image du point  $p$  d'affixe  $p$  par la rotation de centre  $A$  et d'angle  $\frac{\pi}{2}$  est le point  $Q$  d'affixe  $q$  telle que  $q - a = i(p - a)$ .
- b) Dédurre des questions précédentes la nature du triangle  $\Omega MM'$ , pour  $M$  distinct de  $\Omega$ .
3. Soit  $A_0$  le point d'affixe  $2 + i$ . On considère la suite  $(A_n)$  de points du plan définis par : pour tout entier naturel  $n$ ,  $A_{n+1} = \sigma(A_n)$ .
- a) Montrer que, pour tout entier naturel  $n$ , l'affixe  $a_n$  de  $A_n$  est donnée par :  $a_n = (\frac{\sqrt{2}}{2})^n e^{i\frac{(n+2)\pi}{4}} + 2$ .
- b) Déterminer le plus petit entier  $n_0$  tel que l'on ait : pour  $n \geq n_0$ , le point  $A_n$  est dans le disque de centre  $\Omega$  et de rayon 0.01.

#### Solution Application 4. .

1. a) La composée d'une rotation et d'une homothétie de même centre est une similitude de rapport  $\frac{\sqrt{3}}{2}$  et d'angle  $\frac{\pi}{4}$ .
- b) Si  $M_1$  est l'image de  $M$  par  $r$ , son affixe est  $z_1$ , telle que  $z_1 - 2 = e^{i\frac{\pi}{4}}(z - 2)$ . L'image de  $M_1$  par  $h$  est  $M'$  d'affixe  $z'$  telle que :  $z' - 2 = 3(z_1 - 2) = \frac{\sqrt{2}}{2}(e^{i\frac{\pi}{4}}(z - 2)) = (z - 2)(\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}) \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{2}(1 + i)(z - 2)$ . D'où  $z' = 2 + \frac{(1+i)}{2}z - 1 - i = \frac{1+i}{2}z + 1 - i$ .
- c) L'égalité précédente peut s'écrire :  $2z + 2(-2i) \Leftrightarrow (1 - i)z' = z - 2i = z - z' \Leftrightarrow -iz' + 2i = z - z' \Leftrightarrow i(2 - z') = z - z'$ .
2. a) **Question de cours**
- D'après les propriétés de la rotation : Si  $P \neq A$ ,  $AQ = AP \Leftrightarrow \frac{AQ}{AP} = 1 \Leftrightarrow \frac{|q-a|}{|p-a|} = 1 \Leftrightarrow \frac{|q-a|}{|p-a|} = 1$ . D'autre part :  $(\overrightarrow{AP}, \overrightarrow{AQ} = \frac{\pi}{2}) \Leftrightarrow \arg \frac{q-a}{p-a} = \frac{\pi}{2}$ . Conclusion :  $\frac{q-a}{p-a} = i \Leftrightarrow q - a = i(p - a)$ .
- b) D'après la question 1.c.  $z - z' = i(2 - z') \Leftrightarrow M$  d'affixe  $z$  est l'image de  $A$  dans le quart de tour direct de centre  $M'$ , autrement dit le triangle  $\Omega M' M$  est un triangle rectangle isocèle en  $M'$ ,  $M' \neq \Omega$ .
3. Démontrons la relation par récurrence :
- Initialisation** : Pour  $n = 0$ ,  $A_0(2 + i)$  et en appliquant la relation au rang 0 :  $a_0 = e^{i\frac{\pi}{2}} + 2 = i + 2$ . La relation est vraie au rang 0.

**Hérédité** soit  $n \neq \mathbb{N}$  et supposons la relation vraie au rang  $n$  :  $a_n = (\frac{\sqrt{2}}{2})^2 e^{i\frac{(n+2)\pi}{4}} + 2$ . D'après la question 1.b, on a  $a_{n+1} = \frac{1+i}{2}a_n + 1 - i = \frac{1+i}{2} + [(\frac{\sqrt{2}}{2})^n e^{i\frac{(n+2)\pi}{4}} + 2] + 1 - i$ . Or  $\frac{1+i}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}(\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}) = \frac{\sqrt{2}}{2}e^{i\frac{\sqrt{2}}{4}}$ . Donc en reportant :  $a_{n+1} = \frac{\sqrt{2}}{2}e^{i\frac{\pi}{4}}[(\frac{\sqrt{2}}{2})^n e^{i\frac{(n+2)\pi}{4}} + 2] + 1 - i = (\frac{\sqrt{2}}{2})^{n+1}e^{i\frac{(n+1)\pi}{4}} + 2(\frac{1+i}{2}) + 1 - i = (\frac{\sqrt{2}}{2})^{n+1} + 2$ . La relation est donc vraie au rang  $n + 1$ .

La relation est vraie au rang 0 et si elle est vraie au rang  $n$  elle l'est aussi au rang  $n + 1$ . On a donc démontré par le principe de récurrence que la relation est vraie pour tout naturel  $n$ .

4. On a donc  $a_5 = (\frac{\sqrt{2}}{2})^5 e^{i\frac{(5+2)\pi}{4}} + 2 = \frac{17}{8} - i\frac{1}{8}$ .

5.  $A_n \Omega < 0.01 \Leftrightarrow |(\frac{\sqrt{2}}{2})^n e^{i\frac{(n+2)\pi}{4}} + 2 - 2| < 0.01 \Leftrightarrow |(\frac{\sqrt{2}}{2})^n e^{i\frac{(n+2)\pi}{4}}| < 0.01 \Leftrightarrow (\frac{\sqrt{2}}{2})^n < 0.01 \Leftrightarrow n \ln(\frac{\sqrt{2}}{2}) > \ln(0.01) \Leftrightarrow n > \frac{\ln(0.01)}{\ln(\frac{\sqrt{2}}{2})} \approx 13.2$ .

On a donc  $n_0 = 13$ .

### 3.4 Exercice

#### Exercice 3.4.1. .

1. Donner la forme algébrique  $z_i$  ainsi que le conjugué  $\overline{z_i}$  des nombres complexes suivantes :

$$\begin{aligned} z_1 &= (1+i)^3 & z_2 &= (2+i\sqrt{3})(2-i\sqrt{3}) & z_3 &= (1+i)(4-3i)(1-i) \\ z_4 &= \frac{(3+5i)^2}{1-2i} & z_5 &= \frac{1}{3-i\sqrt{2}} & z_6 &= \frac{2-5i}{3+2i} \\ z_7 &= \left(\frac{1+i}{2-i}\right)^2 + \frac{3+6i}{3-4i} & z_8 &= \frac{2}{1-2i} + \frac{3}{2+i} & z_9 &= (1-i)\overline{1+i}. \end{aligned}$$

2. Donner la forme algébrique des nombres complexes suivants :

$$\begin{aligned} z_1 &= 3e^{i\frac{\pi}{2}} & z_2 &= 2e^{i\pi} & z_3 &= (2e^{i\frac{\pi}{3}})(3e^{i\frac{5\pi}{6}}) \\ z_4 &= \frac{2e^{i\frac{\pi}{4}}}{e^{-i\frac{3\pi}{4}}} & z_5 &= (2e^{i\frac{\pi}{4}})(e^{-i\frac{3\pi}{4}}) & z_6 &= \frac{2e^{i\frac{\pi}{3}}}{3e^{-i\frac{5\pi}{6}}} \\ z_7, & \text{ le nombre de module } \sqrt{2} \text{ et d'argument } \frac{\pi}{8}. \\ z_8, & \text{ le nombre de module } 3 \text{ et d'argument } \frac{-\pi}{8}. \end{aligned}$$

#### Exercice 3.4.2. .

1. Mettre sous forme trigonométrique les nombres complexes suivants, ainsi que leur conjugués :

$$\begin{aligned} z_1 &= -1 - i\sqrt{3} & z_2 &= -5 & z_3 &= (1-i\sqrt{3})(1+i) \\ z_4 &= e^{i\theta} + e^{2i\theta} \text{ avec } \theta \in ]-\pi, \pi[ & z_5 &= \cos(\frac{\pi}{6}) - i\sin(\frac{\pi}{6}) \\ z_6 &= \sin(\frac{\pi}{9}) + i\cos(\frac{\pi}{9}) & z_7 &= 1 + i(1 + \sqrt{2}). \end{aligned}$$

2. Effectuer les calculs suivants en utilisant la forme exponentielle :

$$\begin{aligned} z_1 &= \frac{1+i\sqrt{3}}{2-2i} & z_2 &= \left(\frac{1+i}{1-i}\right)^{2020} & z_3 &= \frac{1+i\sqrt{3}}{\sqrt{3}+i} \\ z_4 &= (-1 + i\sqrt{3})^5 & z_5 &= \frac{\sqrt{6}-i\sqrt{2}}{-3+4i} & z_6 &= (1 + i\sqrt{3})^{2020} \end{aligned}$$

**Exercice 3.4.3.** Calculer les racines carrées des nombres suivants :

$$\begin{aligned} z_1 &= -1 & z_2 &= 3 + 4i & z_3 &= 8 - 6i \\ z_4 &= \sqrt{3} + i & z_5 &= 1 + i\sqrt{3} & z_6 &= 7 + 24i. \end{aligned}$$

**Exercice 3.4.4.** .

1. Résoudre dans  $\mathbb{C}$  les équations suivantes :

$$E_1 : 2z + \bar{z} = 2 + 3i \quad E_2 : (2i\bar{z} + i - 2) = \frac{1}{iz-2+i} \quad E_3 : z^2 - (1 + \sqrt{3}) + \sqrt{3} = 0$$

$$E_4 : z^2 - 5z + 9 = 0 \quad E_5 : z^2 - \sqrt{3} - i = 0 \quad E_6 : z^2 - (1 + 2i)z + i - 1 = 0$$

$$E_7 : 4z^2 - 2z + 1 = 0 \quad E_8 : 4\bar{z} = -2i + 4 \quad E_9 : (1 + i)z^2 - (3 + i)z - 6 + 4i = 0$$

2. On pose :  $\forall z \in \mathbb{C}, (E) : (1 - i)z^3 - (5 + i)z^2 + (4 + 6i)z - 4i = 0$ .

a) Montre que  $(E)$  une racine réelle  $\alpha$  que l'on déterminera.

b) Déterminer les nombres complexes  $a$  et  $b$  tels que :

$$\forall z \in \mathbb{C}, (E) : (z - 1)(z^2 + az + b) = 0$$

c) Résoudre l'équation  $(E)$ .

3. On pose :  $\forall z \in \mathbb{C}, (E) : z^3 - (3 - 2i)z^2 + [4 + i(6 + \sqrt{2})]z - 8i + 2\sqrt{2} = 0$ .

a) Montre que  $(E)$  admet une et unique solution imaginaire pure que l'on déterminera.

b) Déterminer les nombres complexes  $a$  et  $b$  tels que :

$$\forall z \in \mathbb{C}, (E) : (z - 2i)(z^2 + az + b) = 0$$

c) Résoudre l'équation  $(E)$ .

**Exercice 3.4.5.** On donne les nombres complexes :  $z_1 = \frac{\sqrt{6}-i\sqrt{2}}{2}$  et  $z_2 = 1 - i$ .

1. Donner une forme trigonométrique de :  $z_1$ ,  $z_2$  et  $\frac{z_1}{z_2}$

2. Donner une forme algébrique de  $\frac{z_1}{z_2}$ .

3. Déduisez que :  $\cos(\frac{\pi}{12}) = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$  et  $\sin(\frac{\pi}{12}) = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$ .

**Exercice 3.4.6.** On considère le nombre complexe :  $z = (\sqrt{3} + 1) + (\sqrt{3} - 1)i$ .

1. Écrivez  $z^2$  sous forme algébrique.

2. Déterminer le module et un argument de  $z^2$ .

3. À l'aide des propriétés du module et d'argument, donner le module et l'argument de  $z$ .

4. Déduisez-en la valeur exacte de :  $\cos(\frac{\pi}{12})$  et  $\sin(\frac{\pi}{12})$ .

**Exercice 3.4.7.** On appelle  $j = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$

1. Résoudre dans  $\mathbb{C}$ , l'équation  $X^3 = 1$  (Donner les solutions sous la forme algébrique et trigonométrique).

2. Montrer que  $\bar{j} = j^2$ .

3. Montrer que  $j^{-1} = j^2$ .

4. Montrer que  $1 + j + j^2 = 0$ .
5. Calculer  $\frac{1}{1+j}$ .
6. Calculer  $j^n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

**Exercice 3.4.8.**

1. On considère l'équation  $(E) : z^3 + (-6 - 4i)z^2 + (12 + 21i)z - 45i = 0$ 
  - a) Montre que  $E$  admet une solution  $z_0$  imaginaire pure.
  - b) Résoudre l'équation  $E$  (on appellera  $z_1$  la solution dont la partie imaginaire est positive et  $z_2$  la troisième solution.)
2. le plan complexe  $P$  rapporté au repère orthonormé  $(O, \vec{u}, \vec{v})$  on considère les  $A, B$  et  $C$  d'affixe respective  $3i, 3 + 3i, 3 - 2i$ 
  - a) Placer les points  $A, B$  et  $C$  dans le repère.
  - b) Calculer  $\frac{z_A - z_B}{z_C - z_B}$ , En déduire la nature du triangle  $ABC$ .
3. Soit  $f$  la similitude direct qui laisse invariant le point  $B$  et qui transforme  $A$  en  $C$ .
  - a) Donner une écriture complexe de  $f$ .
  - b) Donner les éléments géométriques caractéristiques de  $f$ .

**Exercice 3.4.9.** Le plan est muni d'un repère orthonormal direct  $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$ .  $S$  est la similitude plane direct de centre  $O$ , d'angle  $\frac{\pi}{2}$  et de rayon  $\frac{\sqrt{2}}{2}$ .

Soit  $M$  le point d'affixe  $z$  et  $M'$  le point d'affixe  $z'$  avec  $M' = S(M)$

1. Exprimer  $z'$  en fonction de  $z$ .
2. On définit la suite des points  $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$  de la façon suivante :

$$\begin{cases} M_0 & \text{d'affixe } z_0 = 1 + i \\ M_n & S(M_{n-1}) \text{ pour } n \geq 1 \end{cases}$$

$z_n$  est l'affixe de  $M_n$ , pour tout entier naturel  $n$ .

- a) Déterminer les affixes des points  $M_1, M_2$  et  $M_3$ .
- b) Exprimer  $z_n$  en fonction de  $z_{n-1}$  pour  $n \geq 1$ .
- c) En déduire que  $z_n = (i\frac{\sqrt{2}}{2})^n z_0$ .
- d) Soit  $a_n = |z_n|$ , montrer que  $a_n$  est le terme générale d'une suite géométrique dont on précisera la raison et la première terme.
- e) Étudier la convergence de la suite  $(a_n)$ ,  $n \in \mathbb{N}$ .

**Exercice 3.4.10.** Soit  $P$  un plan affine muni d'un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ .

A tout nombre complexe  $Z \neq -i$ , on associe  $f(z) = \frac{iz}{z+i}$ . On note  $M$  le point d'affixe  $z = x + iy$  où  $x$  et  $y$  sont des nombres réels.



1. Déterminer l'afixe  $z_0$  du point  $B$  tel que  $f(a_0) = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2}i$
2. On note  $r$  le module de  $z + i$  et  $\alpha$  son argument principale.  
Écrire en fonction de  $r$  et  $\alpha$  la forme trigonométrique de  $f(z) - i$ .
3. Soit  $A$  le point d'afixe  $-i$ 
  - a) Déterminer l'ensemble  $(C)$  des points  $M$  d'afixe  $Z$  vérifiant l'égalité  $|f(z) - i| = 1$ .
  - b) Montrer la droite  $(T)$  d'équation  $\sqrt{3}x - y - 3 = 0$  est tangente à  $C$  en  $B$ .
4. Construire  $A, B, (T)$  et  $(C)$ .

**Exercice 3.4.11.** Le plan  $P$  est muni d'un repère orthonormé directe  $(O, \vec{u}, \vec{v})$ .

1.
  - a) Résoudre  $\mathbb{C}$  l'équation  $z^2 - 4z + 8 = 0$
  - b) Écrire les solution sous forme trigonométrique.
2.
  - a) Soient  $A, B$  et  $C$  les points du plan d'afixes respectives  $z_A = 2 - 2i$ ,  $z_B = 2 + 2i$  et  $z_C = 4$ . Placer les points  $A, B$  et  $C$  dans le plan.
  - b) Calculer le rapport  $\frac{z_A - z_C}{z_A - z_B}$ , en déduire la nature du triangle  $CAB$ , puis celle du quadrilatère  $AOBC$
3. Soit  $f$  la similitude direct du plan complexe qui laisse le point  $C$  invariant et qui transforma le point  $A$  en  $O$ .
  - a) Donner l'écriture complexe de  $f$ .
  - b) Donner les éléments caractéristique de  $f$ . Soit  $g$  la transformation du  $P$  en lui même qui a tout point  $M$  d'afixe  $z$  associer au point  $M'$  d'afixe  $z'$  tel que  $z' = (1 - i)z + 4i$
  - c) Écrire sous forme algébrique, l'afixe de  $G'$ , du barycentre  $G$  des points pondérés  $(A, 3), (B, 2)$  et  $(C, -3)$  par  $g$ .

**Exercice 3.4.12.** Le plan complexe est rapporté a un repère orthonormé  $(O, \vec{u}, \vec{v})$ . On considère les points  $A, B, C$  et  $D$  du plans complexe d'afixe respectives  $a = 5 + 4i$ ,  $b = 3 + i$ ,  $c = 3 + 3i$  et  $d = 6 + 2i$

1. Placer les points  $A, B, C$  et  $D$  sur le graphique.
2. Calculer  $\frac{d-b}{a-b}$ , en déduire la nature du triangle  $DAB$ .
3. On considère l'application  $f$  qui a tout point  $M$  d'afixe  $z$  avec  $z \neq b$ , associer le pont  $M'$  d'afixe  $z'$  définie par  $z' = \frac{z-a}{z-b}$ 
  - a) Calculer l'afixe  $C'$  du point  $C'$ , image de  $C$  par  $f$  et place  $C'$  sur la figure.
  - b) Déterminer l'ensemble  $(\varepsilon)$  contient les points  $M$  d'afixe  $z$  avec  $z \neq b$  tel que  $|z'| = 1$ .
  - c) Justifier que  $(\varepsilon)$  contient les points  $D$  et  $C$ . Tracer  $(\varepsilon)$ .
4. On appelle  $J$  l'image du point  $A$  par la rotation  $r$  de centre  $O$  et d'angle  $\frac{\pi}{2}$ . Déterminer l'afixe de  $J$ .

**Exercice 3.4.13.** Dans le plan complexe  $(P)$  muni d'un repère orthonormal directe  $(O, \vec{u}, \vec{v})$  d'unité graphique 4cm, on considère le point  $A$  d'affixe  $a = -1$  et l'application  $f$  du plan  $(P)$  dans lui-même, qui au point  $M$  d'affixe  $z$ , distincte de  $A$ , associe le point  $M'$ .  $f(M)$  d'affixe :  $z' = \frac{iz}{z+1}$ .

1. Déterminer l'affixe du point  $M$  tel que  $M' = M$ .
2. Déterminer que pour tout point  $M$  distinct de  $A$  et de  $O$ , on a :  
 $OM' = \frac{OM}{AM}$  et  $(\vec{u}, \vec{OM}) = (\vec{MA}, \vec{MO}) + \frac{\pi}{2}$  à  $2\pi$  près.
3. a) soit  $B$  le point d'affixe  $b = -\frac{1}{2} + i$ .  
Placer dans le repère le point  $B$  et la médiatrice  $(\Delta)$  du segment  $[OA]$ .  
b) Calculer sous forme algébrique l'affixe  $b'$  du point  $B'$  image du point  $B$  par  $f$ .  
Établie que  $B'$  appartient au cercle  $(\varepsilon)$  de centre  $O$  et rayon 1. Placer le point  $B'$  et tracer le cercle  $(\varepsilon)$  dans le repère.  
c) En utilisant la fonction  $z$  montrer que, si un point  $M$  appartient à la médiatrice  $(\Delta)$ , son image  $M'$  par  $f$  appartient au cercle  $(\varepsilon)$ .  
d) Soit  $C$  le point tel que le triangle  $AOC$  soit équilatéral direct. En s'aidant des résultats de la question 2, construire à la règle et au compas, l'image de point  $C$  par  $f$ . (on laissera apparent les traits de constructions).
4. Dans cette question, on se propose de déterminer, par deux méthodes différents, l'ensemble  $(\Gamma)$  des points  $M$  distincte de  $A$  et de  $O$  dont l'image  $M'$  par  $f$  appartient à l'axe des abscisses.  
a) On pose  $z = x + iy$  avec  $x$  et  $y$  réel tels que  $(x, y) \neq (-1, 0)$  et  $(x, y) \neq (0, 0)$ . Démontrer que la partie imaginaire de  $z'$  est égale à :

$$\text{Im}(z') = \frac{x^2 + y^2 + x}{(x+1)^2 + y^2}$$

En déduire la nature et les éléments caractéristiques de l'ensemble  $(\Gamma)$  et le tracer dans le repère.

- b) Retrouver géométriquement la nature de l'ensemble  $(\Gamma)$ .

**Exercice 3.4.14.** Le plan est munie d'un repère orthonormé directe  $(O, \vec{u}, \vec{v})$ . On note  $B$  et  $C$  les points du plans d'affixe respectives  $3 - 2i$ ,  $5 + i$ . On désigne pas  $S$  la similitude directe de centre  $O$  et qui transforme  $C$  en  $B$ .

1. a) Démontrer que l'écriture complexe de  $S$  est  $z' = \frac{1}{2}(1 - i)z$ .  
b) Déterminer les éléments caractéristique de  $S$ .  
c) Déterminer l'affixe du point  $D$  qui a pour image le point  $C$  par  $S$ .
2. a) Justifier que l'affixe  $z_1$ , du point  $B_1$ , image de  $B$  par  $S$  est  $\frac{1}{2}(1 - 5Z)$ .  
b) Donner la nature du triangle  $OBB_1$
3. On définit les points suivants :  $B_0 = B$  et  $\forall n \in \mathbb{N}^*$ ,  $B_{n+1} = S(B_n)$ .  
On note  $z_n$  l'affixe de points  $B_n$ .

- a) Démontres par récurrence que,  $z_n = (\frac{1}{2})^n(1 - i)^n z_0$ .
- b) Calcule la distance  $OB_n$  en fonction de  $n$ .
- c) Calcule la distance  $\lim_{n \rightarrow +\infty} OB_n$ .

**Exercice 3.4.15.** Dans le plans complexe muni d'un repère orthonormal direct  $(o, \vec{u}, \vec{v})$ , on considère les  $A$  d'affixe  $3i$  et  $B$  d'affixe  $6$ ; unité graphique : 1cm

**Partie A**

1. Montrer qu'il existe une similitude directe et une seule qui transforme  $A$  en  $O$  et  $O$  en  $B$ . Préciser ses éléments caractéristiques.
2. Montrer qu'il existe une similitude indirecte et une seule qui transforme  $A$  en  $O$  et  $O$  en  $B$ .

**Partie B**

1. Soit  $f$  la transformation du plan dans lui-même qui, a pour tout point  $M$  d'affixe  $z$ , associe le point  $M'$  d'affixe  $z' = -2i\bar{z} + 6$  où  $\bar{z}$  désigne le conjugué de  $z$ .  
Montrer que  $f$  possède un point invariant et un seul. On note  $K$  ce point.
2. Soit  $h$  l'homothétie de centre  $K$  et de rapport  $\frac{1}{2}$ .  
On pose  $g = f \circ h$ .
  - a. Montrer que  $g$  est une isométrie laissant invariant le point  $K$ .
  - b. On désigne par  $M''$  l'image du point  $M$  d'affixe  $z$  par la transformation  $g$ . Montrer que l'écriture complexe de  $g$  est  $z'' = -i\bar{z} + 2 + 2i$  où  $z''$  est d'affixe de  $M''$ .
  - c. Montrer qu'il existe sur l'axe  $(o, \vec{v})$  un unique point invariant par  $g$ ; on le note  $L$ . Reconnaitre alors la transformation  $g$ .
  - d. En déduire que la transformation  $f$  est la composée d'une homothétie  $h'$  suivie de la réflexion d'axe  $(KL)$ . Préciser les éléments caractéristiques de  $h'$ .
3. Déterminer les droites  $\Delta$  telles que  $f(\Delta)$  et  $\Delta$  soient parallèles.

**Exercice 3.4.16.** .

**Partie A**

1. On pose :  $\forall z \in \mathbb{C}, (E) : z^3 - 4z^2 + 8z - 8 = 0$ .
  - a) Montre que 2 est une racine de  $E$ .
  - b) Déterminer les nombres complexes  $a$  et  $b$  tels que :  
 $\forall z \in \mathbb{C}, (E) : (z - \alpha)(z^2 + az + b) = 0$
  - c) Résoudrez l'équation  $(E)$ .
2. Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormal direct  $(O, \vec{u}, \vec{v})$  (unité graphique 2cm), on considère les points  $A, B$  et  $C$  d'affixes respective  $z_A = 2, z_B = 1 + i\sqrt{3}$  et  $z_C = 1 - i\sqrt{3}$ .
  - a) Donner la forme exponentielle de  $z_B$  puis de  $z_C$ .

- b) Placer les points  $A$ ,  $B$  et  $C$ .
3. Déterminer la nature du quadrilatère  $OABC$ .
4. Déterminer et construire l'ensemble  $\mathcal{h}$  des points  $M$  du plan tels que  $|z| = |z - 2|$ .

**Partie B :**

À tout point  $M$  d'affixe  $z$  tel que  $z \neq z_A$ , On associe le point  $M'$  d'affixe  $z'$  défini par  $z' = \frac{-4}{z-2}$ .

1.
  - a) Résoudre dans  $\mathbb{C}$  l'équation  $z = \frac{-4}{z-2}$ .
  - b) En déduire les points associés aux points  $B$  et  $C$ .
  - c) Déterminer et placer le point  $G'$  associé au centre de gravité  $G$  du triangle  $OAB$ .
2. a) **Question de cours :**  
 Pré-requis : le module d'un nombre complexe  $z$  quelconque, noté  $|z|$ , vérifie  $|z|^2 = z\bar{z}$  où  $\bar{z}$  est le conjugué de  $z$ .

Démontrer que :

- pour tous nombres complexes  $z_1$  et  $z_2$ ,  $|z_1 \times z_2| = |z_1| \times |z_2|$ .
  - pour tout nombre complexe  $z$  non nul,  $|\frac{1}{z}| = \frac{1}{|z|}$ .
- b) Démontrer que pour tout nombre complexe  $z$  distinct de 2.  $|z' - 2| = \frac{2|z|}{|z-2|}$ .
- c) On suppose dans cette question que  $M$  est un point quelconque de  $\mathcal{h}$ , où  $\mathcal{h}$  est l'ensemble défini à la question 4. de la partie A. Démontrer que le point  $M'$  associé à  $M$  appartient à un cercle  $C$  dont on précisera le centre et le rayon. Tracer  $C$ .

## 4 Primitive et Calcul d'intégrale

### 4.1 Primitive

**Définition 4.1.**  $f$  est une fonction définie sur un intervalle  $I$ . On dit que  $f$  admet une primitive sur un intervalle  $I$  si et seulement si, il existe une fonction  $F$  dérivable sur  $I$  tel que :

$$\forall x \in I, F'(x) = f(x)$$

**Théorème 4.1.** Soit  $f$  une fonction définie et continue sur un intervalle  $I$ , qui admet une primitive  $F$  sur  $I$ , alors toute primitive  $G$  de  $f$  est sous la forme :

$$\forall x \in I, G(x) = F(x) + k \text{ avec } k \in \mathbb{R}$$

*Démonstration.* Soit la fonction  $G$  est une fonction définie sur  $I$  par  $G(x) = F(x) + k$  ( $k \in \mathbb{R}$ )  $G$  est manifestement dérivable sur  $I$  car somme de fonction dérivable sur  $I$ . On a :  $G'(x) = F'(x) = f(x)$ ,  $G$  est donc une primitive de  $f$  sur  $I$ . Réciproquement si  $G$  est une primitive de  $f$  sur  $I$ , alors on a :  $\forall x \in I (F - G)'(x) = F'(x) - G'(x) = f(x) - f(x) = 0$ . Si la dérivée de  $(F - G)$  est nulle alors  $(F - G)$  est une fonction constante. Donc  $\forall x \in I, G(x) = F(x) + k$  ( $k \in \mathbb{R}$ )  $\square$

**Préposition 4.1.** .

1. Si  $F$  et  $G$  sont des primitives respectivement des fonctions  $f$  et  $g$  sur un intervalle  $I$ , alors  $F + G$  est une primitive de  $f + g$  sur  $I$ .
2. Si  $F$  est une primitive de la fonction  $f$  sur un intervalle et  $\lambda$  un nombre, alors  $\lambda F$  est la primitive de  $\lambda f$  sur  $I$ .

#### 4.1.1 Primitive vérifiant les conditions initiales

**Théorème 4.2.** Soit  $f$  une fonction admettant une primitive sur un intervalle  $I$ . Soit  $x_0 \in I$  et  $y_0 \in \mathbb{R}$ , il existe une et une seule primitive  $F$  sur  $I$  tel que

$$F(x_0) = y_0.$$

*Démonstration.* Soit  $F$  et  $G$  deux primitives de  $f$  sur  $I$ . On a donc :  $F(x) = G(x) + k$ . Si on impose  $F(x_0) = y_0$  alors il existe un unique  $k$  tel que  $k = y_0 - G(x_0)$ .  $\square$

**Exemples 4.1.** Déterminer la primitive  $F$  de  $f(x) = e^x$  tel que  $F(0) = 1$ .

**Solution 4.1.**  $F$  est une primitive de  $f$  donc :  $F(x) = e^x + k$ .  
 $F(0) = e + k$  alors  $k = F(0) - e = 1 - e$  donc  $F(x) = e^x + 1 - e$ .

### 4.1.2 Primitive des fonction usuelles

Fonction	Primitive	Intervalle
$a$	$ax$	$\mathbb{R}$
$x$	$\frac{x^2}{2}$	$\mathbb{R}$
$x^n$	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{x}$	$\ln(x)$	$]0, +\infty[$
$e^x$	$e^x$	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{\sqrt{x}}$	$2\sqrt{x}$	$]0, +\infty[$
$\sin(x)$	$-\cos(x)$	$\mathbb{R}$
$\cos(x)$	$\sin(x)$	$\mathbb{R}$

### 4.1.3 Règles d'intégrations

Fonction du type ...	une primitive du type ...
$s' s^n, n \in \mathbb{N}$	$\frac{s^{n+1}}{n+1}$
$\frac{s'}{s}$	$\ln( s )$
$\frac{s'}{s^n}, n \neq 1$	$-\frac{1}{(n-1)s^{n-1}}$
$\frac{s'}{\sqrt{u}}$	$2\sqrt{s}$
$s' e^s$	$e^s$
$s(ax+b), a \neq 0$	$\frac{1}{a}s(ax+b)$

## 4.2 Intégrale d'une fonction continue

**Définition 4.2.**  $f$  est une fonction continue sur un intervalle  $I$ .  $F$  est une primitive quelconque de  $f$  sur  $I$ , alors pour tous réels  $a$  et  $b$  de  $I$  on a :

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a) = [F]_a^b$$

*Démonstration.* si la fonction  $f$  est continue sur  $I$  alors elle admet une primitive  $G$  sur  $I$  qui s'annule en  $a$ . On a alors pour tous réels  $a$  et  $b$  de  $I$  :  $G(x) = \int_a^b f(x)dt$ , on a alors :  $\int_a^b f(x)dx = G(b)$ .

Soit  $F$  une primitive quelconque de  $f$  sur  $I$ , alors il existe un réel  $k$  tel que :  $F(x) = G(x) + k$ . On obtient alors :  $F(a) = k$  et  $G(b) = F(b) - k = F(b) - F(a)$ .  $\square$

**Conclusion :**  $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$ .

**Exemples 4.2.** Calculer l'intégrale suivante :  $\int_1^4 (\frac{1}{x} + e^{2x} - x)dx$

**Solution 4.2.**  $\int_1^4 (\frac{1}{x} + e^{2x} - x)dx = [\ln(x) + \frac{1}{2}e^{2x} - \frac{1}{2}x^2]_1^4 = \ln(4) + \frac{1}{2}e^{2 \times 4} - \frac{1}{2}4^2 - \ln(1) - \frac{1}{2}e^2 + \frac{1}{3} = \ln(4) + \frac{e^8 - e^2}{2} + \frac{17}{3}$ .

**Propriété algébrique de l'intégrale.** Soit une fonction continue sur un intervalle  $I$  alors,  $\forall a, b \in I$  on a :

$$\int_a^a f(x)dx = 0 \text{ et } \int_a^b f(x)dx = - \int_b^a f(x)dx.$$

**Relation de chasle.**  $\forall a, b, c \in I$ , on a :

$$\int_a^c f(x)dx = \int_a^b f(x)dx + \int_b^c f(x)dx.$$

*Remarque 4.1.* .

i) Si une fonction est « paire » alors d'après la relation de chasle :

$$\int_{-a}^a f(x)dx = \int_{-a}^0 f(x)dx + \int_0^a f(x)dx = \int_0^a f(x)dx + \int_0^a f(x)dx = 2 \int_0^a f(x)dx.$$

ii) Si une fonction est « impaire » alors d'après la relation de chasle :

$$\int_{-a}^a f(x)dx = \int_{-a}^0 f(x)dx + \int_0^a f(x)dx = - \int_0^a f(x)dx + \int_0^a f(x)dx = 0.$$

**Linéarité des intégrales** Soient  $s$  et  $h$  deux fonction continue sur un intervalle  $I$  contenant  $a$  et  $b$ , alors pour tout réels  $\alpha$  et  $\beta$ , on a :

$$\int_a^b \alpha s(x) + \beta h(x)dx = \alpha \int_a^b s(x)dx + \beta \int_a^b h(x)dx$$

**Intégrale et Inégalités** Soient  $s$  et  $h$  deux fonctions continue sur un intervalle  $[a, b]$  .

i) **Positivité**

Si  $s \geq 0$  sur  $[a, b]$  alors :

$$\int_a^b s(x)dx \geq 0$$

ii) **Intégration d'une inégalité**

Si  $s \geq h$  sur  $[a, b]$  alors :

$$\int_a^b s(x)dx \geq \int_a^b h(x)dx$$

iii) **Inégalité de moyenne**

Si  $\forall x \in [a, b], m \leq s(x) \leq M$  alors :

$$m(b-a) \leq \int_a^b s(x)dx \leq M(b-a)$$

iv) **Inégalité de cauchy-schwarz**

Soient  $s$  et  $h$  deux fonction continue sur  $[a, b]$  à valeur réelles alors :

$$\left( \int_a^b [s(x)h(x)]dx \right)^2 \leq \left( \int_a^b (s(x))^2 dx \right) \left( \int_a^b (h(x))^2 dx \right).$$

**Valeur moyenne.** Soit une fonction  $s$  continue sur un intervalle  $[a, b]$ , la valeur moyenne de la fonction sur  $[a, b]$  est le réel  $\mu$  définie par :

$$\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b s(x) dx.$$

### 4.2.1 Calculs d'intégrale

**Théorème 4.3** (Intégration par parties). Soient  $u$  et  $v$  deux fonction dérivable sur  $I$ ,

$a$  et  $b \in I$  alors :

$$\int_a^b (u'v)(t) dt = [(uv)]_a^b - \int_a^b (v'u)(t) dt.$$

**Exemples 4.3.** Calculer  $\int_0^1 x^2 e^x dx$ .

**Solution 4.3.** Soit  $u = x^2 \Rightarrow u' = 2x$  et  $v' = e^x \Rightarrow v = e^x$

On a :  $\int_0^1 x^2 e^x dx = [x^2 e^x]_0^1 - \int_0^1 2x e^x dx = e - 2[xe^x]_0^1 + 2 \int_0^1 e^x = -e + 2(e-1) = e-1$ .

**Théorème 4.4** (Changement de variables). Soient  $\alpha, \beta$  deux réels,  $\alpha \leq \beta$ ,  $\delta \in C^1([\alpha, \beta], \mathbb{R})$   $s$  continue sur l'intervalle  $I$  contenant  $\delta([\alpha, \beta])$  alors en posant  $u = \delta(x)$  on a :

$$\int_{\alpha}^{\beta} s[\delta(x)] \delta'(x) dx = \int_{\delta(\alpha)}^{\delta(\beta)} s(u) du.$$

**Exemples 4.4.** Calculer  $\int_0^1 \frac{1}{(1+x^2)^2} dx$ .

**Solution 4.4.** Posons le changement de variable  $x = \tan(t)$ , alors on a  $dx = (1+\tan^2(t))dt$ ,  $t = \arctan(x)$  et on sait aussi que  $1 + \tan^2(t) = \frac{1}{\cos^2(t)}$ . Comme  $x$  varie de  $x=0$  à  $x=1$  donc  $t$  varie de  $\arctan(0)=0$  à  $\arctan(1)=\frac{\pi}{4}$ .

$$\int_0^1 \frac{1}{(1+x^2)^2} dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{(1+\tan^2 t)^2} (1+\tan^2 t) dt = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{dt}{1+\tan^2 t} = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^2 t dt = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\cos(2t) + 1) dt = \frac{1}{2} \left[ \frac{1}{2} \sin(2t) + t \right]_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{4} + \frac{\pi}{8}.$$

## 4.3 Exercice

**Exercice 4.3.1.** Déterminer les primitives suivants, en précisant pour chacune, un intervalle de validité.  $\int (8\sqrt[3]{x} + 3\sqrt{x} - 5x\sqrt{x}) dx$  ;  $\int \left( \frac{4}{x^3} + \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} \right) dx$  ;  $\int \left( 3(2x+1)^2 + \frac{1}{2x-1} \right) dx$  ;  $\int (15\sqrt{5x-2} + \dots)$  ;  $\int \left( \frac{x-2}{\sqrt{x^2-4x+3}} \right) dx$  ;  $\int \left( \frac{1+\cos(\ln(x))}{x} \right) dx$  ;  $\int \left( \frac{\cos(x)}{3+\sin(x)} \right) dx$  ;  $\int \left( \frac{1+\tan(x)}{\cos^2(x)} \right) dx$ .

**Exercice 4.3.2.** Calculez les valeurs exactes des intégrales suivantes :

$$A = \int_{-1}^4 (2x-3)^2 dx ; B = \int_0^1 (2x+1)(x^2+x) dx ; C = \int_0^2 \frac{3x}{(x^2+1)^2} dx ; D = \int_1^2 \frac{x^3}{x^4+1} dx ; E = \int_0^3 \frac{1}{\sqrt{1+x}} dx ; F = \int_{-1}^{\sqrt{3}} \frac{3x}{\sqrt{x^2+1}} ; G = \int_0^1 x e^{x^2-1} dx ; H = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\pi} \frac{\sin(x)-x \cos(x)}{x^2} dx ; I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(2x - \frac{\pi}{3}) dx ; J = \int_0^{\frac{\pi}{3}} (\cos(x) - x \sin(x)) dx ; K = \int_1^2 \sin(\pi x + \frac{\pi}{4}) dx.$$



**Exercice 4.3.3.** A l'aide d'un changement de variable ou d'intégration par partie, calculer les intégrales suivantes :

$$A = \int_0^1 t\sqrt{t^2+1}dt ; B = \int_0^1 t(1-t)^{2018}dt ; C = \int_e^{e^2} \frac{dt}{x(\ln(x))^2}dt ; D = \int_{\ln(2)}^{\ln(3)} \frac{e^t}{e^t-1}dt ; E = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3(t) \cos(t)dt ;$$

$$F = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3(t) \cos^3(t)dt ; G = \int_0^{\frac{\pi}{2}} t \sin(t)dt ; H = \int_0^1 (1-t)e^t dt ; I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(2t)}{1+2\sin(2t)}dt ; J = \int_0^{\pi} e^t \sin^2(t)dt.$$

**Exercice 4.3.4.** Comparez, sans les calculer, les nombres  $I$  et  $J$ .  $I = \int_1^2 (xe^x)dx$  et  $J = \int_1^2 (x^2e^x)dx$  et  $I = \int_0^1 \frac{1}{1+t^2}dt$  et  $J = \int_0^1 \frac{t}{1+t^2}dt$ .

**Exercice 4.3.5.** Calculez la valeur moyenne de la fonction  $f$  sur l'intervalle  $I$  indiqué.  $f(x) = 5 \sin(2x)$  et  $I = [0; \pi]$  ;  $f(x) = 5 \cos(2x + \frac{\pi}{3})$  et  $I = [0; \frac{\pi}{2}]$  ;  $f(x) = \cos(x)e^{\sin(x)}$  et  $I = [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$ .

**Exercice 4.3.6.** Soit  $a$  et  $b$  deux réels non nuls avec  $a > 0$ . On considère l'intégrale complexe  $\int_0^{\pi} \frac{dt}{a+ib \cos(t)}$ .

1. Montrer que l'intégrale précédente est définie. Soit  $I$  sa valeur. Calculer  $\bar{I}$  en fonction de  $I$ . Que peut-on en conclure ?
2. Calculer  $\Re(I)$ , partie réelle de  $I$  en fonction de  $a$  et  $b$  (On pourra faire changement de variable  $u = \tan(t)$ ). En déduire la valeur de  $I$ .

**Exercice 4.3.7.** Soit  $f$  une fonction continue sur  $\mathbb{R}$  et  $a \in \mathbb{R}$ .

1. Montrer que si  $f$  est impaire alors toute primitive de  $f$  est paire. En déduire alors que  $\int_{-a}^a f(x)dx = 0$ .
2. Montrer que si  $f$  est paire alors la primitive s'annulant en 0 de  $f$  est impaire. En déduire alors que  $\int_{-a}^a f(x)dx = 2 \int_0^a f(x)dx$ .

**Exercice 4.3.8.** On propose de calculer les intégrales suivantes :  $I = \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x^2+1}}$ ,  $J = \int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt{x^2+1}}dx$ ,  $K = \int_0^1 \sqrt{x^2+1}dx$ .

1.  $f$  est la fonction définie sur l'intervalle  $[0; 1]$  par :  $f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2+1})$ .
  - a. Calculer l'expression de sa dérivée  $f'$ .
  - b. Déduisez-en la valeur exacte de  $I$ .
2.
  - a. Justifier que  $I + J = K$ .
  - b. À l'aide de l'intégration par parties portants sur  $K$ , prouvez que  $K = \sqrt{2} - J$ .
  - c. Déduisez-en la valeur exacte de  $J$  et celle de  $K$ .

**Exercice 4.3.9.** Le but de l'exercice est de donner un encadrement du nombre  $J$  définie par :

$$J = \int_0^1 \frac{x^2 e^x}{1+x} dx.$$

$f$  est la fonction définie sur  $[0; 1]$  par :  $f = \frac{e^x}{1+x}$ .

1. Étudiez les variations de  $f$  sur  $[0; 1]$ .

2. On pose pour tout entier naturel  $n$ ,  $s_n = \sum_{k=0}^n f(\frac{k}{n})$ .

a. Justifier que pour tout entier naturel  $k$  entre 0 et 4, on a :

$$\frac{1}{5}f(\frac{k}{5}) \leq \int_{\frac{k}{5}}^{\frac{k+1}{5}} \frac{e^x}{1+x} dx \leq \frac{1}{5}f(\frac{k+1}{5}).$$

b. Déduisez-en l'encadrement suivant :  $\frac{1}{5}s_4 \leq \int_{\frac{4}{5}}^1 \frac{e^x}{1+x} dx \leq \frac{1}{5}(s_5 - 1)$ .

c. Donner une valeur approchée à  $10^{-4}$  près de  $s_4$  et de  $s_5$ , puis déduisez-en l'encadrement :  $1,091 \leq \int_{\frac{4}{5}}^1 \frac{e^x}{1+x} dx \leq 1.164$ .

3. a. Démontez que pour tout  $x$  de  $[0; 1]$  :  $\frac{1}{1+x} = 1 - x + \frac{x^2}{1+x}$ .

b. Justifiez l'égalité :  $\int_0^1 (1-x)e^x dx = J$ .

c. Calculer  $\int_0^1 (1-x)e^x dx$ .

d. Déduisez-en encadrement de  $J$  d'amplitude inférieure à  $10^{-1}$ .

**Exercice 4.3.10** (La constante d'Euler). .

1. Prouver que pour  $n$  de  $\mathbb{N}^*$  et tout  $x$  de  $[0, 1]$  :  $\frac{1}{n} - \frac{1}{n^2} \leq \frac{1}{x+n} \leq \frac{1}{n}$ .

2. a. calculer  $\int_0^1 \frac{1}{x+n} dx$ .

b. Déduisez-en que pour tout entier  $n \geq 1$  :  $\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} \leq \ln(\frac{n+1}{n}) \leq \frac{1}{n}$ .

3. On n'appelle  $U$  la suite définie sur  $\mathbb{N}^*$  par :  $U_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln(n)$ .

Démontrer que la suite  $U_n$  est décroissante.

4. On désigne par  $V_n$  la suite définie sur  $\mathbb{N}^*$  par :  $V_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln(n+1)$ .

Démontrer que la suite  $V_n$  est croissante.

5. a. Prouver que  $U$  converge. On note  $\gamma$  sa limite.

b. Démontrer que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (U_n - V_n) = 0$ .

Déduisez-en que la suite  $V$  converge aussi vers  $\gamma$ .

c. Déterminer la valeur approchée de  $\gamma$  à  $10^{-2}$  près par une méthode de votre choix.

**Remarque :** le nombre  $\gamma$  est appelé **constante d'Euler**.

**Exercice 4.3.11** (Intégration de Wallis). .

On pose l'intégrale suivante pour :

$$n \in \mathbb{N} : W_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n(t) dt.$$

1. Calculer  $W_0$  et  $W_1$ .

2. Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}$  on a  $W_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n(t) dt$ .

*On pourra utiliser un changement de variable.*

3. Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}$  on a  $0 < W_{n+1} < W_n$ .

*En déduire que la suite  $(W_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge.*

4. Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}$  on a  $(n+2)W_{n+2} = (n+1)W_n$ .

*On Pourra utiliser une intégration par parties.*

5. Montrer que la suite  $((n+1)W_n W_{n+1})_{n \in \mathbb{N}}$  est constante.

*En déduire que la limite de  $(W_n)_{n \in \mathbb{N}}$ .*

6. Montrer que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{W_{n+1}}{W_n} = 1$ .

*En déduire une équivalence de  $W_n$  lorsque  $n$  tend vers  $+\infty$ .*

## 5 Équation différentielle

### 5.1 Équation différentielle de premier ordre

Dans la suite, la variable  $t$  (*le temps en Physique*) varie dans un intervalle  $I$  et  $y$  (ou  $x$  ou  $z$ ) est une fonction de  $t$ .

Une équation linéaire du 1<sup>er</sup> ordre est la forme :

$$\alpha(t)y' + \beta(t)y = f(t)$$

où  $\alpha, \beta$ , et  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  Résoudre cette équation, c'est trouver toutes les fonction  $y(t)$  la vérifiant.

Si  $f = 0$ , on dit que l'équation est *homogène*

Si  $f \neq 0$ , on dit que l'équation est avec *second membre*

Si  $\alpha(t)$  n'est s'annule pas sur  $I$  on se ramène à la forme normal :  $y' = a(t)y + b(t)$ .

#### 5.1.1 Résolution de l'équation homogène $y' = a(t)y$

$$y' = a(t)y \Rightarrow \frac{y'}{y} = a(t) \Rightarrow \int \frac{y'}{y} d(t) = \int a(t) d(t) \Rightarrow |\ln(y)| = \int a(t) d(t) \\ \Rightarrow e^{|\ln(y)|} = e^{\int a(t) d(t)} \text{ donc :}$$

$$y = ke^{\int a(t) d(t)} \text{ avec } k \in \mathbb{R}.$$

**Préposition 5.1.** Les solution de l'équation homogène  $y' = a(t)y$  sont  $y = ke^{\int a(t) d(t)}$  avec  $k \in \mathbb{R}$  où  $\int a(t) d(t)$  est une primitive de  $a(t)$  sur  $I$ .

**Propriété 5.1.** Pour tous couple  $(x_0, y_0) \in I$  telle que  $y(x_0) = y_0$  fixe comme condition initiale détermine  $k$  unique. Donc l'équation homogène  $y' = a(t)y$  admet une et une unique solution vérifiant cette condition initiale.

**Exemple :**  $y' = -y$ , on peut voir immédiatement que  $y(t) = ke^{-t}$ .

#### 5.1.2 Résolution de l'équation avec second membre

**Solution général** = solution homogène + solution particulier.

Pour trouver les solutions particuliers, on utilise la *méthode de la variation de la constante*.

$$y' = a(t)y + b(t)$$

**Équation homogène :**  $y' = a(t)y \Rightarrow y = ke^{\int a(t) d(t)}$

**Solution particulier :** On prend,  $y_0 = k(t)e^{\int a(t)}$   $\Rightarrow y'_0 = k'(t)e^{\int a(t)} + k(t)a(t)e^{\int a(t)}$  donc  $y' = a(t)y + b(t) \Rightarrow k'(t)e^{\int a(t)} + k(t)a(t)e^{\int a(t)} = a(t)k(t)e^{\int a(t)} + b(t) \Rightarrow k'(t)e^{\int a(t)} = b(t) \Rightarrow k'(t) = b(t)e^{-\int a(t)} \Rightarrow k(t) = \int b(t)e^{-\int a(t)}.$

**Solution :**

$$y(t) = \int b(t)e^{-\int a(t)} + ke^{\int a(t)d(t)}$$

**Exemples 5.1.** Résoudre l'équation différentielle suivant :  $y' + y = xe^{-x}$

**Solution 5.1.** On résout d'abord l'équation sans second homogène  $y' + y = 0$  qui donne  $y(x) = ke^{-x}$  avec  $k \in \mathbb{R}$ . On cherche ensuite une solution particulière sous la forme  $y(x) = p(x)e^{-x}$ , avec  $p$  un polynôme.  $y$  est solution de l'équation si et seulement si  $p'(x) = x$ . Une solution particulière est donc  $\frac{x^2}{2}e^{-x}$ , l'ensemble des solutions de l'équation est :

$$y(x) = (\frac{1}{2}x^2 + k)e^{-x},$$

avec  $k \in \mathbb{R}$ .

## 5.2 Équation différentielle d'ordre 2 à coefficient constants

### 5.2.1 Résolution de l'équation homogène $ay'' + by' + cy = 0$

On résous l'équation  $ar^2 + br + c = 0$ . On cherche des solutions de la forme  $e^{rt}$  (où  $r \in \mathbb{R}$ )  $\Delta = b^2 - 4ac$

Si $\Delta > 0$	$E$ admet deux racines $r_1$ et $r_2$ distincts	$y(t) = \lambda e^{r_1 t} + \beta e^{r_2 t} \ (\lambda, \beta \in \mathbb{R})$
Si $\Delta = 0$	$E$ admet une solution double $r_0$	$y(t) = (\lambda t + \beta)e^{r_0 t} \ (\lambda, \beta \in \mathbb{R})$
Si $\Delta < 0$	$E$ admet deux solutions complexes conjuguées : $\alpha + i\mu$ et $\alpha - i\mu$ ( $\alpha, \mu \in \mathbb{R}$ )	$y(t) = e^{\alpha t}(\lambda \cos(\mu t) + \beta \sin(\mu t)) \ (\lambda, \beta \in \mathbb{R})$

**Propriété 5.2.** Pour tous couple  $(x_0, y_0)$  et  $(x_0, y_1)$  telle que  $y(x_0) = y_0$  et  $y'(x_0) = y_1$  fixe comme condition initiale. L'équation homogène  $ay'' + by' + cy = 0$  admet une et une unique solution vérifiant cette condition initiale.

**Exemples 5.2.** Résoudre l'équation homogène  $y'' - 4y' + 4 = 0$

**Solution 5.2.** L'équation caractéristique  $r^2 - 4r + 4 = 0$   $\Delta = 16 - 16 = 0$ , donc l'équation caractéristique à une racine double  $r_0 = \frac{4}{2} = 2$  donc  $y(x) = (ax + y)e^{2x}$  où  $a, b \in \mathbb{R}$ .

### 5.2.2 Équation avec second membres $ay'' + by' + cy = f(t)$

Pour résoudre une équation différentielle avec seconde membre, on utilise le procédure suivant :

- Déterminer les solutions de l'équation homogène.
- Déterminer une solution particulier  $h$  de cette équation.
- Démontrer que les solutions de l'équation avec seconde membre sont les fonctions du type  $f - h$  où  $f$  est une solution de l'équation homogène.

- résoudre l'équation homogène et en déduire l'équation avec seconde membre.

**Exemples 5.3.** On considère l'équation :  $y'' + 2y' + 4y = xe^x$  (E).

1. Résoudre l'équation différentielle homogène associée à (E).
2. Déterminer les réels  $a$  et  $b$  tel que  $h(x) = (ax + b)e^x$  est solution de (E).
3. Démontrer qu'une fonction  $f$  est solution de (E) si et seulement si  $f - h$  est solution de  $(E_0)$ .  
En déduire l'ensemble des solutions de (E).
4. Déterminer l'unique solution  $s$  de (E) vérifiant  $s(0) = 1$  et  $s(1) = 0$ .

**Solution 5.3.** .

1. Le polynôme caractéristique associé à E est :  $r^2 + 2r + 4$  ; son discriminant est  $\Delta = 4 - 16 = -12$ , donc il a deux racine complexe  $r_1 = -1 - i\sqrt{3}$  et  $r_2 = -1 + i\sqrt{3}$ . Les solutions de l'équation homogène sont donc toutes fonctions :  $y(x) = e^{-x}(a \cos(\sqrt{3}x) + b \sin(\sqrt{3}x))$  ( $a$  et  $b \in \mathbb{R}$ )
2. On cherchera une solution de l'équation sous la forme :  $h(x) = (ax + b)e^x$   $h''(x) + 2h'(x) + 4h(x) = (7ax + 7b + 4)e^x$ . Donc  $h(x)$  est solution si et seulement si  $7ax + 7a + 4b = x$ . On trouve après identification des coefficients :  $a = \frac{1}{7}$  et  $b = \frac{-4}{49}$ . Donc  $h(x) = \frac{1}{7}(x - \frac{4}{7})e^x$  est donc solution de E.
3. Condition nécessaire : Montrons que si  $f$  est solution de E alors  $f - h$  est solution de  $E_0$   
 $f$  est solution de E si et seulement si  $f'' + 2f' + 4f = xe^x$   
 $h$  est solution de E si et seulement si  $h'' + 2h' + 4h = xe^x$   
 $f - h \Leftrightarrow f'' + 2f' + 4f - (h'' + 2h' + 4h) = 0 \Leftrightarrow (f'' - h'') + 2(f' - h') + 4(f - h) = 0$   
donc  $f - h$  est solution de l'équation homogène.  
Condition suffisant : Montrons que si  $f - h$  est solution de  $E_0$  alors  $f$  est solution de E.  
 $f - h$  est solution de  $E_0$  si et seulement si  $(f'' - h'') + 2(f' - h') + 4(f - h) = 0 \Leftrightarrow f'' + 2f' + 4f - (h'' + 2h' + 4h) = 0 \Leftrightarrow f'' + 2f' + 4f = h'' + 2h' + 4h$  comme  $h$  est solution de E, on a :  $h'' + 2h' + 4h = xe^x \Rightarrow f'' + 2f' + 4f = xe^x$ . Comme  $f$  vérifie l'équation alors  $f$  est solution de E.  
 $(f - h)$  est solution de  $E_0$  donc  $f - h = e^{-x}(a \cos(\sqrt{3}x) + b \sin(\sqrt{3}x))$   
 $\Leftrightarrow h = \frac{1}{7}(x - \frac{4}{7})e^x + e^{-x}(a \cos(\sqrt{3}x) + b \sin(\sqrt{3}x))$
4. Soit  $s$  une solution de E. Les conditions  $s(0) = 1$ ,  $s(1) = 0$  sont réalisées si et seulement si
 
$$\begin{cases} 1 &= e^{-0}(a \cos(\sqrt{3} \times 0) + b \sin(\sqrt{3} \times 0)) + \frac{1}{7}(0 - \frac{4}{7})e^0 \\ 0 &= e^{-1}(a \cos(\sqrt{3} \times 1) + b \sin(\sqrt{3} \times 1)) + \frac{1}{7}(1 - \frac{4}{7})e^1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 1 &= a + \frac{-4}{49} \\ 0 &= e^{-1}(a \cos(\sqrt{3}) + b \sin(\sqrt{3})) + \frac{3}{49}e \end{cases}$$
On a  $a = \frac{53}{49}$  et  $b = -\frac{54 \cos(\sqrt{3}) + 3e^2}{49 \sin(\sqrt{3})}$

### 5.3 Exercice

**Exercice 5.3.1.** Sur  $]0, +\infty$ , on considère l'équation différentielle  $(E)$  du 1<sup>er</sup> ordre :

$$y' + \frac{1}{t}y = \ln(t)$$

- a) Déterminer toutes les solutions de l'équation homogène associée à  $(E)$ .
- b) A l'aide d'une intégration par partie, déterminer sur  $]0, +\infty[$  la primitive  $\int t \ln(t)$ .
- c) En utilisant la méthode de variation de constant, déterminer toutes les solution de  $(E)$ .
- d) Déterminer les solution de  $(E)$  vérifiant les conditions initiale  $y(1) = 2$ .

**Exercice 5.3.2.** Un laboratoire de recherche étudie l'évolution d'une population animale qui semble en voie de disparition. En l'an 2000, l'effectif était égale à mille(1 000). L'effectif de cette population évolue par rapport au temps  $t$  et peut être approché par une fonction  $f$ . Le temps  $t$  est exprimé en années à partir de 2000. La fonction  $f$  est dérivable, strictement positive sur l'intervalle  $[2000, +\infty[$  et est solution de l'équation différentielle :  $(E_1)$ ;  $y'(t) + \frac{1}{200}y(t) = -\frac{200}{t^2} + \frac{1}{t}$ .

1. Soit  $h$  la fonction dérivable et définie sur l'intervalle  $[2000, +\infty[$  par :  
 $h(t) = \frac{200}{t}$ . Vérifie que  $h$  est une solution de  $(E_1)$ .
2. Résous l'équation différentielle  $(E_2)$  :  $y'(t) + \frac{1}{200}y(t) = 0$ .
3. a) Démontre qu'une fonction  $g$  est solution de  $(E_1)$  si et seulement si  $g - h$  est solution de  $(E_2)$ .  
b) Déduis-en les solution de  $(E_1)$ .  
c) Sachant que  $f(2000) = 1000$ , vérifie que :  $\forall t \in [2000, +\infty[$ ,  
 $f(t) = 999,9e^{(10 - \frac{t}{200})} + \frac{200}{t}$ .  
d) Déterminer le nombre d'individus de cette population animal en 2021.  
Donner le résultat arrondi à l'ordre 0.

**Exercice 5.3.3.** Soit  $\theta \in [0; \frac{\pi}{2}[$

1. a) Résolution dans  $\mathbb{C}$  l'équation :  $z^2 + (2 \sin \theta)z + 1 = 0$  ( $e_0$ ).  
b) Déterminer le module et un argument de chacune des racines de  $(e_0)$ .
2. On considère l'équation différentielle :  $y'' + 2(\sin \theta)y' + y = x \cos \theta + 2 \sin \theta$  ( $e_1$ ).  
a) On pose  $y_0(x) = ax + b$ ; avec  $a$  et  $b$  des nombres réels.  
Déterminer les réels  $a$  et  $b$  tels que  $y_0$  soit solution de  $(e_1)$ .  
b) Montrer qu'une fonction  $y$  est solution de  $(e_1)$  si et seulement si  $y - y_0$  est solution d'une équation différentielle homogène du seconde ordre que l'on résoudra.
3. Déterminer toutes les solutions de  $(e_1)$ .

**Exercice 5.3.4.** On considère l'équation différentielle  $(E)$  :  $y' - 2y = e^{2x}$ .

1. Démontrer que la fonction  $u$  définie sur  $\mathbb{R}$  par :  $u(x) = xe^{2x}$  est une solution de  $(E)$ .
2. Résoudre l'équation différentielle  $(E_0)$  :  $y' - 2y = 0$ .

3. Démontrer qu'une fonction  $v$  définie sur  $\mathbb{R}$  est solution de  $E$  si et seulement si  $v - u$  est solution de  $(E_0)$ .
4. En déduire toutes les solutions de l'équation  $(E)$ .
5. Déterminer la fonction, solution de  $(E)$ , qui prend la valeur 1 en 0.

**Exercice 5.3.5.** 1. Résoudre l'équation différentielle  $2y' + y = 0$  ( $E$ ) dont l'inconnue est une fonction définie et dérivable sur  $\mathbb{R}$ .

2. On considère l'équation différentielle  $2y' + y = e^{-\frac{x}{2}}(x+1)$  ( $E'$ )
  - a) Déterminer deux réels  $m$  et  $p$  tels que la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = e^{-\frac{x}{2}}(mx^2 + px)$  soit une solution de  $(E')$ .
  - b) Soit  $g$  une fonction définie et dérivable sur  $\mathbb{R}$ . Montrer que  $g$  est solution de  $(E')$  si et seulement si  $g - f$  est solution de  $(E)$ . Résoudre l'équation  $(E')$ .
3. Étudier les variations de la fonction  $h$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $h(x) = \frac{1}{4}e^{-\frac{x}{2}}(x^2 + 2x)$
4. Déterminer les limites en  $-\infty$  et en  $+\infty$  de  $h$ .
5. Dans le plan rapporté à un repère orthonormé  $(O; \vec{i}; \vec{j})$ , on note  $\varepsilon$  la courbe représentative de la fonction  $h$  et  $\Gamma$  celle de la fonction  $x \mapsto e^{-\frac{x}{2}}$ .
  - a) Étudier les positions relatives de  $\varepsilon$  et de  $\Gamma$ .
  - b) Tracer ces deux courbes sur un même graphique.

**Exercice 5.3.6.** 1. On suppose connu le résultat suivant : la fonction  $x \mapsto e^x$  est l'unique fonction  $\phi$  dérivable sur  $\mathbb{R}$  telle que  $\phi' = \phi$  et  $\phi(0) = 1$ . On considère un réel  $\alpha$ .

- a) Montrer que la fonction  $f : x \mapsto e^{ax}$  définie sur  $\mathbb{R}$  est solution de l'équation différentielle  $y' = ay$ .
- b) On considère une fonction  $g$  solution de l'équation différentielle  $y' = ay$  et on note  $h$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $h(x) = g(x)e^{-ax}$ . Montrer que  $h$  est constante.
- c) En déduire l'ensemble des solutions de  $y' = ay$ .
2. On considère l'équation différentielle  $(E) : y' = 2y + \cos x$ .
  - a) Déterminer les réels  $a$  et  $b$  pour que la fonction  $f_0$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f_0(x) = a \cos x + b \sin x$  soit une solution de  $(E)$ .
  - b) Résoudre l'équation différentielle  $(E_0) : y' = 2y$ .
  - c) Démontrer que  $f$  est solution de  $(E)$  si et seulement si  $f - f_0$  est solution de  $(E_0)$ .
  - d) En déduire les solutions de  $(E)$ .
  - e) Déterminer la solution  $k$  de  $(E)$  vérifiant  $k(\frac{\pi}{2}) = 0$ .

**Exercice 5.3.7.** On considère les deux équations différentielles définies sur  $] -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[ : (E) : y' + (1 + \tan x)y = \cos x$  et  $(E_0) : y' + y = 1$ .

1. Déterminer les solutions de  $(E_0)$ .
2. On considère deux fonctions  $f$  et  $g$  dérivables sur  $] -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$  telles que  $f(x) = g(x) \cos x$ . Démontrer que  $f$  est solution de  $(E)$  si et seulement si  $g$  est solution de  $(E_0)$ .
3. Déterminer la solution de  $f$  de  $(E)$  telle que  $f(0) = 0$ .



## 6 Dénombrement et Probabilité

### 6.1 Dénombrement

#### 6.1.1 Les ensembles finis

**Définition 6.1.** On dit qu'un ensemble  $E$  est fini lorsqu'il admet un nombre fini d'éléments. Le nombre d'élément de  $E$  est appelé le **cardinal** de l'ensemble et est noté :  $Card(E)$  ou  $|E|$  ou encore  $\#E$ .

**Par convention,** l'ensemble vide est un ensemble fini de cardinal 0.

**Définition 6.2** (Dénombrer). Dénombrer c'est compter le nombre d'éléments qui contient un ensemble un ensemble fini, c'est à dire en déterminer le cardinal.

**Définition 6.3** (Partition d'une ensemble). Soit  $p \in \mathbb{N}^*$  et  $E_1, \dots, E_p$  des sous-ensembles d'un ensemble  $E$  fini ou non. On dit que  $P = (E_1, \dots, E_p)$  est une partition de  $E$  lorsque

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{il sont non vide} \\ E_1 \cup E_2 \cup \dots \cup E_p = E \\ E_1, \dots, E_p \text{ sont disjoints deux à deux.} \end{array} \right.$$

**Propriété 6.1** (Formule sur les cardinal). .

1. Si  $P = (E_1, \dots, E_p)$  est une partition d'un ensemble fini  $E$ , on a :  
 $Card(E) = Card(E_1) + Card(E_2) + \dots + Card(E_p)$
2. Si  $A$  et  $B$  sont deux ensemble fini,  
on a :  $Card(A \cup B) = Card(A) + Card(B) - Card(A \cap B)$
3. Pour tous ensemble fini  $A$  et  $B$   
 $Card(A \times B) = Card(A) \times Card(B)$  (Produit cartésien)

#### 6.1.2 p-liste d'un ensemble fini

**Définition 6.4.** Soit  $E$  un ensemble fini,  $p$  un entier naturel non nul.

On nomme **p-liste d'éléments** de  $E$ , toute liste  $(x_1; x_2; \dots; x_p)$  où  $x_1; x_2; \dots x_p$  sont tous élément de  $E$  (on note des p-liste de  $E$  :  $E^p$ .)

**Préposition 6.1.**  $n$  et  $p$  sont deux entiers supérieurs ou égaux à 2.  $E$  est un ensemble de cardinal  $n$ . L'ensemble des p-listes de  $E$  a pour cardinal  $n^p$ .

#### 6.1.3 Arrangements

**Définition 6.5.** On obtient un arrangement de  $p$  parmi  $n$  lorsqu'on choisit  $p$  éléments différents parmi  $n$  élément possibles en tenant compte de l'ordre dans lequel ils ont été choisis.

**Théorème 6.1.** Si  $0 \leq p \leq n$ , le nombre d'arrangements possibles obtenus en choisissant  $p$  éléments parmi  $n$  est :  $A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$ .

*Remarque 6.1.* Soit  $E$  un ensemble à  $n$  éléments, on appelle **permutation** tout arrangement de  $n$  éléments de  $E$ . Le nombre de permutation d'un ensemble à  $n$  éléments est  $n!$ .

#### 6.1.4 Combinaisons

**Définition 6.6.** On appelle combinaison d'un ensemble  $E$  de cardinal  $n$  tout sous-ensemble de  $E$  de cardinal  $p$ .

**Théorème 6.2.** Si  $0 \leq p \leq n$ , le nombre de combinaisons possibles dans un ensemble à  $n$  éléments est :  $C_n^p = \binom{n}{p} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$ .

#### 6.1.5 Tableau récapitulatif

Modalisation	les $p$ éléments sont ordonnées	les $p$ éléments sont distincts	outil	nombre de tirage
Tirage successif avec remise	oui	non	p-list	$n^p$
tirage successif sans remise	oui	oui	arrangement ou permutation	$A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$
tirage simultanée	non	oui	combinaison	$C_n^p = \frac{n!}{p!(n-p)!}$

## 6.2 Probabilité

### 6.2.1 Expérience aléatoire

Une expérience est dite aléatoire lorsqu'elle a plusieurs issues (ou résultats) possibles et qu'on ne peut ni prévoir ni calculer laquelle de ses issues sera réalisée lorsque l'expérience a eu lieu.

**N.B :** Éventualités ce sont les issues de l'expérience aléatoires.

*Remarque 6.2.* Presque la totalité des expériences aléatoires (e.a) étudiées auront des nombres finis d'issues. Elles seront notées par les lettres  $\varepsilon$  ou  $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots$ , etc lorsqu'il y a plusieurs e.a en étude.

### 6.2.2 Événement

**Définition 6.7.** Un événement est une partie (ou sous ensemble) de l'ensemble  $\Omega$  des issues d'une e.a.

### 6.2.3 Vocabulaire

- a) Dire qu'une issue  $a$  de e.a réalise l'événement  $A$  signifie que  $a$  est un élément de l'ensemble  $A$ . On note :  $a \in A$ .
- b) On dit que  $A$  est incluse dans  $B$  si tout élément de  $A$  est dans  $B$ .  
On écrit  $A \subseteq B$ .
- c) Une événement est **élémentaire** s'il contient qu'une seule issue  $B = \{w_i\}$ .
- d)  $\emptyset$  est événement **impossible**. Il traduit la possibilité qu'aucune issues ne se réalise.
- e)  $\Omega$  est appelé événement **certain**. Il traduit la possibilité que l'une des issues prévue soit le résultat de l'e.a.
- f) Événement **complémentaire** (contraire) de  $A$  est l'ensemble de  $\Omega$  qu'on réalise pas en  $A$ . On le note  $\bar{A}$ .
- g) **L'intersection** de  $A$  et  $B$  est l'événement noté  $A \cap B$  est formé par les élément qui sont dans  $A$  et dans  $B$ , il se réalise si  $A$  et  $B$  se réalisent.
- h) La **réunion** de  $A$  et  $B$  est l'événement noté  $A \cup B$  constitué les issues qui réalise l'événement  $A$  ou l'événement  $B$ .  
c'est-à-dire **au moins** l'un des deux.
- i)  $A$  et  $B$  sont dits **incompatibles** si  $A \cap B = \emptyset$ . Elle ne peut pas se réalisent simultanément.

### 6.2.4 Lois de probabilité

**Définition 6.8.** Définir une loi de probabilité sur  $\Omega$ , c'est associer à chaque issue  $x_i$  un nombre  $P_i$ , positif ou nul le telle façon que  $P_1 + P_2 + \dots + P_n = 1$ .

Issue	$x_i$	$x_2$	$\dots$	$x_n$
Probabilité	$P_1$	$P_2$	$\dots$	$P_n$

Ce nombre  $P_i$  est appelé probabilité de l'issue  $x_i$ .

### 6.2.5 Probabilité d'une événement

**Définition 6.9.** La probabilité d'une événement  $A$  est donnée par la **somme** des probabilité de toutes les issues qui composent cet événement.

$$P(A) = \sum_{x=A} P_x$$

**N.B :**  $P(A)$  est appelé mesure de probabilité de  $A$ .

**Propriété 6.2.** La probabilité de l'événement **certain** est  $P(\Omega) = 1$

La probabilité de l'événement **impossible** est  $P(\emptyset) = 0$

Pour tout événement  $A$  :  $0 \leq P(A) \leq 1$ ,  $P(A) + P(\bar{A}) = 1$   
et  $P(A) + P(B) = P(A \cup B) + P(A \cap B)$ .

Si l'événement est **indépendant**  $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$ .

Si l'événement est **incompatible**  $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ .

### 6.2.6 Équiprobable

**Définition 6.10.** Il y a équiprobable si toutes les issues ont la même probabilité. Dans ce cas :

$$P_i = \frac{1}{\text{nombre d'issue de l' e.a}}$$

Dans le cas d'une loi **équiprobable**, la probabilité d'un événement  $A$  est donnée par :

$$P(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{\text{nombre de cas favorable}}{\text{nombre de cas possibles}}$$

### 6.2.7 Variable aléatoire

**Définition 6.11.** une variable aléatoire (v.a) est une fonction définie sur  $\Omega$  et a valeurs dans  $\mathbb{R}(\Omega \rightarrow \mathbb{R})$  on la note  $X$  avec  $\Omega$  univers d'une e.a.

#### loi de probabilité d'une variable aléatoire

**Définition 6.12.** Une v.a  $X$  est définie sur l'univers  $\Omega$  d'une e.a.

**Notons**  $E = (x_1; x_2; \dots; x_n)$  l'ensemble des valeurs prises par  $X$ .

La loi de probabilité de  $X$  est la fonction qui à pour chaque  $x_i$  de  $E$  lui associe sa probabilité notée  $P(X = x_i)$ . On peut la représenter sous forme d'un tableau de valeurs.

$x_i$	$x_1$	$x_2$	.....	$x_n$
$P(X = x_i)$	$P(X = x_1)$	$P(X = x_2)$	.....	$P(X = x_n)$

#### Espérance, variance et écart-type d'une loi de probabilité

**Définition 6.13.** .

1. L'**espérance** mathématique de la loi de probabilité de  $X$  est la moyenne de la série des  $x_i$  pondérés par  $P_i$ , on le note  $E(x)$ .

$$E(x) = \frac{p_1 x_1 + p_2 x_2 + \dots + p_n x_n}{p_1 + p_2 + \dots + p_n},$$

or  $p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1$  donc  $p(x) = p_1 x_1 + p_2 x_2 + \dots + p_n x_n$ ,

$$E(x) = \sum_{i=1}^n P_i x_i$$

2. La **variance** de la loi probabilité de  $X$  est la variance de la série des  $x_i$  pondérés par  $P_i$  ; on la note  $V(x)$

$$V(x) = E([x - E_X])^2 = E(x^2) - (E(x))^2$$

*Démonstration.*  $V(x) = E[(x - E(x))^2] = E(x^2 + E(x)^2 + 2xE(x)) = E(x^2) + E[E(x)^2] + E[2xE(x)]$  or  $E(x) = \sum_k x_k P(X = x_k) = nbre \Rightarrow E(x)^2$  est un nombre donc  $E[E(x)^2] = E(x)^2$  car  $E(nbre) = nbre$ . De même  $E(2xE(x)) = 2E(x)E(x)$  donc  $Var = E(x^2) + E(x)^2 - 2E(x)^2 = E(x^2) - E(x)^2$ .  $\square$

3. L' **écart-type** de la loi de probabilité de  $X$  est l'écart-type de la série des  $x_i$  pondérés par  $P_i$  ; on la note  $\delta(x)$ .

$$\delta(x) = \sqrt{V(x)}$$

### 6.2.8 Loi Binomial

**Définition 6.14.** On considère une expérience aléatoire à deux issues. l'une qu'on appelle **Succès** avec une probabilité  $p$  et l'autre, l'événement contraire qu'on appelle **Échec** avec une probabilité  $1-p$ . C'est une **épreuve de Bernoulli** de paramètre  $p$  égale à la probabilité de succès.

On recommence  $n$  fois une épreuve de Bernoulli de paramètre  $p$  de façons identiques c'est-à-dire **avec remise**.

On appelle  $X$  la variable aléatoire qui compte le nombre de succès sur les  $n$  épreuves.  $X$  prend les valeurs  $0; 1; 2; \dots; n$ . On écrit :  $X(\Omega) = 0; 1; 2; \dots; n$ .

On dit que  $X$  suit une loi binomiale  $\mathbb{B}(n, p)$  de paramètres  $n$  et  $p$ .

On pose  $X$  le nombre de succès au tours de  $n$  répétition  $(0; 1; 2; \dots; n)$ . La probabilité d'obtenir  $k$  succès est :

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

$\binom{n}{k}$  désigne le coefficient binomial.

**"k parmi n"**, c'est-à-dire le nombre de chemins qui aboutissent à  $k$  succès.

### Expérience ; et écart-type d'un loi Binomial.

Soit v.a  $X$  qui suit une loi binomial  $\mathbb{B}(n, p)$ .

$$E(x) = np, \quad V(x) = np(1-p) \text{ et } \delta = \sqrt{np(1-p)}$$

### 6.2.9 Probabilité conditionnelles

**Définition 6.15.** Soit  $\Omega$  un ensemble fini et  $p$  une loi de probabilité sur l'univers  $\Omega$  liée à une e.a. Soit  $A$  et  $B$  deux événements de l'univers  $\Omega$  tel que  $P(B) \neq 0$ .

On définit la probabilité que  **$A$  soit réalisé sachant que  $B$  est réalisé** noté  $P_B(A)$  ou  $P(A/B)$  de la manière suivante :

$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

**Théorème 6.3.** Soient  $A$  et  $B$  deux événements tels que  $p(B) \neq 0$ .

$$P(A \cap B) = P_B(A) \times P(B) = P(A) \times P_A(B).$$

**Propriété des probabilités conditionnelles :** On admet que la probabilité conditionnelle  $P(a)$  vérifie toutes les propriétés usuelles des lois de probabilité.

**Théorème 6.4.** Soit  $A$  un événement tel que  $P(A) \neq 0$ .

- 1) Pour tout événement  $B$ ,  $0 \leq P(A) \leq 1$ .
- 2)  $P_A(\emptyset) = 0$  et  $P_\Omega(A) = 1$
- 3) Pour tout événement  $B$ ,  $P_A(\overline{B}) = 1 - P_A(B)$
- 4) Si  $B$  et  $C$  sont deux événements incompatibles, alors  
 $P_A(B \cup C) = P_A(B) + P_A(C)$ .

**Propriété 6.3.** Si  $A$  et  $B$  sont deux événements indépendants :  $P_A(B) = P(B)$ .

*Démonstration.*  $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{P(A) \times P(B)}{P(A)} = P(B)$ . □

### Formule de probabilité total

**Théorème 6.5.** Soit  $\{A_i; i \in I\}$  un système complet d'événement, tous de probabilité non nulle. Soit  $B$  un événement. Alors :

$$P(B) = \sum_{k=1}^n P(B \cap A_i) = \sum_{k=1}^n P(B/A_i)P(A_i)$$

## 6.3 Exercice

**Exercice 6.3.1.** Les deux parties  $A$  et  $B$  de cet exercice sont indépendantes.

### Partie A

En vue de sélectionner des joueurs pour la coupe internationale de football, une fédération nationale met en place à la disposition de l'entraîneur un certain nombre de joueurs évoluant au pays et hors du pays. Parmi eux, il y a des joueurs professionnels et des joueurs non professionnels.

Ces joueurs se répartissent comme suit :

- 75% des joueurs évoluant au pays ;
- 60% des joueurs évoluant au pays sont professionnels.
- 80% des joueurs évoluant hors du pays sont professionnels.

On choisie au hasard un joueur pour subir un teste antidopage.

On désigne par  $A$  l'évènement « Le joueur choisie évolue au pays ».

On désigne par  $B$  l'évènement « Le joueur choisie est professionnel ». On désigne par  $C$  l'évènement « Le joueur choisie évolue au pays et professionnel ».

1. a) Traduis l'énoncé par un arbre de probabilité.  
b) Donne  $P_A(B)$ , la probabilité de  $B$  sachant  $A$ .  
c) Démontre que la probabilité de l'évènement  $C$  est égale à 0.45.
2. Calculer la probabilité de  $B$ .

### **Partie B**

Un entraîneur doit sélectionner de joueurs parmi ceux mis à disposition. Pour ce fait, il soumet d'abord chaque joueur à test qui consiste à faire trois tirs au but successifs à partir du point de penalty. Et retenu à l'issue de ce premier test, tout les joueur que réussit au moins deux de ces trois tirs. On suppose que les tirs sont indépendants les uns au autres et que la probabilité qu'un joueur donnée réussisse un tir est égale à  $\frac{3}{4}$ .

1. Soit  $X$  la variable aléatoire égale au nombre de tirs réussir par un joueur donné à l'issue de l'épreuve de trois tirs au but successifs.  
a) Détermine les variable prise par  $X$ .  
b) Détermine la lois de probabilité de  $X$ .
2. Calculer l'espérance mathématique de  $X$ .
3. Démontre que la probabilité qu'un joueur donné retenu est égale à  $\frac{27}{32}$ .

**Exercice 6.3.2.** Un éleveur de chevaux possède dans son écurie quatre étalons et six juments. Il décide de vendre trois de ces animaux pour faire face à ses dépenses. On suppose que tous les animaux ont la même probabilité d'être vendus.

1. a) Calculer  $\text{card } \Omega$ .  
b) Calculer la probabilité des évènements suivants :  
 $A$  : « Parmi les trois chevaux, il y a au plus un étalon ».  
 $B$  : « Parmi les trois chevaux, il y a au moins une jument ».
2. Le prix d'un étalon est 500 000 francs et celui d'une jument est 400 000 francs. Calculer la probabilité de l'évènement  
 $C$  : « Obtenir un prix de vente total qui soit au moins de 1 200 000 francs ».
3. Cet éleveur doit payer la scolarité de ses trois enfants répartie comme suit :
  - 800 000 F pour le premier garçon qui est en année de master à l'université ;
  - 400 000 F pour sa fille qui est à l'internat ;

- 80 000 F pour le deuxième garçon qui est au lycée.

Quelle est la probabilité pour que cet élève puisse payer la scolarité totale de ses enfants en élevant les trois chevaux au hasard.

4. Soit  $X$  la variable aléatoire, qui à chaque tirage de trois chevaux, associe le prix de vente obtenu. Déterminer la loi de probabilité de  $X$ .

**NB :** On donnera les résultats sous forme de fractions irréductibles.

**Exercice 6.3.3.** Une urne contient cinq boules portant le numéro 2; quatre boules portant le numéro 3 et trois boules portant le numéro 4.

On tire simultanément trois boules de l'urne. On suppose que tous les tirages sont équiprobables.

1. Déterminer les probabilités des événements suivantes :  
 $A$  : « Tirer au moins une boule portant le numéro 3 ».  
 $B$  : « Tirer trois boules portant tous des numéros différents ».  
 $C$  : « Tirer trois boules portant le même numéro ».  
 $D$  : « Tirer trois boules dont exactement deux portent le même numéro ».
2. Soit  $X$  la variable aléatoire égale à la somme des numéros marqués sur les trois boules tirées.  
  - a) Quelles sont les valeurs prises par  $X$ .
  - b) Déterminer la loi de probabilité de  $X$ .
  - c) Calculer l'espérance mathématique  $E(X)$  de  $X$ .
3. On appelle succès l'événement  $E$  : «  $(E \geq 10)$  »  
  - a) Calculer la probabilité de  $E$ .
  - b) On répète trois fois l'expérience de manière indépendante. Calculer la probabilité d'obtenir exactement deux succès.

On donne :  $\frac{23}{110} \simeq 0.2$  ;  $\frac{87}{110} \simeq 0.7$

**Exercice 6.3.4.** Afin d'éviter des licenciements dans une entreprise, la direction et le personnel se sont mis d'accord, pour réduire la durée hebdomadaire du travail et de la faire passer de cinq à quatre jours. L'un des trois jours de congé sera dimanche, les deux autres étant répartis au hasard dans la semaine. Dans un sac, on dépose six boules portant chacune le nom d'un des jours de la semaine, du lundi au samedi. Chaque employé choisit ses deux jours de congé autre que dimanche en tirant au hasard et simultanément deux de ces boules, supposées indiscernables au toucher. Il remet ensuite les deux boules tirées dans le sac.

1.
  - a) Soit  $A$  l'événement « l'un des jours de congé est le lundi » et  $B$  l'événement « l'un des jours de congé est le samedi ».  
Démontrer que :  $P(A) = P(B) = \frac{1}{3}$ .
  - d) On définit les événements  $C$  et  $D$  suivants :  $C$  « parmi les jours de congés figurent le lundi, ou le samedi, ou les deux jours ».  $D$  « les jours de congés sont trois jours consécutifs ».  
Calculer  $P(C)$  et  $P(D)$ .



- c) Yao aimerait bien avoir les mêmes jours de congé que Mariam.  
Quelle est la probabilité que son souhait se réalise ?
3. L'entreprise compte douze employés. On désigne par  $X$  la variable aléatoire égale au nombre d'employés ayant tiré le samedi comme jour de congé.
- a) Quelle est la loi de probabilité de  $X$  ?
- b) Calculer l'espérance mathématique et la variance de  $X$ .
- c) Calculer la probabilité pour que 5 employés tirent le samedi comme jour de congé.
- d) Calculer la probabilité pour qu'au mois deux employés tirent le samedi comme jour de congé.

**Exercice 6.3.5.** Une urne contient  $N$  boules indispensables au toucher dont une porte le  $n^{\circ}1$ , deux portent le  $n^{\circ}2$ , ...,  $n$  portent le numéro  $n$ . ( $n$  est un nombre impair strictement supérieur à 1).

1. On tire une boule de l'urne.

Soit  $E$  l'événement «la boule tirée est un nombre pair» et  $F$  l'événement «la boule tirée est un nombre impair».

- a) Montrer que :  $N = \frac{n(n+1)}{2}$ .
- b) En posant  $n = 2k + 1$  ( $k$  étant un entier naturel non nul), montrer que :  $\text{card } E = \frac{(n-1)(n+1)}{4}$  et  $\text{card } F = \frac{(n+1)^2}{4}$ .
- c) En déduire les probabilités des événements  $E$  et  $F$ .
2. On tire simultanément deux boules de l'urne.  
Calculer la probabilité pour que la somme des numéros portés par les deux boules soit un nombre impair.
3. Dans cette question, on prend  $n = 19$ .  
On tire une boule de l'urne. On désigne par  $A$  l'événement «le numéro de la boule tirée est un multiple de 5 ou un multiple de 7» et par  $B$  l'événement «le numéro de la boule tirée est impair».
- a) Calculer  $P(A)$  et  $P(B)$ .
- b) Les événements  $A$  et  $B$  sont-ils indépendants.

**Exercice 6.3.6.** 1. En notant  $p(A/B)$  la probabilité de l'événement contraire de  $B$ , démontrer que :  $p(A/\bar{B}) = \frac{p(A) - p(A/B) \cdot p(B)}{1 - p(B)}$ .

2. Lors d'une récente saison de chasse (période durant laquelle la chasse est autorisée dans une région donnée), on a pu établir les statistiques suivantes : 30% des renards sont enrégés ; parmi les renards abattus, 40% étaient enrégés.
- a) En désignant par  $b$  ( $b \neq 1$ ) la probabilité pour qu'un renard soit abattu lors de la saison de chasse, calculer en fonction de  $b$  la probabilité  $p$  pour qu'un renard survivant soit enrégé.  
(Durant la période considérée, on négligera les autres causes de décès ainsi que les nouveaux cas de rage).

- b) Quelle est la plus petite valeur  $b$  pour que  $p$  soit inférieur ou égale à  $0.1$  ?
- c) A l'issue d'une saison de chasse, la probabilité pour qu'un territoire soit décontaminé de la rage est égale à  $\frac{1}{3}$ . Une chasse est divisée en 10 territoires et on désigne par  $X$  la variable aléatoire égale au nombre de territoire décontaminés après la saison de chasse. Quelle est dans les conditions précédentes, et en supposant que les résultats sont indépendants d'un territoire à l'autre, la probabilité d'avoir décontaminer au moins huit territoires sur les dix à l'issue de la saison ?

**Exercice 6.3.7.** Mariam, une jeune diplômée, a reçu un fonds et décide d'ouvrir un restaurant. Après un mois d'activité, elle constate que :

- Pour un jour donné, la probabilité qu'il ait une affluence de clients est  $0.6$  ;
- Lorsqu'il y a une affluence de clients, la probabilité qu'elle réalise un bénéfice est  $0.7$  ;
- Lorsqu'il n'y a pas d'affluence de clients, la probabilité qu'elle réalise un bénéfice est  $0.4$  ;

On désigne par  $A$  l'évènement « il y a affluence de clients » et  $B$  l'évènement « Mariam réalise un bénéfice ».

1. On choisit un jour au hasard.

- a) Calculer la probabilité de l'évènement  $E$  suivant : « il y a une affluence de clients et Mariam réalise un bénéfice ».
- b) Démontrer que la probabilité  $p(B)$  de l'évènement  $B$  est  $0.58$ .
- c) Mariam réalise un bénéfice.

Calculer la probabilité qu'il y ait eu une affluence de clients ce jour-là.

On donnera l'arrondi d'ordre 2 du résultat.

2. Mariam veut faire des prévisions pour trois jours successifs donnés. On désigne par  $X$  la variable aléatoire égale au nombre de jours où elle réalise un bénéfice sur les 3 jours successifs.

- a) Déterminer les valeurs prises par  $X$ .
- b) Déterminer la loi de probabilité de  $X$ .
- c) Calculer l'espérance mathématique  $E(X)$  de  $X$ .

3. Soit  $n$  un nombre entier naturel supérieur ou égal à 2. On note  $P_n$  la probabilité que Mariam réalise au moins une fois un bénéfice pendant  $n$  jours successifs sur une période de  $n$  jours.

- a) Justifier que pour tout nombre entier naturel  $n$  supérieur ou égal à 2 :  $P_n = 1 - (0.42)^n$ .
- b) Déterminer la valeur minimale de  $n$  pour qu'on ait  $P_n = 0.9999$ .

**Exercice 6.3.8.** Une boîte contient 6 boules et  $n$  boules blanches toutes indiscernables au toucher. Un jeu consiste à tirer successivement sans remise deux boules de la boîte. Si les

deux boules sont de même couleur, le joueur gagne 100F et si les boules sont de couleurs différentes, le joueur perd 100F.

1. Dans cette question, suppose  $n = 3$ .

a) calculer le probabilité d'obtenir :

i. Deux boules de même couleur ;

ii. Deux boules de couleurs différentes.

b) Sachant que la première boule tirée est verte, quelle est la probabilité pour que la deuxième boule tirée soit verte ?

2. Dans cette question, l'entier naturel  $n$  est quelconque et supérieur à 3. On note  $X$  la variable aléatoire qui, à chaque tirage successive sans remise de deux boules associe le gain algébrique en francs du joueur.

a) Exprimer en fonction de  $n$  les probabilités des événements  $[X = -100]$  et  $[X = 100]$ .

b) Montrer que l'espérance mathématique de  $X$  est  $E(X) = 100 \frac{n^2 - 13n + 30}{(n+6)(n+5)}$ .

c) Pour quelles valeurs de  $n$  a-t-on  $E(X) < 0$  ?

**Exercice 6.3.9.** Un test de recrutement dans une entreprise est constitué de 5 questions. Pour chaque candidat, on attribue +2 points pour une réponse juste et -2 points pour une réponse fautive ou non donnée. On note  $n$  le nombre de réponses justes données par un candidat.

1. a) Montrer que la note  $N$  d'un candidat à la fin du test est  $N = 4n - 10$ .

b) En déduire l'ensemble des notes possibles qu'un candidat à ce test peut avoir.

2. Le candidat Eya trouve les réponses exactes des deux premières questions. Il répond au hasard aux trois dernières questions. On admet que sa réponse est juste avec la probabilité de  $\frac{1}{3}$  et pour tout autre candidat la probabilité de donner une réponse juste à une des cinq questions est de  $\frac{1}{2}$ .

a) Déterminer l'ensemble des notes que Eya peut avoir à la fin du test.

b) Pour être admis à l'école, un candidat doit obtenir à l'issue du test une note supérieure ou égale 6. Quelle est la probabilité pour que :

$A$  : « Eya réussisse au test ».

$B$  : « Un candidat autre que Eya réussisse au test ».

**Exercice 6.3.10 (TC).** Un sac contient 30 boules indiscernables au toucher dont  $\alpha$  noires,  $\beta$  blanches et  $\gamma$  rouges. On suppose qu'il y a au moins deux boules de chaque couleur. On tire au hasard et simultanément deux boules du sac. Soit l'événement  $E$  « Obtenir deux boules de même couleur ».

1. Calculer en fonction de  $\alpha$ ,  $\beta$  et  $\gamma$  la probabilité  $P(\alpha, \beta, \gamma)$  de l'événement  $E$ .

2. On se propose de déterminer  $\alpha$ ,  $\beta$  et  $\gamma$  afin que  $P(\alpha, \beta, \gamma)$  soit minimale. Pour cela on munit l'espace affine  $\varepsilon$  d'un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$  et on considère les points  $A(30; 0; 0)$ ;  $B(0; 30; 0)$  et  $C(0; 0; 30)$ . Soit le point  $M(\alpha, \beta, \gamma)$  de  $\varepsilon$ .

- a) Vérifier qu'une équation cartésienne du plan  $(ABC)$  est :  
 $x + y + z - 30 = 0$ .
- b) En déduire que  $M$  appartient au plan  $(ABC)$ .
- c) Démontrer que  $870 P(\alpha, \beta, \gamma) + 30 = OM^2$ .
- d) Soit  $H$  le projeté orthogonal de  $O$  sur le plan  $(ABC)$ .  
Déterminer les coordonnées du point  $H$ .
- e) En déduire les valeurs de  $\alpha$ ,  $\beta$  et  $\gamma$  qui rendent minimale  $P(\alpha, \beta, \gamma)$ , puis calculer la probabilité  $P(\alpha, \beta, \gamma)$  correspondante.
3. Le sac contient désormais 10 boules noires, 10 boules blanches et 10 boules rouges. Soit  $n$  et  $k$  deux entiers naturels supérieur ou égal à 2.  
Un joueur mise  $n$  francs et tire simultanément deux boules du sac.
- S'il obtient deux boules de même couleur, il reçoit  $k$  fois sa mise et le jeu est terminé.
  - S'il obtient deux boules de couleurs différentes, il remet les deux boules tirées dans le sac et tire à nouveau simultanément deux boules.
  - S'il obtient deux boules de même couleur, il reçoit  $(k - 1)$  fois sa mise, sinon il perd sa mise et le jeu est terminé.
- Soit  $X$  la variable aléatoire égale au gain algébrique du joueur.
- a) Montrer que la probabilité pour que le joueur ait un gain algébrique égal à  $kn - n$  est  $\frac{2}{29}$ .
- b) Déterminer la loi de probabilité de  $X$ .
- c) Calculer l'espérance mathématique  $E(X)$  en fonction de  $k$  et  $n$ .

**Exercice 6.3.11.** Une urne contient sept boules numérotées de 1 à 7. Les boules portant un numéro pair sont de couleur blanche ; les boules portant un numéro impair sont de couleur noire.

1. On suppose que, lorsque l'on tire une boule de l'urne, et si l'on désigne par  $p_k$  la probabilité de tirer la boule numérotée  $k$ , alors on a :  
 $p_1 = p_3 = p_5 = p_7 = \alpha$  et  $p_2 = p_4 = p_6 = 2\alpha$ .  
On tire une boule de l'urne. Quelle est la probabilité de tirer :
- a) Une boule blanche ?
- b) Une boule noire ?
- c) On tire une boule. On note sa couleur et on la remet dans l'urne, puis on tire une deuxième fois une boule de l'urne. On réalise ainsi deux tirages successifs que l'on suppose indépendants.  
Soit  $X$  la variable aléatoire qui prend pour valeur le nombre de boules blanches sorties au cours des deux tirages.
- i) Quelle est la loi de probabilité de la variable aléatoire  $X$  ?

- ii) Calculer l'espérance mathématique  $E(X)$ , la variance  $V(x)$  et l'écart-type  $\sigma(x)$  de  $X$ .
2. On tire maintenant simultanément deux boules de l'urne. On associe à cette épreuve un univers  $\Omega$  dont les éventualités sont des paires de deux boules. On suppose que  $n$  est le nombre de boules blanche figurant dans une paire et  $p$  la probabilité de l'événement réduit à cette paire alors le rapport  $\frac{p}{n+1}$  est le même pour toutes éventualités de  $\Omega$ . Calculer la probabilité de l'événement : « tirer deux boules blanches ».

**Exercice 6.3.12.** Une urne contient 6 jetons rouges et 4 jetons jaunes. Un jeu consiste à tirer simultanément 2 jetons de l'urne. Si les jetons sont de même couleur, le joueur gagne 1000 KMF. S'ils sont de couleurs différentes, alors le joueur perd 1000 KMF.

1.
  - a) Calculer la probabilité d'obtenir deux jetons de même couleur.
  - b) Calculer la probabilité d'obtenir deux jetons de couleurs différentes.
2. On note  $X$  la variable aléatoire qui à chaque tirage de deux jetons associe le gain ou la perte du joueur.
  - a) Donner les différentes valeurs possibles de  $X$ .
  - b) Déterminer la loi de probabilité de  $X$ .
  - c) Calculer l'espérance mathématique  $E(X)$ , la variance  $V(X)$  et l'écart-type  $\sigma(x)$  de  $X$ .

**Exercice 6.3.13.** Un tiroir contient, pêle – mêle, 5 paires de chaussures noires, 3 paires de chaussures vertes et 2 paires de chaussures rouges. Toutes les paires de chaussures sont de modèles différents, mais indiscernables au toucher.

1. On tire simultanément 2 chaussures au hasard et l'on admet l'équiprobabilité des tirages.
  - a) Calculer la probabilité de l'événement  $A$  : « tirer 2 chaussures de la même couleur »
  - b) Calculer la probabilité de l'événement  $B$  : « tirer un pied gauche et un pied droit ».
  - c) Montrer que la probabilité de l'événement  $C$  : « tirer les deux chaussures d'un même modèle » est  $\frac{1}{19}$ .
2. On ne conserve plus dans le tiroir qu'une paire de chaussures noires et une paire de chaussures rouges. On tire successivement et sans remise une chaussure du tiroir jusqu'à ce que le tiroir soit vide. On note  $X$  la variable aléatoire égale au rang d'apparition de la deuxième chaussure noire.
  - a) Justifier que  $X$  prend les valeurs 2, 3, 4.
  - b) Montrer que la loi de probabilité de  $X$  est :  $p(X = 2) = \frac{1}{6}$  ;  $p(X = 3) = \frac{1}{3}$  et  $p(X = 4) = \frac{1}{2}$ .
  - c) Calculer son espérance mathématique et son écart-type.

**Exercice 6.3.14.** A. On considère  $\Omega$  l'univers associé à une expérience aléatoire,  $A$  et  $B$  deux évènements. Dans le cas d'équiprobabilité rappeler les probabilités des évènements suivants :  $A$ ,  $A$  sachant  $B$ ,  $A \cap \overline{B}$  et  $(A \cap \overline{B}) \cup (A \cap B)$ .

B. Une société de distribution d'électricité ayant une production insuffisante en électricité pour assurer une alimentation continue dans tout le pays, procède à des délestages. Ainsi à partir d'un certain jour les délestages ont débuté dans une ville à un rythme décrit comme suit : - Le premier jour la ville est délestée.

- Si la ville est délestée un jour, la probabilité qu'elle soit délestée le jour suivant est  $\frac{2}{9}$ .

- Si elle n'est pas délestée un jour, la probabilité qu'elle soit délestée le jour suivant est  $\frac{5}{6}$ .

On désigne par  $D_n$  l'évènement : « La ville est délestée le  $n$ ème jour » et  $p_n$  la probabilité de l'évènement  $D_n$ ,  $p_n = p(D_n)$

1. Montrer les égalités suivantes :  $p(D_1) = 1$  ;  $p(D_{n+1}/D_n) = \frac{2}{9}$  ;  
 $p(D_{n+1}/\overline{D_n}) = \frac{5}{6}$ .

2. Exprimer  $p_{n+1}$  en fonction de  $p(D_{n+1} \cap D_n)$  et  $p(D_{n+1}/\overline{D_n})$ .

3. En déduire que, quel que soit  $n \in \mathbb{N}^*$ , on a :  $p_{n+1} = -\frac{11}{18}p_n + \frac{5}{6}$

4. On pose  $u_n = 6p_n - \frac{90}{29}$ , pour  $n \in \mathbb{N}^*$ .

a) Montrer que la suite  $(u_n)$  est géométrique. Préciser sa raison et son 1er terme.

b) Exprimer  $u_n$  puis  $p_n$  en fonction de  $n$ .

c) Un match de football doit se jouer le 20<sup>ème</sup> jour. Quelle est la probabilité pour que les habitants de la ville le suivent sans délestage.

**Exercice 6.3.15.** Un secteur de production d'une entreprise est composé de 3 catégories de personnel : les ingénieurs, les opérateurs de production et les agents de maintenance. Il y a 8% d'ingénieurs et 80% d'opérateurs de production. Les femmes représentent 50% des ingénieurs, 25% des agents de maintenance et 60% des opérateurs de production. On interroge au hasard un membre du personnel de cette entreprise. On note :

- $M$  l'évènement : « Le personnel interrogé est un agent de maintenance. » ;
- $O$  l'évènement : « Le personnel interrogé est un opérateur de production. » ;
- $I$  l'évènement : « Le personnel interrogé est un ingénieur. » ;
- $F$  l'évènement : « Le personnel interrogé est une femme. »

1. Construire un arbre pondéré correspondant aux données.

2. Calculer la probabilité d'interroger :

a) un agent de maintenance ;

b) une femme agent de maintenance ;

c) une femme.

3. Le service de maintenance effectue l'entretien des machines, mais il est appelé aussi à intervenir en cas de panne. Pour cela une alarme est prévue.

*Des études ont montré que sur une journée :*

- La probabilité qu'il n'y ait pas de panne et que l'alarme se déclenche est égale à 0,002.
- La probabilité qu'une panne survienne et que l'alarme ne se déclenche pas est égale à 0,003
- La probabilité qu'une panne se produise est égale à 0,04
- . On note
- A l'événement : « L'alarme se déclenche. »
- B l'événement : « Une panne se produit. »
- a) Démontrer que la probabilité qu'une panne se produise et l'alarme se déclenche est égale à 0,037.
- b) Calculer la probabilité que l'alarme se déclenche.
- c) Calculer la probabilité qu'il y ait une panne sachant que l'alarme se déclenche.

**Exercice 6.3.16.** *Un jeu consiste à lancer quatre fois de suite, une pièce de monnaie bien équilibrée dont l'une des faces est notée F (Face) et l'autre P (Pile). On lit sur la face supérieure de la pièce. Si l'on obtient F alors on gagne 2 points, si l'on obtient P alors on perd 1 point. Soit  $X$  la variable aléatoire réelle égale au nombre de points obtenus à l'issue des quatre lancers.*

1. a) Déterminer l'univers  $\Omega$  associé. (On pourra s'aider d'un arbre).  
b) Calculer la probabilité d'obtenir 3 fois F (Face).
2. a) Déterminer les valeurs prises par la variable aléatoire  $X$ .  
b) Déterminer la loi de probabilité de  $X$ .  
c) Quelle est la probabilité d'obtenir des points strictement inférieurs à 8 ?  
d) Déterminer la probabilité  $p'$  que la variable aléatoire  $X$  prenne une valeur strictement comprise entre  $-3$  et  $7$ .
3. a) Calculer l'espérance  $E(x)$  mathématique de  $X$ .  
Le jeu est-il favorable au joueur ? Justifier.  
b) Calculer la variance  $V(X)$  et l'écart-type  $\sigma$  de  $X$ .

**Exercice 6.3.17.** *Une urne contient 12 boules numérotées de 1 à 12. Toutes les boules ont la même probabilité d'être tirées. On tire simultanément 3 boules de l'urne.*

1. Déterminer le nombre de tirages possibles.
2. Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :  
A : « Les nombres portés par ces 3 boules sont tous des nombres premiers. »  
B : « Les nombres portés par ces 3 boules sont tous divisibles par 3. »  
C : « Deux boules portent un numéro divisible par 3. »  
D : « Les trois numéros sont des multiples de 2. »  
E : « Les trois nombres portés par ces boules, convenablement rangés forment trois termes consécutifs d'une suite arithmétique de raison 3. »

$F$  :  $\ll$  Les trois nombres portés par ces boules, convenablement rangés forment trois termes consécutifs d'une suite géométrique de raison  $\frac{1}{2}$ .  $\gg$

**Exercice 6.3.18.** On dispose de trois urnes  $U_1$ ,  $U_2$  et  $U_3$ .

$U_1$  contient 3 boules vertes et 2 boules rouges ;

$U_2$  contient 4 boules vertes et 5 boules jaunes ;

$U_3$  contient 5 boules jaunes, 4 boules rouges et 1 boule verte.

**Description de l'épreuve**

L'épreuve consiste à tirer une boule dans  $U_1$ .

Si elle est verte on la met dans  $U_2$  puis on tire une boule dans  $U_2$ .

Si elle est rouge, on la met dans  $U_3$  puis on tire une boule dans  $U_3$ .

1.
  - a) Calculer la probabilité d'avoir une boule verte au deuxième tirage sachant que la première tirée est verte.
  - b) Calculer la probabilité d'avoir une boule verte au deuxième tirage sachant que la première est rouge.
  - c) En déduire la probabilité d'avoir une boule verte au deuxième tirage.
  - d) Calculer la probabilité d'avoir une boule jaune au second tirage.
  - e) Calculer la probabilité d'avoir une boule rouge au deuxième tirage.
2. Au cours de cette épreuve si on obtient au deuxième tirage :
  - Une boule verte, on gagne 1000 F
  - Une boule jaune, on gagne 500 F
  - Une boule rouge, on perd 500 F

Soit  $X$  la variable aléatoire qui, à chaque boule obtenue au second tirage, associe un gain défini ci-dessus.

- a) Déterminer la loi de probabilité de  $X$ .
  - b) Calculer l'espérance mathématique de  $X$ .
3. Cette épreuve est faite par chacun des 15 élèves d'une classe dans les mêmes conditions et d'une manière indépendante. Les résultats seront donnés au centième près par défaut.
  - a) Calculer la probabilité pour que 8 élèves obtiennent une boule verte au deuxième tirage.
  - b) Calculer la probabilité pour que seulement les 8 premiers obtiennent une boule verte au deuxième tirage.
  - c) Calculer la probabilité pour qu'au moins un élève ait une boule verte au second tirage.



## 7 Statistique

### 7.1 Caractéristique de position

#### 7.1.1 Mode

**Définition 7.1.** On appelle mode d'une série statistique toute modalité d'effectif maximal.

#### 7.1.2 Moyenne

**Définition 7.2.** Pour une série statistique  $(x_i; n_i)_{1 \leq i \leq p}$  la moyenne est le nombre noté  $\bar{X}$ , définie par :

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^p n_i x_i}{\sum_{i=1}^p n_i} = \frac{n_1 x_1 + n_2 x_2 + \dots + n_p x_p}{n_1 + n_2 + \dots + n_p}$$

Comme  $\sum_{i=1}^p n_i = n_1 + n_2 + \dots + n_p = N$  donc :

$$\bar{X} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^p n_i x_i = \frac{1}{N} [x_1 + x_2 + \dots + x_p]$$

#### 7.1.3 Médiane et Quartiles

**Définition 7.3.** .

La **médiane** est une valeur qui permet de partager une série statistique en deux population de même effectif. Les nombre d'observations inférieures et supérieurs à la valeur médiane sont égaux.

Pour déterminer la médiane de  $N$  valeur, on range ces valeurs par ordre croissant.

Si  $N$  est **pair**, la médiane  $m$  est la demi-somme des termes de rang  $\frac{N}{2}$  et  $\frac{N}{2} + 1$

Si  $N$  est **impair**, la médiane est valeur de caractère de rang  $\frac{N+1}{2}$

Le **première quartile** est le plus petite élément  $Q_1$  des valeurs de la série statistique tel qu'au moins 25% des données sont inférieurs ou égale à  $Q_1$ .

Le **troisième quartile** est le plus petite élément  $Q_3$  des valeurs de la statistique tel qu'au moins 75% données sont inférieures ou égales à  $Q_3$ .

#### 7.1.4 Écart inter-quartile

**Définition 7.4.** L'écart inter-quartile d'une série statistique de première quartile  $Q_1$  et du troisième quartile  $Q_3$  est égale à la différence  $Q_3 - Q_1$ .

**N.B :** La plus grande et la plus petite données à une série est **l'étendue**.

## 7.2 Caractéristique de dispersion

### 7.2.1 Écart moyen

Soit une série statistique  $(x_i; n_i)_{1 \leq i \leq p}$  de moyenne  $\bar{x}$ . L'écart moyen est le nombre réel  $e_m$  définie par :

$$e_m = \frac{\sum_{i=1}^p |x_i - \bar{x}|}{\sum_{i=1}^p n_i} = \frac{n_1|x_1 - \bar{x}| + \dots + n_p|x_p - \bar{x}|}{n_1 + \dots + n_p}$$

Comme  $\sum_{i=1}^p n_i = n_1 + n_2 + \dots + n_p = N$  donc :

$$e_m = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^p n_i |x_i - \bar{x}|$$

### 7.2.2 Variance et Écart-type

**Définition 7.5.** Soit une série statistique  $(x_i; n_i)_{1 \leq i \leq p}$  de moyenne  $\bar{x}$ .

**La variance** est le nombre réel  $V$  définie par :

$$var(x) = \frac{\sum_{i=1}^p n_i (x_i - \bar{x})^2}{\sum_{i=1}^p n_i} = \frac{n_1(x_1 - \bar{x})^2 + \dots + n_p(x_p - \bar{x})^2}{n_1 + \dots + n_2}$$

Comme  $\sum_{i=1}^p n_i = n_1 + n_2 + \dots + n_p = N$  donc :

$$var(x) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^p n_i (x_i - \bar{x})^2$$

**L'écart-type** est le nombre réel positif  $Q$  définie par :  $Q(x) = \sqrt{var(x)}$

**Formule de König :** Soit une statistique  $(x_i; n_i)_{1 \leq i \leq p}$  de moyenne  $\bar{x}$ , d'effectif  $N$  et de variance  $var(x)$ . On a :

$$var(x) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^p x_i^2 n_i - \bar{x}^2$$

$$Q = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^p x_i^2 n_i - \bar{x}^2}$$

## 7.3 Série statistique à deux caractères

**Définition 7.6.** On appelle série statistique à deux variables (ou série statistique double), une série statistique où deux caractères sont étudiés simultanément.

*Remarque 7.1.* Dans ce chapitre, on n'étudiera que des séries statistiques doubles dont les deux caractères étudiés sont quantitatifs. Si, pour chacun des  $n$  individus de la population, on note  $x_i$  et  $y_i$  les valeurs prises par les deux caractères, on peut alors présenter la série statistique sous la forme d'un tableau :

caractère x	$x_1$	$x_2$	$\cdots$	$x_n$
caractère y	$y_1$	$y_2$	$\cdots$	$y_n$

### 7.3.1 Nuage de points

**Définition 7.7.** Dans un repère orthogonal  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ , l'ensemble des points  $M_i$  de coordonnées  $(x_i; y_i)$ , avec  $1 \leq i \leq n$ , est appelé le **nuage de points** associé à cette série statistique.

### 7.3.2 Point moyen d'un nuage

**Définition 7.8.** Soit  $(x_i; y_i; n_{ij})$  une série statistique à deux caractères quantitatifs. On appelle **point moyen G** du nuage des points représentant cette série le point de coordonnées  $(\bar{x}; \bar{y})$ ; où  $\bar{x}$  et  $\bar{y}$  désignent les moyennes respectives des séries marginales  $(x_i; n_{ij})$  et  $(y_j; n_{ij})$ .

## 7.4 Ajustement affine

### 7.4.1 Interpolation et extrapolation

**Définition 7.9.** L'interpolation et l'extrapolation sont des méthodes qui consistent à estimer une valeur inconnue dans une série statistique.

- Pour une *interpolation*, le calcul est réalisé dans le domaine d'étude fourni par les valeurs de la série.
- Pour une *extrapolation*, le calcul est réalisé en dehors du domaine d'étude.

### 7.4.2 Droite d'ajustement

**Définition 7.10.** Lorsque les points d'un nuage sont sensiblement alignés, on peut construire une droite, appelé *droite d'ajustement* (ou *droite de régression*), passant « au plus près » de ces points.

1. **Méthode de Mayer :** Cet ajustement consiste à déterminer la droite passant par deux points moyens du nuage de point.
2. **Méthode des moindres carrés**

**Définition :** Dans le plan muni d'un repère orthonormal, on considère un nuage de  $n$  points de coordonnées  $(x_i; y_i)$ .

La droite  $D$  d'équation  $y = ax + b$  est appelée droite de régression de  $y$  en  $x$  de la série statistique si et seulement si la quantité suivante est minimale :

$$\sum_{i=1}^n (M_i Q_i)^2 = \sum_{i=1}^n [y_i - (ax_i + b)]^2$$

- a) Soit  $(x_i; y_i)_{1 \leq i \leq n}$  une série statistique à deux caractères  $x$  et  $y$ , d'effectif total  $N$ .

La **covariance** de cette série est le nombre réel noté  $cov(x; y)$  tel que :

$$cov(x; y) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = \left( \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i y_i \right) - \bar{x} \bar{y}$$

- b) Soit  $(x_i; y_i)_{1 \leq i \leq N}$  une série statistique à deux caractères  $x$  et  $y$  tel que  $var(x) \neq 0$ .

La **droit de régression** de  $y$  en  $x$  passant par le point moyen du nuage associé à cette série et a pour coefficient directeur  $\frac{cov(x; y)}{var(x)}$ .

Une équation de cette droite est :

$$y - \bar{y} = \frac{cov(x; y)}{var(x)}(x - \bar{x})$$

**Remarque :**

- La **droit de régression** de  $x$  en  $y$  passant par le point moyen du nuage associé à cette série et a pour coefficient directeur  $\frac{cov(x; y)}{var(y)}$ .

Une équation de cette droite est :

$$y - \bar{y} = \frac{cov(x; y)}{var(y)}(y - \bar{y})$$

avec  $var(y) \neq 0$  et  $var(y) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N y_i^2 - \bar{y}^2$

- Quelque soit la méthode utilisée le point moyen  $G$  appartient à la droite de régression.
- c) Soit  $(x_i; y_i)_{1 \leq i \leq N}$  une série statistique à deux caractères  $x$  et  $y$  tel que  $var(x) \neq 0$  et  $var(y) \neq 0$ . Le **coefficient de corrélation** linéaire de cette série est le nombre réel  $r$  tel que :

$$r_{xy} = \frac{cov(x; y)}{\sqrt{var(x)}\sqrt{var(y)}}$$

**N.B :** - On admet que :  $|r| \leq 1$ .

- La corrélation entre les deux caractères  $x$  et  $y$  est d'autant meilleure que  $|r|$  est proche de 1.

- Si  $r_{xy} > 0$ , les valeurs prises par  $y$  ont tendance à croître quand les valeurs de  $x$  augmentent.
- Si  $r_{xy} < 0$ , les valeurs prises par  $y$  ont tendance à décroître quand les valeurs de  $x$  augmentent.
- Si  $r_{xy} = 0$ , les variations des variables  $x$  et  $y$  sont indépendantes.

## 7.5 Exercice d'application

**Application 5.** On considère la série statistique à deux variables données dans

le tableau suivant :

$x_i$	5	10	15	20	25	30	35	40
$y_i$	13	23	34	44	50	65	75	90

1. Dans un repère, représenter le nuage de points  $(x_i; y_i)$ .
2. Déterminer les coordonnées du point moyen  $G$  du nuage de points.
3. Soit  $G_1$ , le point moyen associé aux quatre premiers points du nuage et  $G_2$  le point moyen associé aux quatre derniers points du nuage.
  - a) Calculer les coordonnées de  $G_1$  et  $G_2$ .
  - b) Déterminer une équation de la droite  $D_1$  d'ajustement par la méthode de Mayer et tracer la droite. Montrer que  $G \in D_1$ .
4. Déterminer une équation de la droite  $D_2$  d'ajustement par la méthode des moindres carrés et tracer la droite. Montrer que  $G \in D_2$ .  
Que constatez-vous ?
5. Calculer la valeur de  $x$  pour  $y = 70$ .  
S'agit-il d'une interpolation ou d'une extrapolation ?
6. calculer le coefficient de corrélation et interpréter le résultat.

### Solution Application 5.

1. Voir figure 3 annexe
2. Coordonnées du point moyen  $G$  du nuage de points.  

$$\bar{x} = \frac{5+10+15+20+25+30+35+40}{8} = 22.5 \quad \bar{y} = \frac{13+23+34+44+50+65+75+90}{8} = 49.25 \quad G(22.5, 49.25)$$
3. a)  $x_{G_1} = \frac{5+10+15+20}{4} = 12.5 \quad y_{G_1} = \frac{13+23+34+44}{4} = 28.5 \quad G_1(12.5, 28.5)$   
 $x_{G_2} = \frac{25+30+35+40}{4} = 32.5 \quad y_{G_2} = \frac{50+65+75+90}{4} = 70 \quad G_2(32.5, 70)$ 
  - b) L'équation a pour équation  $E : y = ax + b$ ,  $a = \frac{70-28.5}{32.5-12.5} = 2.075$ .  $G_1 \in E \Leftrightarrow 28.5 = 2.075 \times 12.5 + b \Leftrightarrow b = 2.5625$  donc  $D_1 : y = 2.075x + 2.5625$ .  $2.075 \times 22.5 + 2.5625 = 49.25$  donc  $G \in D_1$
4. Par la méthode des moindres carrés, la droite d'ajustement de  $y$  en  $x$  a pour équation  $y = ax + b$  avec :  $a = \frac{\text{cov}(x,y)}{\text{var}(x)}$ .  

$$\text{cov}(x, y) = \frac{1}{8} \sum_{i=1}^8 (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) \approx 280.625$$

$$\text{var}(x) = \frac{1}{8} \sum_{i=1}^8 ((x_i - \bar{x})^2) \approx 131.25$$

$$a = \frac{280.625}{131.25} \approx 2.138 \text{ et } b = \bar{y} - a\bar{x} = 49.25 - 2.138 \times 22.5 = 1.145$$
 donc  $y = 2.138x + 1.145$ . Or  $2.138 \times 22.5 + 1.145 = 49.25$  donc  $G \in D_2$ .  
 On constate que quelque soit la méthode utilisé le point moyen  $G$  appartient à la droite de régression.
5. Pour  $y = 70$ , on a  $70 = 2.138x + 1.145 \Leftrightarrow x = \frac{70-1.45}{2.138} \approx 32$   
 Les calculs sont réalisés dans domaine d'étude, on parle donc d'interpolation.

6. calculons le coefficient de corrélation :  $r_{xy} = \frac{\text{cov}(x,y)}{\sqrt{\text{var}(x)\text{var}(y)}}$

$$\text{var}(y) = \frac{1}{8} \sum_{i=1}^8 ((y_i - \bar{y})^2) \approx 604.44$$

$$\text{Donc } r_{xy} = \frac{280.625}{\sqrt{131.25 \times 604.44}} \approx 0.99$$

Le coefficient de corrélation est proche de 1 donc la corrélation entre les deux variables est fortes. Les points du nuage sont proches de la droite d'ajustement.

## 7.6 Exercice

**Exercice 7.6.1.** Le tableau suivant donne l'évolution du nombre d'adhérents à EPM (école privé de Mitsamiouli) de 2015 à 2020.

Année $x_i$	2015	2016	2017	2018	2019	2020
nombre d'adhérents $y_i$	70	90	115	140	170	220

1. Dans un repère, représenter le nuage de points  $(x_i; y_i)$ .
2. Déterminer les coordonnées du point moyen  $G$  du nuage de points.
3. Soit  $G_1$ , le point moyen associé aux trois premiers points du nuage et  $G_2$  le point moyen associé aux trois derniers points du nuage.
  - a) Calculer les coordonnées de  $G_1$  et  $G_2$ .
  - b) Déterminer une équation de la droite d'ajustement par la méthode de Mayer et tracer la droite.
4. Calculer nombre d'adhérents en 2021.  
S'agit-il d'une interpolation ou d'une extrapolation ?
5. calculer le coefficient de corrélation et interpréter le résultat.

**Exercice 7.6.2.** L'étude ci-dessous donne le nombre de personnes qui viendraient prendre une chemise en fonction du prix en euros proposé.

Prix $x_i$	18	20	22.5	25	27.5	30	32.5	35	37.5	40
nombre de clients $y_i$	47	45	41	39	36	30	25	22	18	15

1. Dans un repère, représenter le nuage de points  $(x_i; y_i)$ .
2. Déterminer les coordonnées du point moyen  $G$  du nuage de points.
3. Déterminer une équation de la droite d'ajustement par la méthode des moindres carrés et tracer la droite.
4. Calculer le prix qui doit couler une chemise pour avoir 60 clients.  
S'agit-il d'une interpolation ou d'une extrapolation ?
5. calculer le coefficient de corrélation et interpréter le résultat.

**Exercice 7.6.3.** Le directeur de l'association L'AVENIR DE MA PATRIE sollicité une évaluation et un suivi de la classe de 3<sup>ème</sup> auprès d'un encadreur pédagogique.

Ce dernier a relevé pour les six dernières années le nombre  $x$  d'élèves présentés et le nombre  $y$  d'élèves admis à l'examen d'entrée en seconde. Les résultats sont notés dans le tableau suivant :

<i>Examen d'entrée en seconde session</i>	2015	2016	2017	2017	2019	2020
<i>Nombre d'élèves présentés <math>x_i</math></i>	85	62	56	22	55	51
<i>nombre de clients <math>y_i</math></i>	40	19	53	20	51	35

1. Dans un repère, représenter le nuage de points  $(x_i; y_i)$ .
2. Déterminer les coordonnées du point moyen  $G$  du nuage de points.
3. Soit  $G_1$ , le point moyen associé aux trois premiers points du nuage et  $G_2$  le point moyen associé aux trois derniers points du nuage.
  - a) Calculer les coordonnées de  $G_1$  et  $G_2$ .
  - b) Déterminer une équation de la droite d'ajustement par deux méthodes différents. (les deux équations sont différents)
4. a) En supposant que la tendance de cet analyse reste uniforme et en utilisant l'expression de la droite de régression de  $y$  en  $x$ , pour cette session de 2021 de l'union des Comores, donner alors une estimation des nombres des admis sachant que cette école a présenté 64 élèves.
  - b) Selon le rapport de l'encadreur, le problème soulevé est l'effectif des élèves qui empêche l'enseignant à prendre en charge les élèves en difficultés. Alors, pour qu'un jour cette classe réussisse à 100% à l'examen d'entrée en seconde, donner une estimation de l'effectif des élèves que le directeur présentera.
5. calculer le coefficient de corrélation et interpréter le résultat.