

Les DEPENDANCES MULTIVALUEES tu peux vaincre !

De 'toutes' les DM potentielles, un recensement tu feras.

Puis leur indépendance par rapport aux autres attributs tu vérifiera .

Quelques règles te rappeler tu dois si ton but tu veux atteindre.

première règle :

Une DM $X \twoheadrightarrow Y$ ne peut être vraie (indépendante) s'il existe un attribut z dans les 'autres attributs' tel que $Y \rightarrow z$ (si l'on a (x,y,z) et (x,y',z') on ne peut pas avoir (x,y,z') car un y donné DETERMINE un seul z !)

Donc en fait TOUTES les DM sont de la forme $X \twoheadrightarrow Y(\dots)$ où $Y(\dots)$ symbolise Y et TOUS les attributs qu'il détermine.

Deuxième règle :

Sur le même principe, une DM $X \twoheadrightarrow Y$ ne peut être vraie s'il existe un z tq $X', Y \rightarrow z$ avec X' un sous ensemble de X .

Troisième règle :

Pour vérifier une DM $X \twoheadrightarrow Y$ ce est pas la peine de tester l'indépendance par rapport aux attributs z tq $X \rightarrow z$ (car ils auront toujours la même valeur dans les triplets (x,y,z) et (x,y',z') $\Rightarrow z = z'$.

Quatrième règle :

Une DM du type $X \twoheadrightarrow Y$ ne peut être vraie si l'on a un z tq $z \rightarrow Y$ ou $X'z \rightarrow Y$.

C'est donc par ces attributs que l'on commencera pour chercher des contre exemples.