

VÍ DỤ BUỔI 3

VÍ DỤ 3.4.5.

Dùng máy tính hoặc Excel, tính giá trị các biểu thức sau với $p = 0.4, n = 101$.

- a) $k_1 = 45$
- b) $k_2 = 36$
- c) $k_3 = 33; k_4 = 47$

VÍ DỤ 3.4.6.

Một đề thi trắc nghiệm có 82 câu, mỗi câu có 4 phương án trả lời trong đó chỉ có 1 phương án trả lời đúng. Tính xác suất để một thí sinh khi tích bừa thì:

- a) Tích đúng 19 câu.
- b) Tích đúng không quá 18 câu.
- c) Tích đúng từ 17 câu đến 24 câu.
- d) Khả năng tích đúng cao nhất của thí sinh là bao nhiêu câu?

VÍ DỤ 1.2.3.

Xác suất bắn trúng bia của một xạ thủ là 0.725. Xạ thủ có 6 viên đạn và sẽ bắn đến khi nào có 2 viên trúng liên tiếp hoặc hết đạn thì dừng lại. Gọi X là số đạn xạ thủ chưa dùng.

a) **Lập bảng phân bố xác suất của X .**

X	4	3	2	1	0
P					

b) **Tìm hàm phân bố xác suất của đại lượng ngẫu nhiên X .**

$$F(x) = \begin{cases} \dots & \text{nếu } x < 0 \\ \dots & \text{nếu } 0 \leq x < 1 \\ \dots & \text{nếu } 1 \leq x < 2 \\ \dots & \text{nếu } 2 \leq x < 3 \\ \dots & \text{nếu } 3 \leq x < 4 \\ \dots & \text{nếu } x > 4 \end{cases}$$

c) **Lập bảng phân bố xác suất của đại lượng ngẫu nhiên $Y = (X - 2)^2$.**

Y	0	1	4
P			

d) **Tính trung bình số đạn xạ thủ chưa dùng đến và độ lệch chuẩn.**

- Trung bình số đạn xạ thủ chưa dùng đến:
- Phương sai số đạn xạ thủ chưa dùng đến:
- Độ lệch chuẩn số đạn xạ thủ chưa dùng đến: