

VÍ DỤ BUỒI 8

VÍ DỤ 3.2.4.

Một hộp quà của nhà máy A chứa hai sản phẩm. Trọng lượng sản phẩm thứ nhất có phân bố chuẩn với trọng lượng trung bình là $280.6(g)$ với độ lệch chuẩn $5.9(g)$. Sản phẩm thứ hai có phân bố chuẩn với trọng lượng trung bình là $364.7(g)$ với độ lệch chuẩn $4.8(g)$. Trọng lượng của hộp rỗng có phân bố chuẩn với trọng lượng trung bình là $14(g)$ với độ lệch chuẩn $0.3(g)$. Lấy ngẫu nhiên một hộp sản phẩm. Tính xác suất để hộp sản phẩm có trọng lượng nhỏ hơn $669.6(g)$.

$\mu_1 =$	$\mu_2 =$	$\mu_3 =$	$\mu =$
$\sigma_1 =$	$\sigma_2 =$	$\sigma_3 =$	$D(X) =$
$\sigma =$	KQ		

VÍ DỤ BỔ SUNG.

Cho véc tơ ngẫu nhiên (X, Y) có bảng phân bố xác suất như sau:

X \ Y	-1.22	0	1.2
-1.17	a	0.13	0.05
0.2	0.14	0.13	c
0.47	0.08	b	0.1

Tìm a, b, c và lập bảng phân bố xác suất của đại lượng ngẫu nhiên X với điều kiện $Y = -1.22$ biết $E(X) = -0.1136$ và $P(X = 0.47) = 0.31$.

- **a** =
- **b** =
- **c** =

X	-1.17	0.2	0.47
P(/Y = -1.22)			

VÍ DỤ 2.2.5.

Cho một mẫu cụ thể của đại lượng ngẫu nhiên X :

Khoảng giá trị của X	(469; 481)	(481; 499)	(499; 521)	(521; 534)	(534; 554)	(554; 572)
Số giá trị	19	34	42	30	58	17

Tính các tham số đặc trưng của X .

Chuyển mẫu lớp về thành mẫu đơn

x_i	475	490	510	527.5	544	563
n_i	19	34	42	30	58	17

Cỡ mẫu $n =$	Phương sai mẫu điều chỉnh $s'^2 =$
Kỳ vọng mẫu $\bar{x} =$	Độ lệch chuẩn mẫu $s =$
Phương sai mẫu $s^2 =$	Độ lệch chuẩn mẫu điều chỉnh $s' =$