

$K_1 =$; $K_2 =$
 K_1, K_2 : là chữ số thứ 2 và chữ số thứ 3 trong mã số sinh viên tính từ trái sang phải

Câu 1(2đ). Ba người chơi bóng rổ xác suất ném lọt qua rổ của mỗi người lần lượt là $(0, 7 + K_1\%)$; $0, 8$; $(0, 75 + K_2\%)$. Mỗi người ném một quả.

- Tính xác suất để cả ba người đều ném không lọt qua rổ?
- Tính xác suất để chỉ có một người ném lọt qua rổ?

Câu 2(2đ). Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} 3e^{-3x} & , x \geq 0 \\ 0 & , x < 0 \end{cases}$

- Tính $E((K_1 + 1).X + 2)$?
- Tính $P(0 < 2X + 1 < K_2 + 2)$?

Câu 3. Cho bảng phân phối xác suất đồng thời của hai biến ngẫu nhiên X và Y như sau:

X \ Y	1	2	3
-1	$(0, 10 + K_1\%)$	0,20	$(0, 25 - K_1\%)$
2	0,05	a	0,1
4	0,05	0,10	0,05

- Tìm a ?
- Tính EX và $P(X + Y < 2)$?

Câu 4. Điểm thi Toeic của sinh viên là đại lượng ngẫu nhiên có phân bố chuẩn. Thống kê điểm thi của một lớp 40 sinh, ta có số liệu:

X (điểm thi)	460-500	500-540	540-580	580-620
n_i	5	$15 - K_1$	$14 + K_1$	6

Với độ tin cậy $(85 + K_2)\%$ hãy ước lượng khoảng cho EX ?

Câu 5. Cho hệ đầy đủ các biến cố: $\{A_1, A_2, A_3, A_4\}$

Biến cố	A_1	A_2	A_3	A_4
n_i	$22 + K_1$	$28 - K_1$	26	24

Với mức ý nghĩa $(K_2 + 1)\%$ hãy kiểm định xem xác suất xảy ra các biến cố $P(A_1) = 0, 2$; $P(A_2) = 0, 3$; $P(A_3) = 0, 25$; $P(A_4) = 0, 25$ có đúng hay không?

- Sinh viên không được sử dụng tài liệu
- Sinh viên làm đúng với số K_1, K_2 của mình.

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2022

TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)

ThS. Nguyễn Thị Ngọc