

VÍ DỤ 10

- **VÍ DỤ 4.2.4.** Giải gần đúng hệ truy hồi $a(n) = (15) * a(n-1) + (-62) * a(n-2) + (48) * a(n-3)$ với điều kiện đầu $a(0) = -4, a(1) = 17, a(2) = 115$.

Nghiệm của phương trình đặc trưng:

Nghiệm của hệ thức truy hồi:

.....

- **VÍ DỤ 4.2.7.** Giải gần đúng hệ truy hồi $a(n) = -4 * a(n-1) + (11) * a(n-2) + (-6) * a(n-3)$ với điều kiện đầu $a(0) = 4, a(1) = -12, a(2) = 119$.

Nghiệm của phương trình đặc trưng:

Nghiệm thứ nhất:

(☐ Nghiệm bội 1 ☐ Nghiệm bội 2 ☐ Nghiệm bội 3 ☐ Nghiệm bội 4 ☐ Không là nghiệm)

Nghiệm thứ hai:

(☐ Nghiệm bội 1 ☐ Nghiệm bội 2 ☐ Nghiệm bội 3 ☐ Nghiệm bội 4 ☐ Không là nghiệm)

Nghiệm của hệ thức truy hồi:

.....

- **VÍ DỤ 4.2.10.** Giải gần đúng hệ truy hồi $a(n) = 4 * a(n-1) + (10) * a(n-2) + (-300) * a(n-3)$ với điều kiện đầu $a(0) = -7, a(1) = -20, a(2) = -580$.

Nghiệm của phương trình đặc trưng:

Mô đun của nghiệm phức $|r| =$ Argument của nghiệm phức $\varphi =$

Nghiệm của hệ thức truy hồi:

.....