ЗАСТОСУВАННЯ АНТИБІОТИКІВ (ДОВІДКА) СМС



ЦЕФАЛЕКСИН

Цефалоспорин, бета-лактамний антибіотик

Використовується бойовими медиками

Рекомендований при ранах м'яких тканин, якщо є можливість приймати ліки перорально, а моксифлоксацин недоступний.

ДОЗУВАНЯ:

500 мг перорально кожні 6 годин

ШЛЯХ(И) ВВЕДЕННЯ:

перорально

ПРОТИПОКАЗИ:

Відома гіперчутливість; при тривалому застосуванні можливий розвиток грибкової/бактеріальної суперінфекції

МОЖЛИВІ ПОБІЧНІ ДТТ

Біль у животі, збудження, анемія, сплутаність свідомості, діарея, підвищення рівня трансаміназ, епідермальний некроліз, багатоформна еритема, втома, гастрит, головний біль, гіперчутливість, псевдомембранозний коліт, тромбоцитопенія, токсичний епідермальний некроліз, кропив'янка, блювання

взаемодія з ІНШИМИ ЛІКАМИ:

Вакцина БЦЖ (жива), вакцина проти холери, вакцина проти черевного тифу (жива), дигоксин, естрадіол, кон'юговані естрогени, метформін, пробенецид, тикарцилін, варфарин, цинк

ПОЧАТОК/ПІК/ТРИВАЛІСТЬ ДІЇ: 1 год/1-2 год/2-6 год

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ В ТАКТИЧНИХ УМОВАХ: Якщо моксифлоксацин недоступний, призначають альтернативний антибіотик. Мінімальний вплив на здатність виконувати бойове завдання.