

## знеболювальні препарати (довідка)

## 

Використовується бойовими медиками

## Антагоніст опіоїдних рецепторів

Використовується при передозуванні наркотичними опіоїдними препаратами з метою усунення їх ефектів, до яких належать, зокрема, пригнічення дихання, седативний ефект та гіпотензія.

ДОЗУВАННЯ:

0.4-2 мг ВВ, ІН, або ВМ; повторюйте кожні 2-3 хв до максимальної дози 10 мг, якщо є покази

ШЛЯХ(И) ВВЕДЕННЯ:

BB, IH, BM

ПРОТИПОКАЗИ:

Гіперчутливість до налоксону, застосовувати з обережністю пацієнтам із нейроциркуляторною астенією; вважається відносно безпечним під час вагітності, якщо є клінічні покази

МОЖЛИВІ ПОБІЧНІ

усунення знеболювального ефекту, тремор, гіпервентиляція, сонливість, пітливість, підвищення АТ, тахікардія, нудота, блювання

ВЗАЕМОДІЯ З ІНШИМИ ЛІКАМИ:

Кардіотоксичні препарати (можуть спричинити значні ураження серцево-судинної системи) – застосовувати разом з обережністю, усуває знеболювальну дію наркотичних (опіоїдних) агоністів

ПОЧАТОК/ПІК/ТРИВАЛІСТЬ ДІЇ: 1-2 хв/5-15 хв/різна

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ В ТАКТИЧНИХ УМОВАХ: Передозування налоксону малоймовірне, якщо його застосовувати згідно з інструкцією; налоксон повинен бути під рукою щоразу, коли вводяться наркотичні препарати; титруйте до досягнення ефекту (усунення ознак і симптомів передозування наркотичного препарату), але продовжуйте контролювати біль пораненого; дія налоксону може закінчитися раніше за дію наркотиків – уважно спостерігайте за ознаками повторного передозування опіатами.





