

знеболювальні препарати (довідка)

OEHTAHI

Використовується бойовими медиками

Потужний опіоїдний агоніст

Використовується при легкому та помірному болю, якщо у пораненого НЕМАЄ шоку або дихальної недостатності та НЕМАЄ значного ризику розвитку цих станів

дозування:

800 мкг трансмукозно, дозу можна повторити через 15 хв

ШЛЯХ(И) ВВЕДЕННЯ:

трансмукозно - між щокою та яснами (вводить бойовий медик)

ПРОТИПОКАЗИ:

Алергія на фентаніл, значна гіпотензія, використання інгібіторів МАО, міастенія гравіс, використання фентанілу в вагітних допускається, якщо користь перевищує потенційний ризик, а альтернативні варіанти є ГІРШИМИ.

МОЖЛИВІ ПОБІЧНІ

седація, ейфорія, брадикардія, артеріальна гіпотензія, пригнічення кровообігу, міоз, розмитий зір, нудота, блювання, ларингоспазм, бронхоконстрикція або пригнічення дихання

взаемодія з ІНШИМИ ЛІКАМИ:

Алкоголь та інші препарати, що пригнічують ЦНС, посилюють ефект фентанілу; використання з інгібіторами МАО може викликати гіпертонічний криз

ПОЧАТОК/ПІК/ТРИВАЛІСТЬ ДІЇ: 15-60 с (<трансмукозно)/20 с - 4 хв/1-2 год

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ В ТАКТИЧНИХ УМОВАХ: Вилучіть у пораненого зброю, засоби зв'язку та спецобладнання; порушення психічного стану може негативно вплинути на оцінювання шоку та/або черепно-мозкової травми – використовуйте метод AVPU для встановлення початкового стану перед введенням ліків; уважно стежте за прохідністю дихальних шляхів, диханням і кровообігом – будьте готові вводити налоксон, якщо будуть покази.

