ЗАСТОСУВАННЯ АНТИБІОТИКІВ (ДОВІДКА) СМС



КЛІНДАМІЦИН

Використовується бойовими медиками

Лінкозамідний антибіотик

Рекомендований, якщо є алергія на бета-лактамні антибіотики; також при всіх відкритих бойових ранах, якщо моксифлоксацин або ертапенем недоступні.

ДОЗУВАНЯ:

450 мг перорально кожні 8 годин; 900 мг ВМ кожні 8 годин, максимум 600 мг на місце ін'єкції; 900 мг ВВ/ВК- інфузія кожні 8 годин, максимальна швидкість 30 мг/хвилину (мінімум 30 хвилин для 900 мг) для запобігання потенційній гіпотензії/зупинці серця/шлуночковій аритмії



ШЛЯХ(И) ВВЕДЕННЯ: перорально, ВВ, ВК, ВМ

ПРОТИПОКАЗИ:

Відома гіперчутливість, ризик потенційно фатального псевдомембранозного коліту – припинити прийом, якщо виникнуть значні спазми в животі, нудота або виділення крові чи слизу з калом.

МОЖЛИВІ ПОБІЧНІ ДТТ

Біль у животі, агранулоцитоз, еозинофілія, діарея, надмірний ріст грибків, псевдомембранозний коліт, гіперчутливість, синдром Стівенса-Джонсона, висипання, кропив'янка, гіпотензія, нудота, блювання, тромбофлебіт, нейтропенія, тромбоцитопенія, поліартрит, порушення функції нирок

взаемодія з ІНШИМИ ЛІКАМИ:

вакцина БЦЖ (жива), вакцина проти холери, панкуроній, рапакуроній, рокуроній, сукцинілхолін, вакцина проти черевного тифу (жива), векуроній

 $\square O = \square O$

<u>ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ В ТАКТИЧНИХ УМОВАХ:</u> Альтернативний антибіотик - призначається, якщо моксифлоксацин або ертапенем недоступні. Мінімальний або відсутній вплив на виконання бойового завдання. Для ВВ/ВК інфузії розвести за допомогою 50 мл фізрозчину, 5% глюкози або лактату Рінгера.