

## знеболювальні препарати (довідка)

## MEJIOKCI/KAM

Нестероїдний протизапальний препарат (НПЗП), інгібітор ЦОГ-2, який використовується для знеболення та зниження температури

Використовується всіма військовослужбовцями, бійцями-рятувальниками та бойовими медиками

Використовується при легкому та помірному болю в пораненого зі збереженою боєздатністю.

ДОЗУВАННЯ:

15 мг 1 раз на добу

ШЛЯХ(И) ВВЕДЕННЯ:

перорально

ПРОТИПОКАЗИ:

Гіперчутливість до НПЗП чи саліцилатів, астма, важке захворювання нирок або печінки; при призначенні вагітним слід враховувати можливі переваги прийому препарату над потенційними ризиками, якщо альтернативний варіант є гіршим

МОЖЛИВІ ПОБІЧНІ ДТТ

Набряк, грипоподібний синдром, біль у животі, діарея, диспепсія, нудота, виразка, шлунково-кишкова кровотеча, анемія, головний біль або безсоння

взаемодія з ІНШИМИ ЛІКАМИ:

Зниження ефекту інгібіторів АПФ та діуретиків, підвищення рівня літію та його токсичності, підвищення ризику шлунково-кишкової кровотечі при застосуванні разом з аспірином та варфарином

ПОЧАТОК/ПІК/ТРИВАЛІСТЬ ДІЇ: 30-60 хв/5-6 год/20-24 год

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ В ТАКТИЧНИХ УМОВАХ: Мінімальний або відсутній вплив на виконання бойового завдання; НЕ давайте пораненим службовим собакам



